

الفيتامينات

الأعشاب والمعادن والمكملات

الدليل الكامل

تأليف: الدكتور هـ. وينتر غريفيث

ترجمة: مركز التعريب والبرمجة

بۆدابهزاندنى جۆرلەرى كىتەپ: سەردانى: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پەراي دانلود كىتاپلەرى مەخسۇس مەراجىھە: (مُنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

www.lqra.ahlamontada.com



www.lqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى ، عربى ، فارسى)

الفيتامينات

الأعشاب والمعادن والمكملات

الدكتور الطاهر



يضم هذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكليزي

**VITAMINS, Herbs, Minerals & Supplements
The Complete Guide**

حقوق الترجمة العربية مرخص بها قانونياً من الناشر

Fisher Books

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقع بينه وبين

الدار العربية للعلوم

Authorized Translation from English Language Edition

Original Copyright © 2000 by Fisher Books

All Rights Published by arrangement with the Publisher

Fisher Books

Translation © 2000 Arab Scientific Publishers

الفيتامينات

الأعشاب والمعادن والمكملات

الدليل الكامل

تأليف: الدكتور د. وينتر غريفيث

ترجمة: مركز التعريب والبرمجة



الدار العربية للعلوم
Arab Scientific Publishers

الطبعة الأولى

1421 هـ - 2000 م

ISBN 2-84409-703-0

جميع الحقوق محفوظة للناس



الدار العربية للعلوم
Arab Scientific Publishers

عين التينة، شارع ساقية الجنزير، بناية الروم

هاتف: 786233 - 860138 - 785108 - 785107 (961-1)

فاكس: 786230 (961-1) ص.ب. 13-5574 بيروت - لبنان

البريد الإلكتروني: asp@asp.com.lb

الموقع على شبكة الانترنت: <http://www.asp.com.lb>

الفهرس

7	الفيتامينات والمعادن
11	دليل جداول المعادن والفيتامينات والأحماض
20	المكملات والأدوية العشبية
25	دليل إلى جداول المكملات والأعشاب الطبية
	كيفية استخدام الفيتامينات والمعادن
28	والمكملات والأعشاب الطبية بطريقة آمنة
31	الفيتامينات
73	المعادن
123	الأحماض الأمينية
145	مكملات الطعام
177	الأعشاب الطبية
178	الأعشاب الشائعة
244	الأعشاب الأقل شيوعاً
461	المأخوذ اليومي المثالي
463	المواد الكيميائية النباتية والصحية

الفيتامينات والمعادن

التي تنظمها، مثل الأدوية والمواد المضافة المستخدمة في الأطعمة المعالجة. ويعني ذلك أن المستهلكين والصانعين، وليس الحكومة، مسؤولون عن التأكد من سلامة المكملات الغذائية وتحديد صحة المعلومات المذكورة على لصائقها. وبدءاً من شهر مارس 1999، بات ظهور المعلومات الآتية إلزامياً على لصائق المكملات الغذائية:

- اسم النوع (مثل الجينسة ginseng)
 - الكمية الصافية للمحتويات (مثلاً 60 كبسولة)
 - تركيبة ووظيفة المكمل الغذائي وعبارة "لم يخضع هذا المنتج للتدقيق من قبل جمعية الأطعمة والأدوية. هذا المنتج ليس مخصصاً لتشخيص أي مرض أو معالجته أو شفاؤه أو الحؤول دونه." (ويفترض بتركيبة ووظيفة المكمل الغذائي أن تشير إلى الهدف أو الفوائد المرجوة من استخدام هذا المنتج).
 - طرق الاستعمال (مثلاً: تناول كبسولة واحدة يومياً)
 - جدول معلومات المكمل (أي حجم الحصة، والمقدار والمكون النشط).
 - ذكر المكونات الأخرى في ترتيب تنازلي من حيث الأهمية وبأسمائها الشائعة.
 - اسم ومكان عمل الصانع أو الموزع. هذا هو العنوان الذي يستطيع المستهلك الكتابة إليه للحصول على معلومات عن المنتج.
- بالإضافة إلى ذلك، أصدر المعهد الأميركي للتغذية والجمعية الأميركية للتغذية السريرية بياناً رسمياً حول مكملات الفيتامين والمعادن. وقد أقر مجلس الشؤون العلمية في الجمعية الطبية الأميركية بأن هذا البيان متناغم مع قانونه الرسمي بالنسبة إلى المكملات الغذائية.

أشارت الاستطلاعات إلى أن أكثر من نصف الشعب الأميركي البالغ سن الرشد يستخدم أحد أنواع المكملات الغذائية. وفي العام 1996 وحده، أنفق المستهلكون أكثر من 6.5 مليار دولار على المكملات الغذائية حسب شركة إحصاءات متركزة في نيويورك. لكن رغم كل هذه المشتريات، لا يزال المستهلكون يطرحون الأسئلة حول المكملات الغذائية: هل يمكن الوثوق بما تزعمه؟ هل هي آمنة؟ هل توافق عليها جمعية الأطعمة والأدوية؟ انبثقت معظم هذه الأسئلة بعد إقرار قانون الصحة والتربية للمكملات الغذائية عام 1994. فقد وضع هذا القانون إطاراً جديداً لأنظمة جمعية الأطعمة والأدوية بالنسبة إلى المكملات الغذائية. وأنشأ هذا القانون مكتباً جديداً ضمن معاهد الصحة الوطنية لتنسيق الأبحاث الجارية حول المكملات الغذائية. أطلق على هذا المكتب اسم مكتب الطب البديل. كما استحدث هذا القانون لجنة مستقلة للمكملات الغذائية للإبلاغ عن الادعاءات غير الصحيحة في لصائق المكملات الغذائية. وقد رُحِبَ مجلس التغذية المسؤولة، وهو منظمة لصانعي المكملات الغذائية ومورديهم، بهذا التغيير. وقد قال جون كوردانو، رئيس المجموعة ومديرها التنفيذي: "كانت فلسفتنا تقوم على الحفاظ على إمكانية نفاذ المستهلك إلى المنتجات والمعلومات بحيث يستطيع المستهلكون الاطلاع على خياراتهم".

ورغم أن جمعية الأطعمة والأدوية تتلقى الكثير من أسئلة المستهلكين الراغبين في معرفة ما إذا كان يجدر بهم استخدام المكملات الغذائية، لا تزال قدرة الجمعية على توفير الإجابات محدودة. فهذه الجمعية تعمل على المكملات الغذائية وفق توجيهات أقل صرامة مما تفعل للمنتجات الأخرى

الفرد وصحته. كما أن الجرعات الكبيرة من مكملات الفيتامينات والمعادن قد تعيق الاستقلاب الطبيعي لمواد مغذية أخرى والتأثيرات العلاجية لبعض العقاقير. والواقع أن المقدار الغذائي الموصى به RDA والمأخوذ الغذائي الموصى به DRI هما من أفضل التقييمات المتوافرة حالياً حول المأخوذ الآمن والملائم. إنهما يظهران على العديد من لصائق المنتجات، علماً أن جمعية الأطعمة والأدوية توصي الأفراد بعدم التقيد بهذه المعلومات لمأخوذهم اليومي.

يرغب كل اختصاصي في الصحة أن يتناول المستهلكون المواد المغذية والمكملات الصحية إن كانوا بحاجة إليها. لكن بعض الأشخاص سيئون استخدام هذه المواد الأساسية من خلال تناول جرعات تصل إلى 10 أضعاف أو 20 ضعف المقدار الموصى به.

يعتقد بعض الأشخاص أنه إذا كانت الحبة الواحدة مفيدة، لا بد أن تكون 20 حبة أفضل كثيراً. ويعتقدون أيضاً أن الفيتامينات والمعادن والأعشاب والمكملات هي طب فعلي.

تشير المعلومات الواردة في هذا الكتاب إلى أن الفيتامينات والمعادن والأعشاب والمكملات الغذائية قد تسبب تأثيرات جانبية معاكسة، وتتفاعل مع العقاقير والمواد المغذية الأخرى. ويحاول العديد من الأشخاص تفادي بعض المواد بسبب حالة فريدة، مثل الحمل أو العمر. ويدرك أشخاص آخرون أن بعض الظروف الطبية، مثل مشاكل القلب أو أمراض أخرى، هي دليل على ضرورة عدم تناول أية مواد أخرى.

لذا، عند تحديد ما إذا كان يجدر بك تناول الفيتامينات والمعادن مع غذائك، تذكر أن الجرعات الكبيرة قد تكون مؤذية. فالجرعات الكبيرة مثلاً من الفيتامين A قد تسبب التقيؤ وألم العظام. والجرعات الكبيرة من الفيتامين C لها أيضاً تأثيرات سمية، بما في ذلك الإسهال وربما

وجاء في البيان: "يفترض بالأولاد والراشدين المتمتعين بصحة سليمة أن يحصلوا على مأخوذ غذائي ملائم من المصادر الغذائية. والواقع أن تلبية الحاجات الغذائية من خلال اختيار الأطعمة باعتدال، بدل اللجوء إلى المكملات، يخفف من الخطر المحتمل للنقص الغذائي والإفراط الغذائي. ويتوجب على الأطباء أو اختصاصيي التغذية أن يصدروا بأنفسهم التوصيات الفردية بشأن المكملات والأغذية.

إلا أن اللجوء إلى المكملات يكون أحياناً ضرورياً، كما في الحالات الآتية:

- المرأة التي تعاني من نزف شهري قوي قد تحتاج إلى مكملات الحديد.
- المرأة الحامل أو المرضعة تكشف عن حاجة أكبر إلى بعض المواد الغذائية، ولاسيما الحديد وحمض الفوليك والكلسيوم.
- الأشخاص الذين يقتصر مأخوذهم على عدد ضئيل من الوحدات الحرارية يستهلكون أطعمة قد لا تلبى معظم احتياجاتهم الغذائية.
- قد لا يتلقى بعض الأشخاص النباتيين المقدار الكافي من الكلسيوم والحديد والزنك والفيتامين B-12.
- يعطى المواليد الجدد عادة جرعة واحدة من الفيتامين K للحوول دون نزف غير طبيعي. (يتم ذلك تحت إشراف الطبيب).
- بعض الاضطرابات أو الأمراض أو الأدوية تتفاعل مع المأخوذ الغذائي أو الهضم أو الامتصاص أو الاستقلاب أو الإفراز. وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن تناول المكملات مع مواد مغذية معينة قد يسهم في الحوّل دون المرض. فالذين يعانون من الذبحة القلبية مثلاً قد يستفيدون من مكمل الفيتامين E.

تصبح المواد المغذية سامة عند تناولها بكميات كبيرة جداً. إلا أن مستويات المأخوذ الآمن تختلف كثيراً بين مادة وأخرى، وقد تختلف حسب عمر

الفيتامينات التي تذوب في الماء لا يمكن حفظها في الجسم بكميات كبيرة. ويفترض بالمقدار اليومي الذي تحتاج إليه أن ينبع مما تأكله على مدى عدة أيام.

تزداد الحاجة إلى الفيتامينات أثناء المرض، أو بعد عملية جراحية، أو حتى نتيجة التقدم في العمر. وفي هذه الظروف، قد تصبح مكملات الفيتامين ضرورية لتلبية الحاجات المتزايدة أو الحؤول دون نقص في مواد مغذية معينة.

لقد ناقشنا موضوع الأشخاص المحتاجين إلى المكملات أو المعرضين إلى نقص في الفيتامينات في مرحلة لاحقة من هذا القسم. راجع الصفحة 15. لا تستطيع مكملات الفيتامينات أن تحل مكان التغذية الجيدة. فالفيتامينات لا توفر الطاقة. ويحتاج الجسم إلى مواد أخرى غير الفيتامينات للحصول على التغذية الملائمة، مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين والمعادن. ولا تستطيع الفيتامينات الحفاظ على جسم سليم إلا بوجود مواد مغذية أخرى، نابغة أساساً من الأطعمة والمعادن.

المعادن

المعادن هي عناصر كيميائية غير عضوية. إنها تسهم في العمليات الفيزيولوجية والكيميائية الأحيائية اللازمة للنمو المثالي والصحة السليمة. وثمة فرق واضح ومهم بين كلمة معدن وكلمة عنصر ضئيل. فإن كان الجسم يحتاج إلى أكثر من 100 مليغرام من معدن معين كل يوم، يطلق على هذه المادة اسم معدن. وإن كان الجسم يحتاج إلى أقل من 100 مليغرام من معدن معين كل يوم، يطلق على هذه المادة اسم عنصر ضئيل.

هناك العديد من المعادن التي تعتبر أجزاء أساسية من الأنزيمات، وهي تشارك بفاعلية في تنظيم العديد من الوظائف الفيزيولوجية، بما في ذلك نقل الأوكسجين إلى كل خلية من خلايا الجسم، وتوفير الحافز للعضلات للانقباض، وكذلك ضمان العمل الطبيعي للجهاز العصبي المركزي. والمعادن لازمة لنمو أنسجة الجسم

توليد الحصى في الكليتين. كما أن الكمية الكبيرة من هذا الفيتامين قد تعيق قدرة الخلايا البيضاء في الدم على قتل الجراثيم. هكذا، تصبح الالتهابات أسوأ حالاً.

وهناك العديد من الحالات التي توجب عدم تناول المكملات. إن்தبه دوماً إلى التأثيرات الجانبية أو التفاعلات التي قد تنجم. لذا، يتوجب عليك أن تكون مستهلكاً "ذكياً" للفيتامينات والمعادن والمكملات التي يحتاج إليها جسمك. حاول نيلها من الطعام الذي تتناوله، وكمّلها مع المنتجات المتوافرة عند الضرورة.

الفيتامينات

الفيتامينات هي مركبات كيميائية ضرورية للنمو والصحة والاستقلاب الطبيعي والرفاهية الجسدية. بعض الفيتامينات هي مكونات أساسية من الأنزيمات، أي الجزيئات الكيميائية التي تحفز التفاعلات الكيميائية أو تسهل إتمامها. وهناك فيتامينات أخرى تشكل جزءاً أساسياً من الهرمونات، أي المواد الكيميائية التي تحفز وتحمي صحة الجسم والتوالد. إن كنت بصحة جيدة، قد تحتاج إلى الفيتامينات بمقادير ضئيلة، والتي يمكن العثور عليها في الأطعمة التي تتناولها، على افتراض أنك تتناول غذاءً طبيعياً ومتوازناً.

تنوزع الفيتامينات تقليدياً على فئتين: تلك التي تذوب في الدهن، وتلك التي تذوب في الماء.

الفيتامينات التي تذوب في الدهن يمكن حفظها في الجسم. فعند تناول كميات كبيرة من الفيتامينات التي تذوب في الدهن، تتراكم في الجسم لتوفير الكميات اللازمة لاحقاً. هذا خبر جيد. لكن الخبر السيء أنه عند تناول كميات كبيرة من الفيتامينات التي تذوب في الدهن، قد تتراكم مستويات سامة في أساكن تخزين مثل الكبد. وقد يؤدي هذا التراكم إلى مشاكل جسدية طويلة الأمد وخطرة ربما.

وعظامه والحفاظ عليها وإصلاحها.

تنتشر معظم المعادن بكثرة في الأطعمة. ويعتبر النقص الحاد في المعادن أمراً غير مألوف في الغرب. لكن نقص الحديد يشيع لدى الأطفال والأولاد والنساء الحوامل. كما أن نقص الزنك والنحاس شائعان، خصوصاً أثناء المرض.

المستحضرات المتعددة الفيتامينات / المعادن يحتوي الغذاء المتنوع على كل المواد المغذية التي يحتاج إليها الجسم. ويبقى الطعام المصدر الأفضل والأكثر وثوقاً للمواد المغذية بالنسبة إلى أصحاب الصحة السليمة. لكن إذا كنت أنت أو أحد أولادك بحاجة إلى المكملات، ننصحك أولاً بتناول المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن المتوافرة. والجدير بالذكر أن المنتجات التجارية تشتمل عادة على توازن جيد من المواد المغذية. أما تناول المنتجات المنفصلة فقد يفضي إلى خلل في توازن المواد المغذية، مما يؤدي إلى فرط في مادة معينة على حساب تضاؤل امتصاص أو

فاعلية مادة أخرى.

كما أن تناول المكملات الغذائية المنفصلة يستلزم انتباهاً كبيراً إلى التفاعلات الحاصلة بين المواد المغذية، وقد يفضي غالباً إلى تخطي المأخوذ للحدود الصحية، مما يوجب زيارة الطبيب أو اختصاصي التغذية أو الصيدلي.

يوفر معظم صانعي المواد الصيدلانية منتجات مشتملة على عدة مكملات. والواقع أن الأسماء التجارية عديدة جداً وتغير على الدوام، ولا نستطيع بالتالي إدراجها في هذا الكتاب لكن يفترض بالصيدلي أو الطبيب أو اختصاصي التغذية أن يتمكن من نصحك بالمصدر الجيد للفيتامينات والمعادن.

إذا درست الفيتامينات والمعادن، قد تجد أنك بحاجة إلى المكملات لسبب أو آخر. نأمل أن يزودك هذا الكتاب بالمعلومات الكافية التي تتيح لك الاختيار بحكمة وطرح الأسئلة الصحيحة لمعرفة الأمثل بالنسبة إليك.

دليل إلى جداول الفيتامينات والمعادن والأحماض

بالاسم الأكثر شيوعاً لها، فيما وضعنا الأسماء الأخرى بين قوسين في أعلى الصفحة أو ذكرناها في قسم المعلومات الأساسية. أما الفهرس فيشتمل على مرجع لكل واحد من أسماء الجنس.

قد تكشف علبة المنتج عن اسم الجنس، أو اسم الماركة أو الاثنين سوياً. وفي حال عدم وجود أي اسم، إسأل الصيدلي عنه

2. متوافر من مصادر طبيعية؟

3. متوافر من مصادر اصطناعية؟

يقال عن العديد من الفيتامينات والمعادن والمكملات إنها "طبيعية"، ما يوحي بأن المنتج مشتق من مصادر طبيعية وليس من مصادر اصطناعية. ومن المعروف أن المعادن هي مواد كيميائية أساسية لا يمكن تصنيعها من مواد أخرى غير أن العديد من الفيتامينات والمكملات مشتقة من مصادر طبيعية واصطناعية على حد سواء.

قد يكون هذا مربكاً بالنسبة إلى العديد من المستهلكين. والواقع أن الصانعين فعلوا كل ما بوسعهم للاستفادة مالياً من هذا الارتباك. فالمعلنون يزعمون أن المصادر الطبيعية جيدة فيبدأ المصانعون الاصطناعية سيئة. لكن الحقيقة أن الشكل الطبيعي والشكل الاصطناعي للمادة الكيميائية نفسها متماثلان!!!

لذا، لا تدقق المزيد من المال للحصول على فيتامينات أو مكملات طبيعية، لأنها تؤثر كلها بالطريقة نفسها في جسمك. لا بل أن الشكل الاصطناعي قد يكون أكثر نقاوة أو أقل تلوثاً بمواد مثل الأسعده ومبيدات الحشرات

لقد نظمنا المعلومات الواردة في هذا الكتاب في شكل جداول مكثفة وسهلة القراءة، موزعة على خمسة أقسام أساسية الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية والأحماض النووية، كمكملات أخرى وأعشاب طبية. (تبدأ المعلومات حول المكملات والأعشاب الطبية في الصفحة 26). وقد وصفنا كل مادة في نسق متعدد الصفحات كما هو مبين في الجداول النموذجية في الصفحات التالية. وذكرناها بالترتيب الأبجدي وفق الاسم الأكثر شيوعاً لها، وكان عادة اسم الجنس بدل اسم الماركة.

أما الأسماء الأكثر شيوعاً للمواد فتظهر في أعلى الجدول فالفيتامين C مثلاً يعرف بالحمض الأسكوربي. لذا، يظهر الاسمان معاً في أعلى الجدول. وبالنسبة إلى الأسماء الأقل شيوعاً، فهي تظهر في القسم الأول من الجدول، أي في قسم "المعلومات الأساسية".

لمعرفة المزيد عن المعدن أو الفيتامين، أنت بحاجة إلى معرفة اسم واحد له فقط إبحث في الفهرس عن أي اسم تعرفه. يوفر لك هذا الفهرس رقم الصفحة المشتملة على المعلومات التي تريدها

أما الصفحات القليلة الآتية فتوفر شرحاً مسهباً عن كل فقرة مذكورة في جدول الفيتامين أو المعدن أو الحمض تتطابق الأرقام مع الجدول النموذجي المبين في الصفحتين 13 و14. تساعدك هذه المعلومات في قراءة الجداول وفهمها بدءاً من الصفحة 32.

1. اسم الجنس

يشتمل عنوان كل جدول على اسم الجنس genenc name، أي الاسم الكيميائي الرسمي للمادة وفي حال وجود اسمين أو أكثر للجنس الواحد، ذكرنا المادة

هذه المعلومات. فبعض المواد تفتقر إلى هذه المعلومات لأسباب معينة، إذ إن بعضها لا يزال قيد الدراسة، فيما البعض الآخر متوافر بكثرة في الطعام، ويعاني المرء نادراً من نقص هذه المادة أو فرطها. وهناك مواد أخرى نادرة وتفتقر إلى الإرشادات.

4. هل الوصفة ضرورية؟

تتوافر معظم الفيتامينات والمعادن والمكملات من دون الحاجة إلى وصفة طبية. لكن ثمة أشكال بجرعات أكبر تعالج أمراضاً معينة وتتطلب وصفة من الطبيب. هكذا، فإن كلمة "نعم" تعني ضرورة الحصول على وصفة الطبيب. و"لا" تعني إمكانية شراء المنتج من دون وصفة طبيب. أما عبارة "نعم، للبعض" فتعني أن بعض الجرعات أو الأشكال (مثل الحقنة) تستلزم وصفة طبية، فيما الجرعات الأخرى لا تستلزم.

والمعلومات المتوافرة عن اسم الجنس هي نفسها، سواء كان النوع يحتاج إلى وصفة طبية أو لا. وإن كانت المكونات الأحيائية هي نفسها، قد تتسم المنتجات غير المستلزمة للوصفة بالمخاطر والتحذيرات والتأثيرات الجانبية والتفاعلات نفسها للمواد الموجودة في المنتجات المستلزمة للوصفة الطبية

5. يذوب في الدهن أو الماء؟

ينطبق هذا الأمر على الفيتامينات فقط فالفيتامينات التي تذوب في الدهن قد تتراكم في الجسم، وتسبب ربما تأثيرات سمية في الجرعات المفرطة، إما في يوم واحد أو عبر فترة ممتدة من الوقت. أما الفيتامينات التي تذوب في الماء فلا تتراكم في الجسم بكميات كبيرة. ويتخلص الجسم من فائض هذه الفيتامينات، إلا في بعض الحالات الاستثنائية. والواقع أن مخاطر الفيتامينات التي تذوب في الماء ترتبط عموماً بتأثيرات الجرعات المفرطة المأخوذة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.

6. الكمية الموصى بها/المأخوذ الموصى به

والمأخوذ المثالي

يشير هذا الأمر إلى الصفحة الممكن العثور فيها على معلومات حول الكمية الموصى بها من هذه المادة، والمأخوذ الموصى به، والمأخوذ المثالي عند توافر

دليل إلى جداول الفيتامينات والمعادن والأحماض

المبين أدناه وفي الصفحة المقابلة وفق الترتيب
الأبجدي لاسم الجنس.

للمثور على معلومات حول فيتامين أو معدن أو حمض
معين، إبحث في الجداول السهلة القراءة بدءاً من
الصفحة 28. لقد ذكرنا الجداول الشبيهة بالنموذج

1 — فيتامين Biotin (المبيّن H)

9 — الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من ألم العضلات
- قد يخفف من الإحباط

10 — من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البيض
التيء المحتوي على مركب الأبيدين Avidin الذي
يثبط البيوتين. (إن طهي البيض يفسد على هذا
المركب ويهدف هذه المشكلة)

11 — أعراض النقص

ملاحظة: نقص هذه المادة نادر جداً
الأطفال

- جفاف فروة الرأس والوجه وظهور القشرة
- الكبد
- للتعيب
- الإحباط
- العثاء
- فقدان الشهية
- فقدان ربات العمل اللاإرادية في العضلات
- لصان شاحب وماع.
- تساقط الشعر
- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم
- فقر الدم
- التهاب باطن جف العين
- تصفم الكبد

كيفية الاستعمال

12 — أهمية هذا الفيتامين

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الماء
- للكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به
- والمأخوذ الطائلي، راجع الصفحة 478

مصادر طبيعية

الكبد	الوز
الاصفري	الموز
اللحم	خميرة البيرة
الطبيب	الأرز البني
الفطر	البرغل
حبز الشوفان	الرودة
دقيق الشوفان	كبد الحمل
زبدة الفول السوداني	الكاجو
الفول السوداني	الحبوب
فلسفون	الدجاج
فول الصويا	البطانيوس
لبازيلا الشفوفة	البيض، مطبوخ
التونة	لبازيلا الخضراء
البندق	العدس

الفوائد

- يساعد على تكوين الأحماض الدهنية
- يسهل استقلاب الأحماض الأمينية والكربوهيدرات.
- يحفز العمل الطبيعي للغدة الكظرية، أنسجة
الأعصاب، النخاع العظمي. الغدة الجنسية الذكرية.
- خلايا الدم والجلد والشعر
- يخفف من أعراض نقص الزنك

البيوتين ضروري للمو الطبيعي والصحة

معلومات متفرقة

تولد جرثيم الأضواء كل البيوتين الذي يحتاج إليه الجسم، ولا يحتاج بالثالي الأشخاص المعتنقون بصحة سليمة إلى تناول مكملات غذائية من البيوتين متوافر في شكل

• أفراس أو كبولات، يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من امتصاص المعدة • البيوتين موجود في معظم المستحضرات المتعددة العنيمات/المعادن



توقف: ملاحظات وتحذيرات

15 لا تتناولوه

في حال عدم وجود أية مشاكل.

16 استشر طبيبكم في حال حدوث مشاكل

17 فوق عمر 55 عاما

ما من مشاكل متوقعة.

18 الحمل

• ما من مشاكل متوقعة

• عدم تناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به

19 الإرضاع

• ما من مشاكل متوقعة

• عدم تناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به

20 تأثيره في التحاليل المخبرية.

21 ما من تأثيرات متوقعة

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر لا تحفظه في الثلاجة

• لحظته في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

• لا تحفظه في حرارة الدواء في الحمام. حال طوية

والحرارة قد تضر من حل العنيمات



الجرعة المفرطة/السمية

22 العلامات والأعراض

إن المكملات المأخوذة وفق الجرعات الموصى بها من قبل الصائمين على الصيغة ليست سامة.

23 ما يجب فعله

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة) الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

24 التأثيرات الجانبية

ما من شيء متوقع في حال تناوله ضمن المأخوذ الموصى به

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع

المضادات الأحيائية

تفسي على الجرثيم

الطوية الأم

"الودودة" الموجودة في

الأضواء التي تنتج

البيوتين. وقد يؤدي ذلك

إلى نقص كبير في

البيوتين.

يفضي على الجرثيم

"الودودة" الموجودة في

الأضواء التي تنتج

البيوتين. وقد يؤدي ذلك

إلى نقص كبير في

البيوتين.

التفاعل مع المواد الأخرى

التحذير يخص الامتناساب. لذلك، قد يحتاج

المدخول إلى مكمل البيوتين

الأطعمة

إن تناول كميات كبيرة من بهاس البهس الذي قد

يسبب نقصاً في البيوتين، البهاس البهس يحتوي على

الأقويين الذي يمد الجسم من امتصاص البيوتين.

تحاليل مخبرية لكشف النقص

لا تتوافر أية اختبارات من هذا النوع إلا لأغراض

تحريية

25

الفيتامينات

26

27

7. مصادر طبيعية

يذكر هذا القسم مصادر الأطعمة والمشروبات التي يمكن الحصول منها على فيتامينات وأحماض ومعادن. إنها مذكورة وفق التسلسل الأبجدي، وليس وفق غنى المصادر بالمادة. إن أردت المزيد من المعلومات عن المصادر الطبيعية، هناك الكثير من الكتب التي تتناول هذا الموضوع.

8. الفوائد

تتألف هذه الفقرة من الفوائد المثبتة، بما في ذلك وظائف الجسم التي تنجزها المادة أو تحسنها. كما تذكر هذه الفقرة الأمراض والمشاكل التي تشفيها هذه المادة أو تحسنها. والواقع أنه تم اختبار هذه الفوائد علمياً بعد دراسات طبية خضعت لإشراف أبرز المسؤولين في هذه المجالات ونشرت في مجلات علمية مشهورة.

9. الفوائد الإضافية المحتملة

يتحدث بعض المؤلفين والعديد من الجرائد والمجلات والبرامج التلفزيونية عن المنتجات بصورة سلبية وغير محقة. تشتمل هذه اللائحة على أقوال غير خاضعة للتدقيق العلمي. قد تكون هذه الأقوال دقيقة بقدر تلك الخاضعة للاختبارات العلمية، لكنها ليست مثبتة في دراسات علمية. فإنتاج مثل هذه الدراسات يستغرق عدة سنوات، ولذلك يجب ذكر هذه الفوائد على أنها فوائد إضافية محتملة. لكن، ألا يركز الطب نفسه أحياناً على هذه الفوائد غير المثبتة علمياً؟

10. من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

إن الأشخاص المذكورين في هذه الفئة يحتاجون إلى رعاية كبيرة لاسترداد صحتهم الطبيعية أو تلبية حاجاتهم من الغذاء وحده. في ما يأتي موجز للمجموعات مع لائحة

بأسباب التي تجعلهم أكثر عرضة للخطر.

كل من يتناول مأخوذاً غذائياً غير ملائم أو له حاجات غذائية متزايدة. يدخل ضمن هذه الفئة الأشخاص الذين لا تتعدى حاجاتهم إلى الطاقة 1200 وحدة حرارية في اليوم. فحصول الجسم على أقل من 1200 وحدة حرارية في اليوم لا يزوده إطلاقاً بالفيتامينات والمعادن الكافية، وتبرز بالتالي الحاجة إلى المكملات. والأشخاص الأكثر عرضة لتناول مأخوذ غذائي غير ملائم هم:

- أصحاب البنية الصغيرة أو الذين يتناولون القليل من المواد المغذية في اليوم للحفاظ على وزن معين.
- الكبار في السن الذين تتضاءل نشاطاتهم اليومية كثيراً، ولا سيما النساء.
- الأشخاص الذين بترت أطرافهم.
- الأشخاص الذين لا يمارسون الكثير من النشاط الجسدي بسبب مرض مقيد للنشاط، مثل مرض القلب أو الخناق الصدري.
- الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية غير ملائمة ومفتقرة إلى التوازن.
- الأشخاص المصابون باضطرابات الأكل مثل الضور أو الشره المرضي.
- الأشخاص النباتيون
- الأشخاص فوق عمر 55 عاماً: هؤلاء الأشخاص قد يتناولون مأخوذاً غذائياً غير ملائم بسبب صعوبة الحصول على الغذاء الملائم أو بسبب الإعاقة والإحباط.
- الحمل: تحتاج المرأة الحامل على الدوام إلى مكملات الحديد وحمض الفوليك. وتحتاج أحياناً إلى مكملات أخرى أيضاً. يتوجب على المرأة الحامل أن تزيد مأخوذها الغذائي بحيث يزداد وزنها من 12 إلى 30 باونداً خلال الحمل. لكن معظم النساء لا تستهلكن ما يكفي من الوحدات الحرارية للسماح بزيادة هذا

بأذى. أما الإفراط في تناول العقاقير الأخرى فيؤدي إلى انخفاض الشهية وتضاؤل الاهتمام بالطعام.

● الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة. تشمل هذه الفئة على الأشخاص المصابين بأمراض سرطانية، أو سوء امتصاص مزمن، أو فرط في عمل الغدة الدرقية، أو انسداد رئوي مزمن، أو مرض قلب احتقاني، أو تليف في المثانة، أو أمراض أخرى. ويزداد الخطر الغذائي لأن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى كميات كبيرة جداً من الوحدات الحرارية والمواد الغذائية التي يصعب إشباعها بواسطة الطعام وحده.

● الأشخاص الذين خضعوا مؤخراً لعملية جراحية: قد تؤدي العملية الجراحية إلى نقص نسبي، حتى لو كان الشخص حسن التغذية قبل إجراء العملية. والأشخاص الذين خضعوا إلى عملية جراحية في جهاز المعدة والأمعاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالنقص خلال مرحلة ما بعد العملية. هنا تبرز أهمية المكملات. لذا، توصف الفيتامينات والمعادن عبر الأوردة إلى أن يتمكن المريض من الأكل. بعد ذلك، يتناول معظم الأشخاص مكملات الفيتامينات والمعادن لعدة أسابيع بعد العملية الجراحية.

● الأشخاص الذين استئصل جزء من معدتهم أو أمعائهم: يحتمل أن يصاب هؤلاء الأشخاص بالنقص بسبب غياب أجزاء مهمة ممتصة للمواد المغذية من القناة المعوية المعوية. يتولى المستحضر المتعدد الفيتامينات والمعادن الحوّل عادة دون ظهور علامات النقص وأعراضه. أما الأشخاص الذين استئصل جزء كبير من معدتهم فعليهم تناول مكملات الفيتامين B-12 لمدى الحياة (بواسطة الحقن عادة).

● الأشخاص المجبرون على تناول الأدوية:

الوزن، وتصبن بالتالي بالنقص الغذائي. يفضي ذلك إلى ضرورة تناول مستحضر مشترك على عدة أنواع من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مكملات منفصلة من حمض الفوليك والحديد.

إسأل طبيبك عن الماركات الموصى بها للمستحضرات المتعددة الفيتامينات والمعادن. واطلبي نصيحته أيضاً بشأن حمض الفوليك والحديد.

المرأة المرضعة. إن المرأة المرضعة التي تتمتع بصحة سليمة قد تحتاج إلى الاستمرار في تناول المكملات، ولاسيما الحديد. استشري الطبيب.

يتحدث معظم الاختصاصيين عن ضرورة تناول مكملات الحديد وحمض الفوليك المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات على نحو منفصل. فالحديد يسبب أحياناً تأثيرات جانبية غير مريحة في الأمعاء والمعدة، مما يجبر النساء على التوقف عن تناول هذه المكملات.

ثمة عنصر غذائي آخر مهم مع الإرضاع ألا وهو الحاجة إلى المزيد من السوائل. فنقص السوائل قد يسبب الإعاقة تماماً مثل النقص الغذائي. لذا، يتوجب على المرأة شرب 8 أكواب من المياه على الأقل كل يوم.

● الأشخاص الذين يشربون الكحول والعقاقير الأخرى: يحتمل أن يصاب هؤلاء الأشخاص بنقص غذائي. فمعظم مأخوذهم اليومي يقتصر على الكحول المفتقرة إلى المواد الغذائية. كما أن شارب الكحول يعانون من سوء امتصاص الطعام وتزايد إفراز المواد المغذية بسبب فقدان السوائل والإسهال. وحين يتوقف إستهلاك الكحول، يمكن معالجة النقص الغذائي بالطعام الجيد والمكملات الغذائية لبعض الوقت، في حال لم يكن الكبد مصاباً

والأقراص والمساحيق والكبسولات وأشكال فموية أخرى.

15. لا تتناوله إذا

يذكر هذا القسم الظروف التي يكون فيها استخدام هذا الفيتامين أو المعدن أو الحمض غير آمن. وفي اللغة الطبية، يطلق على هذه الظروف اسم موانع الاستعمال المطلقة.

16. إستشر الطبيب إذا

يذكر هذا القسم الظروف التي يتوجب خلالها استخدام الفيتامين أو المعدن أو الحمض بحذر. وفي اللغة الطبية، يطلق على هذه الظروف اسم موانع الاستعمال النسبية. والواقع أن استعمال المنتج في مثل هذه الظروف قد يتطلب عناية خاصة من جانب المريض وطبيبهِ، وتسود هنا قاعدة: يفترض بالفائدة المحتملة أن تفوق الخطر المحتمل من حيث الأهمية!

17. فوق عمر 55 عاماً

مع تقدم الإنسان في العمر، تحدث تغيرات جسدية تلزم عناية خاصة عند استخدام الفيتامينات والمعادن والأحماض. في الواقع، يتضاءل عمل الكبد والكليتين، ويصبح الاستقلاب أبطأ، وتحدث تغيرات أخرى. وبما أن هذه الأمور متوقعة، لا بد من أخذها بعين الاعتبار.

إن معظم المواد الكيميائية الداخلة إلى الجسم تستقلب أو تفرز وفق معدل مرتبط بعمل الكبد والكليتين. لذا، يتوجب على المتقدمين في العمر أن يتناولوا جرعات أصغر أو يخصصوا فترات فاصلة أطول بين الجرعات للحؤول دون حدوث تركّز غير سليم للفيتامينات أو المعادن أو الأحماض. وينطبق هذا المبدأ نفسه على العقاقير والأدوية العلاجية. كما أن التأثيرات السمية والتأثيرات الجانبية الحادة والتفاعلات المعاكسة تصبح أكثر تواتراً

هناك العديد من الأدوية التي تؤدي إلى نقص في الفيتامينات والمعادن. وقد ذكرنا هذه الأدوية في قسم "التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن". فالمسهلات، والأدوية المضادة للحموضة وأدوية الصرع وحبوب منع الحمل هي من الأدوية القليلة التي قد تفرض الحاجة إلى مكمل لأنواع معينة من الفيتامينات والمعادن.

● الأشخاص المصابون حديثاً بحروق أو إصابات بالغة: تزداد الحاجة الغذائية كثيراً لدى هؤلاء الأشخاص. ويمكن للجرعات الملائمة من المكملات أن تسرع عملية الشفاء واسترداد العافية. أطلب النصيحة من طبيبك.

11. أعراض النقص

يحتوي هذا القسم على لائحة بأعراض النقص المثبتة التي خضعت لدراسات علمية معمقة ونشرت نتائجها في مجلات علمية مشهورة.

12. أهمية هذه المادة

يتناول هذا القسم شرحاً موجزاً للدور الذي تؤديه كل مادة في التفاعلات الكيميائية أو تأثيرها في النمو والصحة.

13. معلومات متفرقة

إن المعلومات المذكورة في هذا القسم لا يمكن إدراجها في بقية الأقسام، مثل:

- إرشادات الطهو للحفاظ على المادة أثناء إعداد الطعام
 - الفترات الزمنية قبل إمكانية توقع التغيرات
 - معلومات ذات أهمية خاصة
- وفي حال عدم وجود معلومات متفرقة عن مادة معينة، يحذف هذا القسم بالكامل.

14. متوافر في شكل

تتوافر الفيتامينات والمعادن والأحماض عادة في أشكال مختلفة تشمل الحقن

وتسبب مشاكل أكثر خطورة لدى هذه الفئة من الأشخاص.

18. الحمل

يولد الحمل حاجة متزايدة إلى التغذية المثالية، الأمر الذي قد يكون صعباً من دون استعمال بعض مكملات الفيتامينات والمعادن. وترتبط المكملات الواجب تناولها بعمر المرأة، ووضعها الغذائي الحالي، وصحتها وعوامل أخرى. يتوجب على المرأة الحامل التحدث مع طبيبها لتحديد نوع المكملات التي تحتاج إليها ومقدارها. لا يفترض بها تناول أي مادة من دون استشارة الطبيب أولاً.

19. الإرضاع

تحتاج الأم المرضعة إلى تغذية سليمة. لذا، يجدر بها اتباع توصيات طبيبها عن الغذاء والفيتامينات والمعادن خلال هذه المرحلة. لا يجدر بها الامتناع عن طرح الأسئلة المتعلقة بهذه المواضيع المهمة. لكن لا يفترض بها تناول أي مادة من دون استشارة الطبيب أولاً.

20. تأثيره في التحاليل المخبرية:

يذكر هذا القسم الدراسات المخبرية التي قد تتأثر عند تناول الفيتامينات أو المعادن أو المكملات. وتشتمل التأثيرات المحتملة على اختبار إيجابي زائف أو سلبي زائف، مما يؤدي إلى نتيجة مرتفعة أو منخفضة فيما حالتك الصحية هي العكس تماماً. وفي الإجمال، يمكن إنجاز التحاليل المخبرية بدقة فقط بعد التوقف عن تناول الفيتامينات أو المعادن أو الأحماض قبل بضعة أيام من موعد التحليل.

21. الحفظ

يناقش هذا القسم كيفية وأمكنة حفظ الفيتامينات والمعادن والأحماض، مع تذكير مهم: يجب حفظ الدواء بعيداً عن متناول

الأولاد.

21. معلومات أخرى

يشتمل هذا القسم على التحذيرات والإنذارات الخاصة التي لا يمكن إدراجها في الخانات الأخرى. وقد يحتوي هذا القسم على معلومات عن الوقت المثالي لتناول المادة، وتعليمات عن كيفية مزجها أو تخفيفها، أو أي شيء آخر مهم عن هذه المادة. وفي حال عدم وجود تحذيرات أو إنذارات إضافية لمادة معينة، تغيب هذه الفقرة، كما يظهر في الجدول النموذجي.

22. العلامات والأعراض

إن الأعراض المذكورة هنا هي تلك التي يحتمل ظهورها نتيجة السمية أو الجرعة المفرطة العرضية أو المتعمدة. وقد لا يكشف الشخص الذي تناول جرعة مفرطة عن هذه الأعراض، لا بل إنه قد يشهد أعراضاً أخرى غير مذكورة. وفي بعض الأحيان، تكون العلامات والأعراض مماثلة لتلك المذكورة على أنها تأثيرات جانبية أو ردات فعل معاكسة. لكن الفرق يكمن في الحدة والكثافة. عليك أنت أن تكون الحكم. إستشر الطبيب أو اختصاصي السموم إذا شككت في أمر ما.

23. ما يجب فعله

إذا شككت في حدوث تسمم أو جرعة مفرطة، سواء ظهرت الأعراض أو لم تظهر، إتبع التعليمات المذكورة في هذا القسم.

24. التفاعلات المعاكسة أو التأثيرات

الجانبية

إن التفاعلات المعاكسة أو التأثيرات الجانبية هي أعراض قد تحدث عند ابتلاع أي مادة، سواء كانت طعاماً، أو دواءً، أو فيتاميناً، أو معدناً، أو عشبة، أو مكملًا. وتكون هذه التأثيرات غير تلك المرجوة في الجسم.

تبتلعها.

27. تحاليل مخبرية لكشف النقص

في بعض الأحيان، تكون المزايا السريرية، أي التاريخ الطبي والعلامات والأعراض حسب تفسير الاختصاصي، الشيء الوحيد اللازم لإجراء تشخيص دقيق للنقص. وفي أحيان أخرى، رغم أن المزايا السريرية قد توحى بتشخيص معين، تبقى الحاجة إلى تحليل مخبري معين لإثبات البرهان. ويفضل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل الالتزام بمسار علاج طويل، وأحياناً باهظ الثمن أو خطر. لذا، حين تتوافر التحاليل المخبرية بأسعار مقبولة نسبياً، يستطيع الأطباء معالجة مرضاهم بثقة أكبر مما لو اضطروا إلى فعل ذلك من دون تأكيد مخبري للتشخيص. يذكر هذا القسم العديد من هذه التحاليل المخبرية.

ملاحظة: إن تحليل نماذج الشعر للكشف عن نقص المعادن والعناصر الضئيلة ليس اختباراً صالحاً، بالرغم من سهولة توافره تجارياً. فالمعادن والعناصر الضئيلة موجودة في الشامبو ومنتجات العناية بالشعر، وكذلك في البيئة المحيطة. وحين تكون التغذية سيئة لأي سبب كان، يبطئ نمو الشعر، مما يؤدي إلى زيادة تركيز المعادن في الشعر. وكلما ازداد هذا التركيز، جاءت النتائج مرتفعة على نحو زائف. لهذا السبب، تعتبر اختبارات الشعر عديمة الجدوى بالكامل إلا لأغراض تجريبية.

تعني "عبارة تأثير جانبي" التأثير المتوقع، وإنما المحتم، لفيتامين أو معدن أو حمض. فبعض أشكال النياسين مثلاً قد تؤدي إلى دوار كبير وتوهج حار في الوجه والعنق في حال تناول الشخص جرعة كبيرة منه. واللافت أن هذه الأعراض غير مؤذية، لكنها مزعجة أحياناً، ولا علاقة لها بالهدف المرجو من علاج النياسين.

أما عبارة "التأثير المعاكس" فهي أكثر دلالة، إذ إن هذه التأثيرات قد تسبب مخاطر تفوق الفوائد. تطلعك فقرة "ما يجب فعله" على الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة كل تأثير.

25. التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات

أو المعادن

قد تتفاعل الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب في جسمك مع فيتامينات ومعادن ومكملات وأعشاب وأدوية أخرى. لا يهم إن كانت هذه المواد موصوفة من قبل الطبيب أو غير موصوفة، طبيعية أو اصطناعية. تؤثر هذه التفاعلات في امتصاص المواد المتفاعلة مع بعضها بعضاً، أو التخلص منها أو توزيعها. ويكون هذا التفاعل مفيداً في بعض الأحيان، لكنه مميت في أحيان أخرى. لن تستطيع ربما أن تحدد من الجدول ما إذا كان التفاعل جيداً أو سيئاً. لذا، استشر الطبيب أو الصيدلي لأن بعض التفاعلات قد تكون مميتة.

26. التفاعل مع مواد أخرى

تذكر هذه اللائحة التفاعلات المحتملة مع الطعام والمشروبات والدخان ومواد أخرى قد

المكملات والأدوية العشبية

المكملات

المكملات هي مواد كيميائية ليست فيتامينات ولا معادن، وإنما جرى تصنيفها بمثابة مكملات غذائية. وقد كشفت معظم المكملات عن تأثيراتها في الجسم، لكن لم يتم التأكد بعد من سلامتها وفعاليتها عند تناولها في شكل حبوب أو كبسولات لتكملة المأخوذ الطبيعي من الطعام. واللافت أن الفوائد المتوقعة والمزعومة تتخطى كثيراً ما يمكن إثباته في الوقت الحاضر. وتشمل هذه الفوائد الخصائص المقاومة للتقدم في العمر والادعاءات بأن المواد تولد الصحة وتحافظ عليها.

يتوزع الأشخاص على فئتين منفصلتين عند التحدث عن المكملات. فمن جهة، يناشد المبدأ الطبي التقليدي بضرورة "تناول غذاء متوازن للحصول على كل الكربوهيدرات والدهون والألياف والبروتينات والفيتامينات والمواد المغذية المجهرية التي يحتاج إليها الجسم". لكن ثمة معلومات متوافرة اليوم تؤكد أن "غذاءنا الطبيعي والمتوازن" يظهر أننا نعاني من تخمة الأكل وسوء التغذية. ويجمع معظم الخبراء في المجالين الطبي والغذائي على أننا نستهلك الكثير من الوحدات الحرارية، والكثير من الدهون، والقليل من الألياف، والكثير من السكر المكرر، والكثير من الصوديوم، وكمية غير كافية من الكربوهيدرات غير المكررة، مما يصعب علينا الاستمتاع بصحة مثالية من خلال الغذاء وحده.

ومن جهة أخرى، يرى البعض الآخر أن كل مكمل جديد أو كل معلومات جديدة عن المكملات الموجودة هي بمثابة معجزة تشفي أمراضنا شرط أن يفسح لها التيار الطبي المحافظ والجمعية الأميركية للأطعمة والأدوية المجال للقيام بذلك. وقد حقق المعلنون نجاحاً كبيراً مع هذه المجموعة لأن العديد من الأشخاص يقتنعون بسهولة أنهم إذا تناولوا منتجاً معيناً، تصبح صحتهم أفضل حالاً، ويعيشون لفترة أطول، ويبدون بشكل أجمل وأنحف وأكثر جاذبية.

لا تتوافر معلومات كثيرة عن الذين يعتمدون الحل الوسط بين التيارين، علماً أن هذا الحل قد يمثل ربما الحقيقة الفعلية للتغذية البشرية في الوقت الحاضر. وتؤكد من أن هذا الكتاب يعتمد الحل الوسط. وهو لا يعبر عن أي رأي شخصي، وإنما يذكر الإجماع الذي توصل إليه الخبراء.

الأعشاب الطبية

ثمة ارتداد شعبي كبير في الوقت الحاضر ضد الطب التقليدي كما هو ممارس اليوم، إذ إن الممارسة الطبية جلبت لنفسها بعض المشاعر السلبية. يتخذ جزء من هذا الارتداد شكل العودة إلى الطب "الطبيعي"، وبالتحديد إلى واحدة من 2500 عشبة تم استخدامها على مرّ العصور لأغراض طبية. يصف الناس لأنفسهم هذه النباتات ويعتقدون أنهم يوفرون المال والوقت إذا لم يستشيروا طبيبهم. وبما أن هذه الأعشاب الطبية طبيعية وغير خاضعة للضوابط عموماً، يعتقد العديد من الأشخاص أنهم آمنون من

تختلف المكونات النشطة في الأعشاب الطبية، سواء جمعت العقاقير العشبية بنفسك أو اشتريتها من السوق. ومن هذه العناصر المتغيرة نذكر:

- الظروف التي نشأت خلالها النبتة (ظروف التربة، درجة الحرارة، الفصل)
- مدى نضوج النبتة عند قطعها
- طريقة التجفيف
- نوع الحفظ ومدته

في الطب التقليدي، تخضع هذه العوامل المتغيرة إلى رقابة إجراءات التصنيع أو اختبارات الحكومة، بهدف تحديد مقدار المكونات النشطة وبالتالي التكهّن بسلامة المادة وفاعليتها. لكن هذه الضوابط ليست موجودة أبداً في الأعشاب الطبية، إلا إذا أراد المصنّع نفسه فعل ذلك.

أدوية الإرضاء

لطالما اعتبر عنصر الإرضاء ميزة في استعمال الأعشاب الطبية. يزعم معظم العلماء والباحثين أن معظم الأعشاب لا تساعد الأشخاص فعلاً. بل إن الشعور بالرضى نتيجة استخدام هذه الأعشاب هو الذي يؤثر إيجاباً في الصحة. لهذا السبب، باتت تتوفر اليوم أدوية "إرضاء" خالية تماماً من المكونات النشطة من الناحية العقاقيرية أو البيولوجية. ويقول علماء آخرون إن المقادير الصغيرة من هذه الأعشاب لن تؤثر حتماً في الجسم، لكن المقادير الكبيرة قد تفعل ربما.

على مرّ العصور، ساعد المعالجون الأشخاص المرضى على الشفاء، مهما كان مرضهم. واستخدم العديد من المعالجين آنذاك علاجات خالية من أي تأثير عقاقيري في الجسم، لكن هذه العلاجات لم تكن دوماً عديمة

لمخاطر. لكن هذا الأمر ليس صحيحاً.

طوال عدة قرون، جمع الناس الأعشاب لاستخدامها لأغراض طبية. وبالرغم من حُضُوع بعض هذه الأعشاب للتجارب، فإن معظم استخدامات الأعشاب مركزة على روايات شعبية وليس على دراسات علمية. والواقع أن بعض الأدوية الأكثر فائدة، مثل ثقمعية، والراولفيا (المستخدمة لمعالجة لأمراض العقلية وضغط الدم المرتفع)، والكرومليّن (المستخدمة للحؤول دون نوبات التريو) والكورار (مرخية للعضلات)، جاءت كلها من علاجات عشبية "شعبية". صحيح أن الأعشاب قد تكون علاجاً نفسياً للعديد من الأمراض، لكن عليها الخضوع لدراسات علمية مكثفة قبل السماح باستخدامها في الطب السريري.

هناك الكثير من الأعشاب الطبية التي تمتاز بخصائص عقاقيرية نعرف جيداً أنها مفيدة. لكن في الوقت نفسه، قد تكون هذه الأعشاب سامة أو مؤذية. تتوافر الأعشاب الطبية في عدة أشكال، لكن معظمها خضع لفحوصات واختبارات جميعية الأطعمة والعقاقير. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المعالجين بالأعشاب يخضعون مبدئياً لدورات تدريبية في العلاج الصيني التقليدي، ولا يصفون عشبة واحدة فقط وإنما يزعمون أن الفوائد العلاجية تصبح أفضل عند مزج عدة أعشاب معاً.

لقد تحول الناس إلى الأعشاب الطبية لاعتقادهم أنها "طبيعية" وآمنة وفعالة ومذهلة. لكن التجارب علمتنا أن الطب الفعال يكشف أيضاً عن تأثيرات جانبية غير مريحة، وردات فعل معاكسة، وتسبب محتمل، تماماً مثلما تفعل العقاقير الأخرى المصنّعة.

الجدوى، لا بل أثبتت فاعليتها في الغالب.

وفي النهاية، اقتنعت الدراسات الحديثة أن كل العلاجات تساعد في التخفيف من الأعراض لدى بعض الأشخاص. في بداية القرن العشرين، رأى العديد من المرضى والأطباء أن علاجات الإرضاء زائفة، لكننا نعرف اليوم أن هذا الأمر ليس صحيحاً. فعلاجات الإرضاء قادرة على محاكاة تأثير معظم العقاقير النشطة فعلاً. كما أن تأثيرات علاجات الإرضاء حقيقية ويمكن أن تساعد كثيراً العلاجات التقليدية.

كيف يعمل علاج الإرضاء؟ لا نعرف ذلك بالتحديد، بالرغم من وجود العديد من النظريات.

الأندورفينات، وهي مواد كيميائية موجودة في الدماغ، يمكن تنشيطها بواسطة التمارين والإجهاد والتمارين العقلية والتخيل. وعند تنشيط الأندورفينات، يمكنها القضاء على الألم تماماً مثلما تقضي المخدرات على الألم. والواقع أن علاج الإرضاء قادر على تحفيز إنتاج الهرمونات في الجسم، مثل الكورتيزون والأدرينالين. يمكن أن يؤثر ذلك في طريقة تصرفنا وشعورنا وتفكيرنا. وإذا استطاع علاج الإرضاء إثارة إنتاج هذه المواد الكيميائية، ينجح عندها في التخفيف من أعراض الكثير من الأمراض.

لكن الجزء الذي يصعب تفسيره هو دور "قوة الاقتراح" في فاعلية أي علاج، سواء كان عقاراً قوياً أو مكملأً أو عشبة أو علاجاً إرضائياً. وقد تمت دراسة اللعسة الرقيقة للشافي، وطعم المنتج ورائحته، وطريقة توضيبه وشمه. وتبين أن هذه العوامل تؤدي فعلاً دوراً في تأثير علاج الإرضاء.

فهم المصطلحات الشائعة

عند قراءة معلومات عن الأعشاب الطبية، سوف تصادف حتماً المصطلحات والتعابير الآتية. إنها تشير إلى كيفية كشف الأعشاب الطبية عن فوائدها.

رفادة - قطعة قماش منقوعة في سائل عشبي بارد، ومن ثم معصورة وموضوعة مباشرة على الجلد.

مادة مستخلصة - يتم غلي العشبة لمدة 10 أو 15 دقيقة، ومن تركها منقوعة.

خلاصة - محلول ناجم عن نقع العشبة في المياه الباردة لمدة 24 ساعة.

كمادة - قطعة قماش منقوعة في سائل عشبي ساخن، ومن ثم معصورة وموضوعة مباشرة على الجلد.

نقيع - يتم تحضير شاي من خلال نقع العشب في المياه الساخنة. يمكن إعداد النقيع من أي جزء من النبتة.

مرهم - الشكل الذروي للنبتة ممزوج مع مرهم ناعم، مثل اللانولين أو الشمع أو الشحم. **لبخة** - توضع العشبة على قطعة قماش رطبة، ومن ثم تلتصق مباشرة بالجلد.

مسحوق - الجزء المفيد من النبتة مسحوق ومحول إلى ذرور.

شراب - تضاف العشبة إلى سكر أسمر مذوب في مياه مغلية، ويغلى من ثم المزيج ويصفى.

نقاط للتذكير

لا بد من توخي الحذر عند استعمال كل الأدوية العشبية. اقرأ جيداً اللائحة المذكورة في الصفحة 29، وتذكر الأمور الآتية:

● لا يجدر بك إعطاء الأولاد ما دون السنتين أدوية عشبية.

شيوعاً.

اللصائق

تخضع المكملات الغذائية حالياً لقانون المكملات الغذائية الصادر عام 1994. يحدد هذا القانون ضرورة ذكر اللصائق للمعلومات المرتبطة فقط بتركيبية المكمل ووظيفته، وعدم الإشارة مباشرة إلى فاعليته في الحؤول دون مرض ما أو علاجه.

وفي العام 1998، أصبح قانون تحديث منظمة الأطعمة والعقاقير الصادر عام 1997 ساري المفعول. وحسب هذا القانون، بات يسمح للصانعين بذكر المعلومات شرط أن تكون مستندة إلى بيانات حديثة ومصدق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والمؤسسات الطبية الأخرى المتخصصة.

● يتوجب على النساء الحوامل والمرضعات تفادي الأدوية العشبية لأنها تلحق الأذى بالجنين أو الطفل الرضيع.

● لا ننصحك بجمع الأعشاب بنفسك، إلا إذا كنت خضعت لدورات تدريبية مكثفة. فالتعرف الصحيح إلى النباتات ومعرفة كيفية انتقاها وحفظها واستخدامها يتطلب الكثير من المعرفة.

يتناول هذا الكتاب مسألة الأعشاب الطبية بدءاً من الصفحة 177، ويذكر خصائص العديد من النباتات المنتشرة والمستخدمه عموماً في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدد من الأعشاب الأخرى الأقل شيوعاً. تجدر الإشارة إلى أن بعض الأعشاب التي استخدمت بكثرة في الماضي باتت اليوم أقل استعمالاً. لذلك، عمدنا في هذا الكتاب إلى توزيع النباتات على فئتين: "الأعشاب الشائعة" و"الأعشاب الأقل

دليل إلى جداول المكملات والأعشاب الطبية

لقد نظمنا معلومات مكملات الأطعمة والأعشاب الطبية في هذا الكتاب في شكل جداول مكثفة وسهلة القراءة. ووصفنا كل عشبة أو مكمل في جدول معتد على صفحة أو صفحتين، كما هو مبين في الجدول النموذجي في الصفحة التالية. ورتبنا الجداول حسب التسلسل الأبجدي للأسماء الأكثر شيوعاً. وإن لم تتمكن من العثور على الاسم الذي تريده، إبحث في الفهرس عن الأسماء البديلة أو إسأل طبيبك أو الصيدلي عن الأسماء البديلة للاسم الذي تريده.

نظمنا جداول المكملات وجداول الأعشاب الطبية بالطريقة نفسها. إلا أن جداول المكملات لا تحتوي كلها على قسم "الاسم البيولوجي" أو "الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية" وذلك لأسباب جلية.

أ. الاسم الشعبي

يحمل كل جدول عنوان الاسم الأكثر شعبية وشيوعاً. وفي حال وجود أكثر من اسم شعبي واحد، عمدنا إلى ذكر الأسماء البديلة بين قوسين. وفي حال وجود عدة أسماء محتملة للعشبة أو المكمل، سوف تجد الأسماء الأقل شيوعاً مذكورة في قسم "المعلومات الأساسية". يحتوي الفهرس على مرجع لكل اسم مذكور. والجدير بالذكر أن الأسماء الشائعة قد تختلف

بين منطقة وأخرى في العالم.

ب. الاسم البيولوجي (الجنس والنوع)

يعرف هذا القسم بجنس العشبة ونوعها. ولا تزال هذه الأسماء اللاتينية قيد الاستعمال في مجتمع علماء النباتات وعلماء الأحياء. وقد ذكرناها هنا لمساعدتك في التعرف إليها. وبما أن بعض الأعشاب تملك أكثر من اسم بيولوجي واحد، ويشتمل بعضها على عدة أنواع، عمدنا إلى ذكر الجنس أيضاً. لكن جداول مكملات الأطعمة لا تشتمل على هذه المعلومات.

ت. الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

تتurf هنا إلى أجزاء العشبة المستخدمة للحصول على الآثار المرجوة. وغالباً ما تستخدم الجذور والأوراق واللحاء والأزهار لهذا الغرض، فيما تستخدم أحياناً النبتة بأكملها. ملاحظة: لا تشتمل جداول مكملات الأطعمة على هذه المعلومات.

ث. المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

ذكرنا في هذا القسم المواد الكيميائية وأسماء فصائل المجموعات المرتبطة كيميائياً. وتشتمل هذه الأخيرة على الصابونيين وأحماض التنيك والزيوت المتطايرة وأخرى.

ج. التأثيرات المعروفة

يذكر هذا القسم التأثيرات الكيميائية للعشبة الطبية أو المكمل موضوع النقاش. وقد تم التعرف على هذه التأثيرات والمصادقة عليها من قبل العلماء والباحثين. ثمة تأثيرات مفيدة وأخرى مؤذية.

ح. معلومات متفرقة

يحتوي هذا القسم على معلومات لا يمكن إدراجها في الأقسام الأخرى من الجدول. وفي حال عدم وجود أية معلومات إضافية، لا يظهر هذا القسم في الجدول.

خ. التأثيرات الإضافية المحتملة

يحتوي هذا القسم على الأعراض أو المشاكل الطبية التي قيل إن هذا العقار يعالجها أو يحسنها. قد تكون هذه الأقوال صحيحة، لكنها غير مثبتة بعد في الدراسات العلمية.

د. لا تتناوله إذا

تجد هنا الظروف التي يفضل فيها عدم استعمال هذه العشبة أو المكمل للحفاظ على السلامة. وفي اللغة الطبية، يطلق على هذه الظروف اسم موانع الاستعمال المطلقة

ذ. إستشر الطبيب في حال

يذكر هذا القسم الظروف التي يجدر خلالها استخدام هذه العشبة أو هذا المكمل بحذر. وفي اللغة الطبية، يطلق على هذه الظروف اسم موانع الاستعمال النسبية. والواقع أن استعمال الأعشاب أو المكملات في مثل هذه الظروف يحتاج إلى درس مفصل من قبلك وقبل طبيبك. وتذكر أن الفائدة المحتملة يجب أن تفوق كثيراً الخطر المحتمل من حيث الأهمية.

ر. الحمل

كلما تعلمنا المزيد عن الأدوية الفعالة، بما

في ذلك الأدوية العشبية، ازدادت خشية العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الآثار المحتملة لأي منتج طبي على طفل غير مولود بعد. وينطبق هذا الخوف على كل المواد الكيميائية التي تسبب تغيرات في الجسم. والواقع أن الميزة الطبيعية للأدوية العشبية لا تعتقها من إمكانية تسبب الأذى. لذا، يفضل ألا تتناول المرأة الحامل أي شيء إن أمكن.

ز. الإرضاع

رغم أن الطفل الرضيع ليس معرضاً للأذى بقدر الجنين، كوني حذرة. فإذا تناولت دواءً أو عشبة أثناء فترة الإرضاع، إحرصى على فعل ذلك تحت إشراف الطبيب.

س. الأطفال الرضع والأولاد

إن معالجة الأطفال الرضع والأولاد ما دون السنتين بأي مكمل أو مستحضر عشبي محفوف عناية بالمخاطر. فالجرعات والاستعمالات والتأثيرات للمكمل أو العشبة لا يمكن تقديرها بسهولة لدى الولد الصغير. لذا، لا تستخدم أية أعشاب طبية أو مكملات لمعالجة مشكلة يعاني منها ولدك من دون استشارة الطبيب أولاً.

ش. معلومات أخرى

تظهر التحذيرات والتنبيهات في هذا القسم إن لم تتمكن من إدراجها في الأقسام الأخرى.

ص. كيفية الحفظ

يطلعك هذا القسم على كيفية حفظ المكملات والأعشاب بالطريقة المثلى. ولا بد من تذكر أمر مهم: إحتفظ دوماً بالمكملات والأعشاب بعيداً عن متناول الأولاد.

ض. الجرعات الآمنة

لم تحدد منظمة الأغذية والعقاقير الأميركية

ط. السمية

يشتمل هذا القسم على معدل السمية المتوسط لكل مكمل وعشبة طبية.

ظ. التفاعلات المعاكسة، التأثيرات

الجانبية، وأعراض الجرعات المفرطة

إن التفاعلات المعاكسة أو التأثيرات

الجانبية هي أعراض قد تحصل عند تناول

مادة، سواء كانت طعاماً أو دواءً أو فيتاميناً أو

معدناً أو عشبة أو مكملًا. وتكون هذه التأثيرات

مغايرة لتلك المرجوة من المادة.

تعني عبارة "التأثير المعاكس" التأثيرات

التي قد تسبب مخاطر تفوق الفوائد.

أما عبارة "تأثير جانبي" فتعني التأثير

المتوقع، وربما المحتم، لفيتامين أو معدن أو

حمض. فالتأثير الجانبي للجرجار

Horseradish مثلاً قد يكون القثبان. صحيح

أن هذا العرض غير مؤذٍ، لكنه مزعج ولا علاقة

له أحياناً بالهدف الذي استخدمت المادة من

أجله.

إذا شككت في حدوث جرعة مفرطة، سواء

كانت الأعراض موجودة أو لا، إتبع التعليمات

المذكورة في هذا القسم.

لجرعات الأمانة من الأعشاب (والعديد من

لمكملات). لذا، يستحيل علينا ذكر الجرعة

"لأمانة". لكن أصحاب الخبرة في الأعشاب

يستطيعون التكهّن بالجرعات الأمانة إن كانوا

يعرفون عمر الشخص وتاريخه الطبي وبعض

حقائق المهمة عن صحته الحالية.

ويصدر بعض الموزعين المشهورين

مكملات ومنتجات الأعشاب توصيات حول

لجرعات الأمانة لمنتجاتهم. لكن هذه الجرعات

قد تختلف كثيراً بين صانع وآخر، حسب عمر

مستج وبقاوتة. وعليك الإدراك أنه كلما

تناولت المزيد من المنتج لفترة ممتدة من

زمن، ازداد احتمال تعرضك للتسمم. فمعظم

منتجات الأعشاب والمكملات أمانة عند تناولها

جرعات صغيرة لفترات قصيرة من الوقت. لذا،

لا تقع أبداً في شرك التفكير أنه "إذا كان القليل

جيداً، لا بد أن يكون الكثير أفضل".

ويذكر هذا القسم في جداول المكملات

الأشكال المتوافرة من المادة، حتى لو لم تكن

هناك جرعة أمانة موصى بها. إتبع دوماً

تعليمات الصانع ونصيحة الطبيب.

تحذير

معلومات هذا دليل استخدام أو عدم استخدام المكملات والأعشاب ليست

معلومات استشارية. تذكر جيداً من معرفتك ومهنتك كصاحب

معلومات. ولا تترك من المصادر الموثوقة والمصادر الموثوقة

والتي قد تكونت من بعض المكملات قد تسببت من الحساسية على سبيل

الأمثلة من الأدوية التي حصلت لأحمرار الحساسية والتهيج

كيفية استخدام المكملات والمعادن والمكملات والأعشاب

طريقة أمانة

كيفية استخدام الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية بطريقة آمنة

- جيداً إلى محتوياتها.
5. لا تضع الأدوية بالقرب من سريرك، لأنك قد تتناول الجرعة نفسها مرتين فيما أنت شبه نائم أو مرتبك.
6. تعلم أسماء كل المواد التي تتناولها.
7. اقرأ اللصائق الموجودة على الأدوية التي تتناولها. إن كانت المعلومات غير كافية، إسأل الصيدلي عن المزيد من التفاصيل.
8. إن كانت المادة متوافرة في شكل سائل، رجّ العلبة جيداً قبل تناول محتواها.
9. إحتفظ كل الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية في أمكنة باردة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة. لا ينصح عادة بحفظها في خزانات الحمام لأنها ساخنة ورطبة.
10. إن كان الفيتامين أو المعدن أو المكمل أو العشب الطبي يحتاج إلى التبريد، لا تحفظه في الثلاجة.
11. أطلب من الصيدلي أن يعطيك ملعقة قياس لتناول المواد السائلة وقطارة مرقمة لإعطاء الأدوية السائلة إلى الأطفال والأولاد.
12. إتبع تعليمات الصانع أو الطبيب في ما يتعلق بتعليمات الحمية الغذائية. فبعض المنتجات تعمل بصورة أفضل عند تناولها مع الأكل، فيما يفضل تناول منتجات أخرى والمعدة فارغة. كما أن

لعل مقدار الجرعة الواجب تناولها هو التحذير الأكثر أهمية بالنسبة إلى كل الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية. وعلى رغم الآراء الشعبية المذكورة في العديد من مقالات المجلات والجرائد، يمكن أن تسبب الجرعات الكبيرة من بعض هذه المواد خطراً على الصحة. لا تؤمن كثيراً في الإعلانات المثيرة وتتناول جرعات كبيرة. فالاعتقاد أنه "إذا كان القليل جيداً، لا ريب أن الكثير أفضل" هو اعتقاد خاطئ في المنطق العقلاني للمنتجات المخصصة لحماية الصحة. لذا، إحرص دوماً على تناول جرعات معقولة.

1. تعرّف قدر الإمكان إلى الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية قبل تناولها. ومن مصادر المعلومات الصالحة في هذا المجال نذكر هذا الكتاب والمكتبة العامة والطبيب والصيدلي.
2. لا تتناول الفيتامينات أو المعادن أو المكملات أو الأعشاب الطبية الموصوفة لشخص آخر، حتى لو كنت تشهد أعراضاً مماثلة لما يشهده. وفي الوقت نفسه، لا تنصح الآخرين بتناول ما وصفه الطبيب لك، لأن ذلك قد يسبب لهم الأذى.
3. أخبر الطبيب أو الاختصاصي في الرعاية الصحية عن الأعراض التي تشهدها وتظن أنها ناجمة عن شيء تتناوله.
4. تناول الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية بعد التعرف

بعملية جراحية. واحرص أيضاً على ذكر المسهلات، والأدوية المضادة للحموضة، والمنشطات والمستحضرات الشائعة. فالعديد من الأشخاص يعتقدون أن هذه المنتجات آمنة ولا يخبرون الطبيب أو الممرض أو الصيدلي عنها.

16. إعتبر كل الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية مؤذية للأولاد. لذا، إحفظها بعيداً عن متناولهم.

17. إن الكحول والماريجوانا والكوكايين والعقاقير الأخرى المعدلة للمزاج والدخان تسبب تفاعلات مهددة للحياة عند مزجها مع الفيتامينات والمعادن والمكملات والأعشاب الطبية كما أنها تحول دون فاعلية العلاج أو تؤخر العودة إلى الوضع السوي. لذا، يجدر تفاديها كلها.

بعض المنتجات تستلزم اتباع حمية غذائية معينة. فالحمية القليلة الملح مثلاً تعزز فاعلية المنتجات المخصصة لخفض ضغط الدم.

13. تجنّب كل المواد التي تعرف أنك حساس لها.

14. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول أي فيتامين أو معدن أو مكمل أو عشب طبي، توقفي فوراً عن تناوله إلى حين مناقشة الأمر مع الطبيب. أخبري الطبيب بالجرعة التي كنت تتناولينها والفترة الزمنية التي مضت على تناولك لهذه المادة.

15. أخبر الطبيب أو اختصاصي الصحة عن الفيتامينات أو المعادن أو المكملات أو الأعشاب الطبية أو المواد التي تتناولها، حتى لو اشتريتها من دون وصفة طبيب. وهذه المعلومات بالغة الأهمية أثناء المرض أو قبل القيام

الفيتامينات

الفيتامينات، تصيب الجسم أمراض نقص مهددة للحياة، مثل تورم اللثة ونزف الدم منها نتيجة نقص الفيتامين C، أو داء الحُصاف Pellagra الناجم عن نقص النياسين. يعتبر النقص التقليدي نادراً في الولايات المتحدة نتيجة الوفرة الغزيرة للطعام. لذا، تتركز الأبحاث في الوقت الحاضر على كيفية تحسين الصحة عبر الفيتامينات. تجدر الإشارة إلى أن الفيتامينات الموجودة في الأطعمة هي فيتامينات طبيعية، فيما تلك المنشأة في المختبرات هي فيتامينات اصطناعية.

الفيتامين هو كلمة عامة تستخدم للمركبات العضوية غير المرتبطة. تحتوي كل المركبات العضوية على ذرة الكربون. وتتوافر الفيتامينات في مقادير ضئيلة في العديد من الأطعمة وهي منتشرة بكثرة في موردينا الغذائي.

الفيتامينات ضرورية لوظيفة الاستقلاب الطبيعية في الجسم. إنها تشكل جزءاً من الأنزيمات للمساعدة في إتمام التفاعلات الكيميائية في الجسم، وهي مكوّنات في الهرمونات. قد تذوب الفيتامينات في المياه فقط، أو تذوب في الدهون فقط. ومن دون

معلومات أساسية

- البهتا كاروتين Beta-carotene هو مركب من الفيتامين A موجود في النباتات. يتولى الجسم تحويل البهتا كاروتين إلى الفيتامين A.
- أما الريتينول Retinol فيأتي من منتجات حيوانية مثل الكبد وصفار البيض والجبن والحليب.
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الدهون
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

المشمش الطازج	الكبد
الهليون	الحليب
البروكلي	أوراق الخردل الخضراء
الشمام	البقطين
الحزر	السبانخ
البيض	كوسا الشتاء
الهندباء النينة	البطاطا الحلوة
اللنت	الطماطم
أوراق الخس	البطيخ

الفوائد

- يساعد في علاج بعض اضطرابات العين، بما في ذلك التحول دون عمى الليل وتكوّن الماء الأزرق في العين.
- يساعد على نمو العظام والأسنان والقولد.
- يساعد على التكوّن السليم للجلد والشعر والأغشية

المخاطية.

- يعزز مقاومة الجسم للالتهابات التنفسية والالتهابات الأخرى (بما في ذلك داء الحصبة في دول العالم الثالث).
- قد يساعد في معالجة حب الشباب والحصف والجروح المفتوحة والتقرحات عند تطبيقه بشكل خارجي

الفوائد الإضافية المحتملة

- يساعد في ضبط زرق العين
- يحمي من تأثيرات التلوث والضباب الدخاني، إذ إن البهتا كاروتين يعمل بمثابة مقاوم للتأكسد
- يسرّع الشفاء
- يساعد في التخلص من بقع الشيخوخة
- يحسّن جهاز المناعة
- يساعد في شفاء الجروح والشقوق في الجلد
- يعالج ربما فرط عمل الغدة الدرقية

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة
- الذي يعاني من مرض مزمن أو من حمى طويلة الأمد
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية
- الذي تعرض مؤخراً لإصابة أو حرق بالغ
- الأولاد المفتقرون إلى التغذية الملائمة ويعانون من خلل في جهاز المناعة

- مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.
- محلول فموي: يجب تخفيفه في نصف كوب من الماء أو أي سائل آخر. يفضل تناوله بعد ساعة أو ساعة ونصف الساعة من الانتهاء من الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- الفيتامين A موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.
- تتوفر بعض الأشكال في الاسم الأحيائي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

- إذا كانت لديك حساسية تجاه أي مستحضر يحتوي على الفيتامين A.
- لا تتناولي جرعات أكبر من تلك الموصى بها إن كنت تخططين للحمل أو أنك حامل.
- استشر طبيبك في حال المعاناة من:
- تلف البنكرياس الحوصلي
- داء السكري
- مرض معوي مع إسهال
- مرض في الكلى
- مرض في الكبد/تضخم الكبد
- نشاط مفرط للغدة الدرقية
- مرض في البنكرياس
- التهاب الكبد
- الحمل
- الإرضاع
- فوق عمر 55 عاماً
- يزداد احتمال تعرّض الأشخاص الأكبر سناً إلى سوء التغذية، ويحتاجون بالتالي إلى مكمل
- يجب تناول الجرعات بعناية لتفادي التعرض إلى سمية محتملة.
- الحمل
- إن الجرعات اليومية التي تتخطى 5000 وحدة دولية قد تؤخر نمو الجنين وتسبب له تشوهات في مجاريه البولية.
- لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.

أعراض النقص

- عُمى الليل
- عدم إفراز الدمع
- تغيرات في العينين، واحتمال حدوث العمى إن كان النقص حاداً وغير معالج
- التعرض للأمراض المعدية، ولا سيما في الجهاز التنفسي
- بشرة جافة وخشنة
- فقدان الوزن
- نمو سيئ للعظام
- مينا ضعيفة للأسنان
- إسهال
- نمو بطيء
- حب الشباب
- أرق، تعب

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

- ضروري للعمل الطبيعي لشبكة العين (إذ إنه يتحد مع الخضاب الأحمر في الشبكة لتكوين الرودوسين - المادة الضرورية للإبصار في الظلمة الجزئية)
- قد يعمل بمثابة عنصر معاون في أنظمة الأنزيمات.
- ضروري لنمو العظام وعمل الخصيتين وعمل المبايض ونمو الجنين وتنظيم النمو وتخليق الأنسجة.

معلومات متفرقة

- يستغرق نقص الفيتامين A من الغذاء إلى عدة أشهر للكشف عن الأعراض. يخزن الشخص الطبيعي في كبده مورياً يكفي لستين من الفيتامين A
- تتولى الغدة الكظرية إنتاج الستيرويدات التي هي جزء من الاستجابة الطبيعية للإجهاد وعمل جهاز المناعة. لذا، يؤدي الاختفاق في إنتاج هذه الهرمونات المهمة إلى جعل جهاز المناعة في وضع غير مثالي.

متوافر في شكل

- أقراص أو كبسولات، يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها

الإرضاع

● لا تتناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.
تأثيره في التحاليل المخبرية:

● سمية مزمنة في الفيتامين A ارتفاع الغلوكوز في الدم، والنتروجين في بول الدم، والكليسيوم في مصل الدم، والكوليسترول والترايفليسريد في مصل الدم.

● نتائج سوية في اختبار التكيف مع الظلمة (راجع المصدر)

● نتائج سوية في مخطط كهربائية وأرأة العين (راجع المصدر)

● نتائج سوية في مخطط كهربائية الشبكية (راجع المصدر)

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تعبران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

● يكشف الأولاد عن حساسية أكبر تجاه الفيتامين A وهم أكثر عرضة للإصابة بالتسمم عند تناول جرعات أكثر من تلك الموصى بها.

● يقلب التسمم بسيط عند الانقطاع عن تناول الفيتامين A، لكن هذا الأمر قد يستغرق عدة أسابيع.
الجرعة المفرطة/ السمية

العلامات والأعراض

النزف من اللثة أو الفم المتقرح؛ بقع ناتئة ومتورمة في رأس الطفل؛ استسقاء الرأس (ماء على الدماغ)؛ ارتباك أو إثارة غير طبيعية؛ إسهال؛ دوام؛ رؤية مزدوجة؛ صداع؛ احتياج؛ بشرة جافة؛ تساقط الشعر؛ تقشر الجلد في الشفتين وراحتي اليدين وأماكن أخرى؛ تقيؤ؛ تضخم الطحال والكبد.

ملاحظة: تظهر أعراض التسمم عادة بعد 6 ساعات على تناول الجرعات الكبيرة من الفيتامين A. قد تتطور الأعراض تدريجياً وتمتد على فترة أطول من الوقت إن

كانت الجرعات المفرطة أقل حدة. والجدير بالذكر أن الجرعات المفرطة لا تحدث مع البيتا كاروتين، لكن المقدار الكبير من هذا الأخير قد يجعل البشرة صفراء إلى برتقالية اللون.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة

توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية. للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة). الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات

الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
ألم في البطن	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
فقدان الشهية	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ألم في العظام أو المفاصل	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انزعاج، أو تعب أو ضعف	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
جفاف وتشقق البشرة أو الشفتين	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حمى/ارتفاع الحرارة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تساقط الشعر	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
زيادة في تواتر التبول	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ازدياد حساسية الجلد تجاه نور الشمس	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

يستخدم لمعالجة حب الشباب
Retin-A هو مثيل للفيتامين
A ولا يوصى باستعماله أثناء
الحمل والإرضاع
إن المقادير الطبيعية تسهل
امتصاص الفيتامين A
وتخزينه في الكبد واستخدامه.
لكن الجرعات المفرطة قد
تقضي على مخزون الفيتامين
A في الكبد، كما أن تناول
البيتا كاروتين لفترة ممتدة
من الزمن قد يخفض
مستويات الفيتامين E

Retin-A

فيتامين E

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.
إستشر الطبيب. هذه الأعراض
شائعة عند تناول مكمل

احتياج

تقيؤ

البيتا كاروتين

بقع صفراء-برتقالية
في كعب القدمين،
أو راحتي اليدين
أو الجلد المحيط
بالأنف والشفتين.

التفاعل مع المواد الأخرى

الدخان يخفض الامتصاص. لذلك، قد يحتاج
المدخنون إلى مكمل الفيتامين A.
الكحول تعيق قدرة الجسم على نقل الفيتامين A
وإستخدامه

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

قد تلمضي عدة أشهر من النقص قبل أن تكشف التحاليل
المخبرية عن وجوده.

- بلازما الفيتامين A وبلازما الكاروتين
- اختبار التكيف مع الظلمة
- مخطط كهربائية وأرأة العين
- مخطط كهربائية الشبكية

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع
الأدوية المضادة
للحموضة
مكملات الكالسيوم
كولسترامين،
كولستيبول
زيت معدني،
نيوميسين
بدل دهن Olestra
حبوب منع الحمل
التأثير الموحد
يخفض امتصاص الفيتامين A
والفيتامينات D و E و K
القابلة للذوبان في الدهون
قد يخفض فرط الفيتامين A
من تأثير مكمل الكالسيوم
يخفض امتصاص الفيتامين A
يخفض امتصاص الفيتامين A
يخفض امتصاص الفيتامين A
والبيتا كاروتين
يزيد من تركيزات الفيتامين A

الحمض الأسكوربيك (Vitamin C) Ascorbic Acid

مصادر طبيعية

الكشمش الأسود
البروكلي
الكرنب المسوق
الملفوف
الكرنب
عصير البرتقال
البرتقال
البابايا
الفلفل الحلو والحر
البطاطا

معلومات أساسية

متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
هل الوصفة ضرورية؟ لا
قابل للذوبان في الماء
الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ
المثالي، راجع الصفحة 461.

- والحساسية
- يخفف ربما من التهابات العينين والأعضاء التناسلية
 - يحول ربما دون مرض حوالى السن
 - قد يخفف من التأثير السام للكحول والمضدرات
 - قد يساعد في شفاء تقرّحات السرير
 - قد يؤخر الشيخوخة
 - قد يحسن الخصوبة عند الرجال

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تجاوز 55 عاماً
- الذي يعاني من مرض مزمن أو حمى طويلة الأمد أو السيدا أو فرط في عمل الغدة الدرقية أو السل
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية
- الذي استئصل جزء من أعضائه بواسطة عملية جراحية
- الذي يتعرض مؤخراً لإصابة أو حرق بالغ
- الذي يجري غسلاً للكليتين
- الذي يعمل في بيئة سامة
- كل من يكشف عن أعراض الالتهاب

أعراض النقص

- تورم اللثة ونزف الدم منها، ضعف في العضلات، تساقط الأسنان، تعب، إحباط، نزف تحت الجلد ونزف اللثة
- سهولة التعرض للرضوض
- مفاصل مؤلمة أو متورمة
- نزف من الأنف
- فقر دم: ضعف وتعب وشحوب
- التهابات متواترة
- شفاء بطيء للجروح

ليمون الجنة	ثمر الورد البري
الفلفل الأخضر	السبانخ
الجوافة	الفراولة
اللفت	المندرين
الليمون	الطماطم
المانجا	الحرف

الفوائد

- يحسن وضع الأوعية الشعرية واللثة والأسنان
- يساعد على امتصاص الحديد
- يساعد في شفاء الجروح والحروق والمخاطم المكسورة
- يحمي من الاستقربوط (تورم اللثة ونزف الدم منها) ويعالجه
- يعالج فقر الدم، ولاسيما الناجم عن نقص الحديد
- يعالج التهابات المجاري البولية
- يساعد في تكوين الكولاجين في الأنسجة الضامة
- يزيد من امتصاص الكلسيوم
- يسهم في إنتاج خضاب الدم وخلايا الدم الحمراء في النخاع العظمي
- يحول دون إنتاج النيتروسامين، الذي يعتقد أنه مسبب للسرطان
- يساعد الغدة الكظرية في عملها
- يخفف من إنتاج الجذور الحرة

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحول أو يخفف من أعراض الزكام الشائعة والالتهابات الأخرى
- قد يحول دون بعض أنواع السرطان
- قد يخفف الكولسترول
- قد يحمي من مرض القلب
- قد يحول دون تخثر الدم
- قد يحول دون الحساسية
- قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل وتقرّح الجلد

الطبيب بغير ذلك.

- حقن موصوفة من قبل الطبيب أو الممرض.
- الفيتامين C هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله.
- إذا كانت لديك حساسية تجاه الفيتامين C استشر طبيبك في حال المعاناة من
- النقرس
- حصى في الكلى
- فقر الدم المنجلي
- مرض تخزين الحديد
- فوق عمر 55 عاماً
- تزداد الحاجة إلى هذا الفيتامين بسبب انخفاض
- المأخوذ الغذائي
- يزداد احتمال حدوث التأثيرات الجانبية
- الحمل.
- يجب تناول الفيتامينات الخاصة بالجنين مع
- الفيتامين C بسبب الطلب الناجم عن نمو العظام والأسنان وتكون الأنسجة الضامة لدى الجنين.
- إذا تناولت الأم جرعات مفرطة، قد يصاب المولود
- الجديد بأعراض النقص بعد الولادة.
- لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.
- الإرضاع
- يجب الاستمرار في تناول الفيتامينات الخاصة بالجنين لدعم النمو السريع للوليد.
- تأثيره في التحاليل المخبرية:
- مع الجرعات المفرطة (10 مرات أكثر من الجرعة الموصى بها).
- دم في البول - نتائج سلبية زائفة للتحاليل مع
- الجرعات الكبيرة
- LDH و SGOT (راجع المصدر)
- غلوكوز في البول - حسب الطريقة المعتمدة
- مصل بيليروبين - مستوى منخفض زائف
- رقم هيدروجيني pH في البول - مستوى منخفض

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا الفيتامين
- ضروري لتكوين الكولاجين وإصلاح الأنسجة
- يساهم في التفاعلات المخففة للتأكسد (راجع المصدر)
- ضروري لاستقلاب الحديد وحمض الفوليك
- والتيروسين والفينيلالانين
- يساعد على استخدام الكربوهيدرات وتحليل الدهون والبروتين والحفاظ على سلامة الأوعية الدموية
- يعزز قوة الأوعية الدموية
- معلومات متفرقة
- إرشادات في تحضير الطعام للحفاظ على الفيتامين C
- تناول الأكل نيئاً أو مطبوخاً قليلاً
- اختصار وقت الطهو
- سلق الخضار في كميات ضئيلة من المياه
- عدم ترك الطعام في حرارة الغرفة لفترة ممتدة من الوقت
- عدم تعريض الطعام للهواء والضوء
- متوافر في شكل
- أقراص يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف الساعة من الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- أقراص أو كبسولات قوية التأثير: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.
- أقراص قابلة للمضغ: يجب مضغها جيداً قبل ابتلاعها.
- أقراص فوارة: يجب تذويبها بالكامل في السائل قبل ابتلاعه.
- محلول فموي: يجب تخفيفه في نصف كوب من الماء أو أي سائل آخر. يفضل تناوله مع الوجبة أو بعد ساعة أو ساعة ونصف الساعة من انتهائها إلا إذا أمرك

زائف

حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

● قد تؤدي الجرعات الكبيرة إلى تكوّن الحصى في الكليتين، رغم عدم تأكيد الدراسات لهذا الأمر

بالطبيب عند الإمكان

أطلب الإسعاف.

إتصل بالطبيب عند

الإمكان. وإذا قررت

تخفيف الجرعة، إفعل ذلك

تدريجياً للحؤول دون

أعراض النقص.

غثيان أو تقيؤ

أعراض مرتدة شبيهة

يتورم اللثة ونزفها.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
حمض الصفصاف الأميني Aminosalicylic acid	يزيد فرص تكوّن بلورات العقار في البول. يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامين C للحصول على هذا التأثير
مضادات إفراز الكولين Anticholinergics	يخفف من تأثير مضادات إفراز الكولين
مضادات التخثر (فموية)	يخفف من تأثير مضادات التخثر
أسبيرين Barbiturates	يخفف تأثير الفيتامين C يخفف تأثير الفيتامين C يزيد من تأثير الباربيتورات
كلسيوم	يساعد في امتصاص الكلسيوم
نحاس	يخفف امتصاص النحاس. يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامين C للحصول على هذا التأثير
مكملات حديد كيندين quinidine	يزيد من تأثير الحديد يخفف تأثير الكيندين quinidine
أحماض الصفصاف Salicylates	يخفف تأثير الفيتامين C
عقاقير السلفا Sulfa drugs	يخفف تأثير الفيتامين C قد يسبب حصى في الكليتين
تيتراسيكلين Tetracyclines	يخفف تأثير الفيتامين C

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

الأشكال الفموية: نوبات توجّع في الوجه، صداع،
ازدياد التبول، تشنجات في أسفل البطن، إسهال
معتدل، غثيان وتقيؤ. أشكال الحقن: دوار وإغماء.
ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة

توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب.
راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات
الجانبية.

للجرعة المفرطة الفموية (مثل تناول الولد لوجاجة
كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
فقر الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تورّد في الوجه.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ازدياد وتيرة التبول.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تشنجات في أسفل البطن.	أطلب الإسعاف.
إسهال معتدل.	خفف الجرعة. إتصل

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستويات الفيتامين C في بلازما الدم
- قياس مستوى الحمض الأسكوربي في خلايا الدم البيضاء (إنه اختبار باهظ الثمن ويستخدم عادة لأغراض تجريبية)

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفض الامتصاص، لذلك، قد يحتاج المدخنون إلى مكمل الفيتامين C.

الفيتامين B12

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي
- يعالج بعض أمراض الأعصاب
- يعالج فقر الدم الخبيث
- يعالج ويحمي من نقص الفيتامين B-12 لدى الذين استئصل جزء من معدتهم أو أمعائهم بواسطة عملية جراحية.
- يحول دون نقص الفيتامين B-12 لدى النباتيين، والمعانين من أمراض الامتصاص والكبار في السن المصابين بالالكلورديرة (عدم حموضة الكلوريد في العصور المعدي)
- يعالج مرض ألزهايمر

معلومات أساسية

- يطلق على الفيتامين B12 أيضاً اسم cyanocobalamin
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، للجرعات الكبيرة والحقن.
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

لحم العجل	نقانق الكبد
كبد العجل	سمك الاسقمري
الجبن الأزرق	الحليب
البطليونس	المحار
مشتقات الحليب	السردين
البيض	سمك الدهاش
السمك المفلطح	الجبن السويسري
سمك الرنكة	

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يساعد المصابين باضطرابات عصبية
- يحسن ربما المقاومة للالتهابات والأمراض
- قد يحسن الذاكرة والقدرة على التعلم
- قد يزيد من الطاقة

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- الأشخاص النباتيون
- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.

ملاحظة: الفيتامين B-12 غير متوافر في الأطعمة النباتية.

B12، حتى لو تخطت الجرعة اليومية 1000
لبيستيفرام في اليوم.

متوافر في شكل

● حقن وجبرعات فموية. تستخدم الأشكال الفموية
فقط بمثابة مكمل غذائي، فيما توصف الحقن للذين
استنصل جزء من معدتهم أو أمعائهم أو المصابين بفقر
الدم الخبيث

● أقراص يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا
يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد
ساعة أو ساعة ونصف الساعة من الوجبة إلا إذا أصر
الطبيب بغير ذلك.

● أقراص أو كبسولات قوية التأثير: يتم ابتلاعها
كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها.
يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من
اهتياج المعدة.

● حقن موصوفة من قبل الطبيب أو الممرض

● الفيتامين B-12 هو جزء أساسي موجود في العديد
من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناولوه

● إذا كانت لديك حساسية تجاه الفيتامين B-12
المعطى في شكل حقنة (الحساسية تجاه الحقن تشتمل
على الحكاك، والاحمرار، والتورم، وأحياناً انخفاض
ضغط الدم مع فقدان الوعي).

● إذا كنت تعاني من مرض Have Leber

إستشر طبيبك في حال المعاناة من

فقر دم مجهول السبب. يمكن لمكملات الفولات أن

تخجب نقص الفيتامين B-12

فوق عمر 55 عاماً

● يتضائل الامتصاص لدى الكبار في السن
المصابين باللاكلوردية (تضائل حموضة الكلوريد
في العصير المعدي)

الحمل:

● ما من مشاكل متوقعة.

● لا تتناولوا جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به

● الذي يعاني من مرض مزمن أو حمى طويلة الأمد أو
السيدا

● الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة

● الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية

● الذي استنصل جزء من أمعائه بواسطة عملية
جراحية

● الذي تعرض مؤخراً لإصابة أو حرق بالغ

● المصاب بمرض خبيث في البنكرياس أو الأمعاء

أعراض النقص



فقر الدم الخبيث مع الأعراض الآتية

● تعب كبير

● ضعف، خصوصاً في الذراعين والساقين

● ضرب دائم في الأعصاب (لا يُقَلَب)

● تقرّح في اللسان

● غثيان، فقدان الشهية، فقدان الوزن

● خدر ووخز في اليدين والقدمين

● صعوبة في الحفاظ على التوازن

● شحوب في الشفتين واللسان واللثة

● ضيق النفس

● إحباط

● ارتباك وتشوش

● ذاكرة سيئة

● رضوض

كيفية الاستعمال



أهمية هذا الفيتامين

● يعمل بمثابة أنزيم مساعد (راجع المسرد) لتحليل

DNA الطبيعي (راجع المسرد)

● يشجع على الاستقلاب الطبيعي للدهن

والكربوهيدرات وتحليل البروتين.

● يحفز النمو ونمو الخلايا وإنتاج غشاء الخلايا

العصبية والحفاظ على حسن عمل الجهاز العصبي.

معلومات متفرقة

هناك احتمال ضئيل جداً لحدوث تسمم من الفيتامين

حكاك الجلد بعد الحقن (نادر).
أطلب الإسعاف.

الإرضاع

• ما من مشاكل متوقعة.

• لا تتناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به

تأثيره في التحاليل المخبرية

قد تكشف تحاليل البوتاسيوم في المصل عن تدني

مستوى البوتاسيوم في الدم بعد 48 ساعة من بدء

معالجة فقر الدم.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

الحقن هي الشكل الوحيد الفعال لمعالجة فقر الدم

الخبث أو الأشخاص الذين استنصل جزء من معدتهم

أو أمعائهم بواسطة عملية جراحية. هؤلاء الأشخاص

عاجزون عن امتصاص الأشكال الفموية.

الجرعة المفرطة/السمية



العلامات والأعراض

في حال تناول الفيتامين B-12 مع جرعات كبيرة

من الفيتامين C، قد يحدث نزف في الأنف أو الأذنين،

أو جفاف في الفم.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة.

توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب.

راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات

الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة

كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو



التأثيرات الجانبية

ما يجب فعله

التفاعل أو التأثير

توقف عن تناوله، إنصل

فوراً بالطبيب.

إسهال (نادر).

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
حمض الصفصاف	يخفف من امتصاص
الأميني Aminosalicylic acid	الفيتامين B-12
المضادات الحيوية Antibiotics	قد يفضي إلى نتائج منخفضة زائفة للفيتامين
	B-12
كلورامفينيكول Chloramphenicol	قد يحول دون جدوى العلاج عند استخدام
	الفيتامين B-12 لمعالجة فقر الدم
كولستريامين Cholestyramine	يخفف من امتصاص
كولشيسين Colchicine	الفيتامين B-12
إيبوتين Epoetin	يخفف من امتصاص
	الفيتامين B-12
حمض الفوليك	الجرعات الكبيرة تعجب
	نقص الفيتامين B-12
نيوميسين (أشكال فموية)	يخفف من امتصاص
	الفيتامين B-12
الحاجة إلى الفيتامين B-12.	يخفف من امتصاص
	الفيتامين B-12. قد يزيد
	بوتاسيوم (أشكال قوية
	التأثير)

التفاعل مع المواد الأخرى

المدخنين يخفف الامتصاص. لذلك، قد يحتاج

المدخنون إلى مكمل الفيتامين B-12.

تحاليل مخبرية لكشف النقص

• مصل الفيتامين B-12، وهي دراسة شعاعية تنجز

عادة بواسطة اختبار حمض فوليك المصل، المعروف

باختبار Schilling.

• عد الخلية الشبكية.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من ألم العضلات.
- قد يخفف من الإحباط.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من البيض النقي المحتوي على مركب الأفيدين Avidin الذي يثبط البيوتين. (إن طهو البيض يقضي على هذا المركب ويحذف هذه المشكلة).

أعراض النقص

ملاحظة: نقص هذه المادة نادر جداً.
الأطفال:

- جفاف فروة الرأس والوجه وظهور القشرة.
- الكبد:
- التعب
- الإحباط
- الغثيان
- فقدان الشهية.
- فقدان ردة الفعل اللاإرادية في العضلات.
- لسان شاحب وناعم.
- تساقط الشعر.
- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
- فقر الدم.
- التهاب باطن جفن العين.
- تضخم الكبد.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

اللوز	الكبد
الموز	الاسقمري
خميرة الجعة	اللحم
الأرز البني	الحليب
البرغل	الفطر
الزبدة	خبز الشوفان
كبد العجل	دقيق الشوفان
الكاجو	زبدة الفول السوداني
الجبن	الفول السوداني
الدجاج	السمون
البطانيوس	فول الصويا
البيض، مطهو	البازيلا المشقوقة
البازيلا الخضراء	التوتنة
العدس	البندق

الفوائد

- يساعد على تكون الأحماض الدهنية.
- يسهل استقلاب الأحماض الأمينية والكربوهيدرات.
- يحفز العمل الطبيعي للغدة العرقية، أنسجة الأعصاب، النسيج المعظمي، الغدة الجنسية الذكرية، خلايا الدم والجلد والشعر.
- يخفف من أعراض نقص الزنك

إن المكملات المأخوذة وفق الجرعات الموصى بها من قبل الصانعين على اللصيقة ليست سامة. ما يجب فعله

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الود لزجاجة كاملة). الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من شيء متوقع في حال تناوله ضمن المأخوذ الموصى به.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

التأثير الموحد

بتفاعل مع

تقضي على الجراثيم "الودودة" الموجودة في

المضادات الأحيائية الطويلة الأمد

الأمعاء التي تنتج البيوتين. وقد يؤدي ذلك إلى نقص كبير في البيوتين.

يقضي على الجراثيم "الودودة" الموجودة في الأمعاء التي تنتج البيوتين. وقد يؤدي ذلك إلى نقص كبير في البيوتين.

السلفوناميد

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفض الامتصاص. لذلك، قد يحتاج المدخنون إلى مكمل البيوتين. الأطعمة

إن تناول كميات كبيرة من بياض البيض النيئ قد يسبب نقصاً في البيوتين. فبياض البيض يحتوي على الأفيدين الذي يمنع الجسم من امتصاص البيوتين.

تحاليل مخبرية لكشف النقص

لا تتوفر أية اختبارات من هذا النوع، إلا لأغراض تجريبية.

البيوتين ضروري للنمو الطبيعي والصحة.

معلومات متفرقة

تولد جراثيم الأمعاء كل البيوتين الذي يحتاج إليه الجسم، ولا يحتاج بالتالي الأشخاص المتمتعون بصحة سليمة إلى تناول مكملات غذائية من البيوتين. متوافر في شكل

- أقراص أو كبسولات. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.
- البيوتين موجود في معظم المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله

في حال عدم وجود أية مشاكل. استشر طبيبك في حال: حدوث مشاكل.

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة الحمل.

- ما من مشاكل متوقعة
- عدم تناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به. الإرضاع
- ما من مشاكل متوقعة.
- عدم تناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به. تأثيره في التحاليل المخبرية:
- ما من تأثيرات متوقعة.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

الجرعة المفرطة/السمية



العلامات والأعراض

والتهاب الكبد.

• قد يخفف مستوى الكوليسترول في المصل البشري

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

لا أحد.

أعراض النقص

• ترسب الدهون في الكبد.

• نزف في الكلية.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

يشارك الكولين في إنتاج الاستل كولين الضروري

لعمل الجهاز العصبي كما يجب، بما في ذلك المزاج

والسلوك والتوجه والشخصية والحكم.

معلومات متفرقة

• اللستين هو المصدر الأساسي للكولين، إنه يستخدم

بمناوبة مكثف في العديد من الأطعمة، بما في ذلك

المايونيز والمرجرين والبوظة.

• يستطيع البشر تصنيع الكولين من مجموعتي

الإيثانولامين والميثيل المشتقتين من الميثيونين.

متوافر في شكل:

كبسولات يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا

يحوّل مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو

بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمر

الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا نتناوله

في حال كان غذاؤك سليماً وحسن التوازن.

Choline الكولين

معلومات أساسية

• الكولين هو المادة التي تشكل منها الاستل كولين

• متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

• متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

• هل الوصفة ضرورية؟ لا

• الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به

والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461

مصادر طبيعية

اللغت

حليب الثدي

العدس

ملفوف

الشوفان

كبد العجل

القول السوداني

قنبط

فول الصويا

صفار البيض

لستين الصويا

حمص

القمح

الفوائد

• يحافظ على سلامة غشاء الخلايا.

• الكولين هو جزء أساسي في اللستين، المركب

البنوي لجدران الخلايا.

• يعمل الاستل كولين بمناوبة ناقل عصبي.

الفوائد الإضافية المحتملة

• قد يحول دون بعض أمراض الجهاز العصبي، مثل

مرض ألزهايمر، ومرض هانتينغتون، وخلل الحركة

المتأخر (حركات غير طبيعية وإرادية في الوجه

تشمل التكشير وإبراز اللسان وحركات المص).

• قد يخفف من أعراض مرض ألزهايمر.

• قد يخفف من ضرر الكبد الناجم عن شرب الكحول

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية



التأثير	ما يجب فعله
رائحة جسم كريهة.	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن



يتفاعل مع	التأثير الموحّد
ميثوتريكسات Methotrexate	يخفض امتصاص الكولين.
حمض النيكوتينيك Nicotinic acid	يخفض فاعلية الكولين.
فينوباربيتال Phenobarbital	يخفض امتصاص الكولين.

التفاعل مع المواد الأخرى



ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف



النقص

يتم قياس مستويات alanine في المصل والناقلات
الأمينية.

استشر طبيبك في حال:

كنت تنوي استخدام الكولين لمعالجة مرض ألزهايمر
بواسطة اللستين/الكولين.

فوق عمر 55 عاماً

لا تتناوله إن كنت بصحة سليمة.

الحمل.

لا تتناوله إن كنت بصحة سليمة. راجعي الطبيب في
حال أردت طرح الأسئلة.

الإرضاع

لا تتناوله إن كنت بصحة سليمة. راجعي الطبيب في
حال أردت طرح الأسئلة.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

قد يفضي إلى نتائج غير دقيقة في اختبار الكولين
عند فحص سائل السلي amniotic fluid.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

معلومات أخرى

لا تتناول أكثر من غرام واحد كل يوم.

الجراحة المفرطة/السمية



العلامات والأعراض:

غثيان وتقيؤ ودوار

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة

توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب.

راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات
الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة
كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من خطر الإصابة بسرطان الثدي أو القولون.
- ربما يعالج أعراض الشبوخة.
- قد يعالج سوء امتصاص الفيتامين D لدى المعانين من تليف البنكرياس الحوصلي.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- الأولاد القاطنون في أماكن مفتقرة إلى الشمس.
- كل من له مأخوذ تغير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55 عاماً ولا يتعرض كثيراً للشمس (مثل العامل في المؤسسة أو يستخدم فناع الشمس أو يعيش في منطقة غير معرضة كثيراً لأشعة الشمس).
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الذي استئصل جزء من أمعائه بواسطة عملية جراحية.
- الذي تعرض مؤخراً لإصابة أو حرق بالغ.
- صاحب البشرة الداكنة.
- الذي يعاني من مرض في الكبد، مثل تشمع الكبد أو اليرقان
- الأطفال الذين يرضعون.
- النباتي الذي لا يتعرض كثيراً لأشعة الشمس.
- الذي يعاني من تليف البنكرياس الحوصلي.

معلومات أساسية

يطلق على الفيتامين D أيضاً اسم cholecalciferol أو فيتامين أشعة الشمس.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الدهن
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

زيت كبد القد	السلمون
بدائل البيض	السردين
زيت كبد الهلبوت	أشعة الشمس
الرنكة	التونة
الاسقمري	الحليب المقوى
	بالفيتامين D

الفوائد

- ينظم النمو، ويقوي العظام من خلال التحكم في امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الأمعاء الدقيقة.
- يحول دون كساح الأطفال rickets.
- يعالج مستوى الكالسيوم المنخفض في الدم لدى المصابين بمرض الكلى.
- يعالج انقباضات العضلات.
- يعمل مع الكالسيوم لضبط تكوين العظام.
- يشجع على النمو الطبيعي ونمو الأطفال والأولاد.
- يقوي العظام والأسنان.

استشير طبيبك في حال:

- تريد أن تصبحي حاملاً أثناء تناول الفيتامين D.
- واستشره في حال
- المعاناة من الصرع.
- وجود مرض في القلب أو الأوعية الدموية.
- وجود مرض في الكبد أو الكلى أو البنكرياس.
- وجود إسهال مزمن.
- وجود مشاكل في الأمعاء.
- المعاناة من السركويدية Sarcoidosis.

فوق عمر 55 عاماً

يزداد احتمال حدوث التفاعلات المعاكسة والتأثيرات الجانبية. قد تبرز الحاجة إلى تناول المكملات.

الحمل:

- إن تناول الكثير من هذا الفيتامين أثناء الحمل قد يسبب تشوهات للجنين. استشير الطبيب قبل تناول المكمل للتأكد من صحة الجرعات.

- لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به

الإرضاع

- يجب تلقي الجرعة الصحيحة من الفيتامين D.
- بحيث يكون مفيداً لنمو الولد بصورة طبيعية. إسأل الطبيب عن المكملات.

- لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.
- تأثيره في التحاليل المخبرية.

- قد يخفض alkaline phosphatase في العسل.

- قد يرفع مستويات الكالسيوم والكالسترون والفوسفات في نتائج التحاليل.

- قد يرفع مستوى المغنيزيوم في نتائج التحاليل.

- قد يرفع مستوى الكالسيوم والفوسفور في الدم.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

- إن غياب أشعة الشمس يحول دون تكوين الجلد للفيتامين D بصورة طبيعية. فأشعة الشمس توفر

أعراض النقص

- كساح الأطفال (مرض نقص في الطفولة): انحناء الساقين وتقوسهما، تشوه في العظام أو المفاصل، تأخر في نمو الأسنان، عضلات ضعيفة وكسل.
- كساح الكبار: ألم في الضلوع وأسفل الحبل الشوكي والحوض والساقين؛ ضعف وتشنج في العضلات؛ هشاشة في العظام.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

- يمتص ويستخدم الكالسيوم والفوسفور لتكوين العظام.

- ضروري للنمو الطبيعي.

متوافر في شكل

- أقراص أو كبسولات قوية التأثير: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة

- محلول فموي: يجب تخفيفه في نصف كوب من الماء على الأقل، وتناوله مع الوجبات أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهائها إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

- يوضع سائل الفيتامين D مباشرة على الفم أو يخلط مع الحبوب أو عصير الفاكهة أو الطعام.

- الفيتامين D هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

- تتوافر بعض الأشكال وفق الاسم الأحيائي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

لا تتناوله

- إذا كانت لديك حساسية تجاه الفيتامين D أو أي واحد من مشتقاته.

المقادير الكافية من الفيتامين D للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المشمسة. أما الذين يعيشون في المناطق الشمالية ويشهدون فترات ممتدة من الغيوم والظلام ويتعرضون للقليل من أشعة الشمس، فيتوجب عليهم الاعتماد على المصادر الغذائية للحصول على الفيتامين D.

● تجنب الجرعات التي تتخطى المأخوذ الموصى به.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض
ارتفاع ضغط الدم، خفقان قلب غير منتظم، غثيان، فقدان الوزن، نوبات مرضية، ألم في البطن، فقدان الشهية، تأخر في النمو العقلي والجسدي، تصلب مبكر للشرايين وضرب في الكليتين.

ما يجب فعله
لأعراض الجرعة المفرطة
توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب.
راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.
للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.
لأعراض التسمم: توقف عن تناول الفيتامين واطلب فوراً المساعدة الطبية. قد يتوجب عليك الذهاب إلى المستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
فقدان الشهية.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إمساك	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
جفاف الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

صداع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عطش متزايد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ارتباك عقلي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طعم معدني في الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تعب غير اعتيادي	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
مضادات الحموضة مع الألومنيوم	يخفف امتصاص الفيتامين D والفيتامينات A و E و K القابلة للذوبان في الدهون قد يرفع مستويات المغنيزيوم في الدم، خصوصاً لدى المصابين بقصور في الكلى.
مضادات الحموضة مع المغنيزيوم	قد يخفف تأثير الفيتامين D الآتي من مصادر طبيعية مما يفرض الحاجة إلى المكملات للحؤول دون فقدان قوة العظام.
مضادات التشنج	قد يخفف تأثير الفيتامين D الآتي من مصادر طبيعية مما يفرض الحاجة إلى المكملات للحؤول دون فقدان قوة العظام.
باربيتورات Barbiturates	قد يخفف تأثير الفيتامين D الآتي من مصادر طبيعية مما يفرض الحاجة إلى المكملات للحؤول دون فقدان قوة العظام.
كلسيتونين Calcitonin	يخفف تأثير الكلسيتونين عند معالجة فرط الكلسيوم في الدم.
كلسيوم (جرعات كبيرة)	يزيد خطر فرط الكلسيوم في الدم.

قد يخفف تأثير الفيتامين D الآتي من مصادر طبيعية مما يفرض الحاجة إلى المكملات للحؤول دون فقدان قوة العظام. إن تأثيرات الإضافات قد تزيد من احتمال التسمم.

مشتقات الفيتامين D، مثل ergocalciferol, dihydrotachysterol, calciferol, calcitrol

Primidone

كوليستيرامين cholestyramine
كوليستيپول colestipol
كورتيزون
مستحضرات القمعية digitalis

يعيق امتصاص الفيتامين D قد يتطلب المكملات. يعيق امتصاص الفيتامين D قد يتطلب المكملات. يخفف امتصاص الفيتامين D. يزيد احتمال حدوث اضطرابات في خفقان القلب.

مدرات البول، thiazide

يزيد خطر قرط الكليسيوم في الدم.

Hydantoin

قد يخفف تأثير الفيتامين D الآتي من مصادر طبيعية مما يفرض الحاجة إلى المكملات للحؤول دون فقدان قوة العظام.

زيت معدني

يزيد من امتصاص الفيتامين D قد يتطلب المكملات.

أدوية محتوية على الفوسفور

يزيد من خطر ارتفاع مستوى الفوسفور كثيراً في الدم.

أدوية محتوية على الفوسفور

يزيد من خطر ارتفاع مستوى الفوسفور كثيراً في الدم.

الدم.

التفاعل مع المواد الأخرى

الكحول تقضي على مخزون الكبد من الفيتامين D. بدله دهن Olestra يمكنه أن يخفف من امتصاص الفيتامين D.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستويات منخفضة لأشكال الفيتامين D في الدم.
- تساؤل مستوى الفوسفات والكليسيوم في المصل، وازدياد مستويات alkaline phosphatase و rroline urinary hydroxyp وهرمون الدرقية (PTH).
- تصوير العظام بالأشعة السينية.

الفيتامين E

معلومات أساسية

يطلق على الفيتامين E أيضاً اسم

alpha-tocopherol

والنوع D alpha-tocopherol هو النوع الأكثر امتصاصاً.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا، إلا للحقن
- قابل للذوبان في الدهون
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به

والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

اللوز
الهلين
الأفوكادو
جوز البرازيل
البوكلي

الحبوب
الكستناء
الفاول السوداني/زيت الفول السوداني
حبوب وزيت العصفور
زيت فول الصويا

- المولودين قبل أوانهم
- قد يعالج مشاكل البشرة المرتبطة بهاء الذئب.
- قد يخفف من مستويات الجلوكوز في الدم لدى المصابين بالسكري.
- قد يحمي من ضمور البقع أو الماء الأزرق.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55 عاماً.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الذي يعاني من مرض في الكبد أو المرارة أو البنكرياس.
- الذي تعرض مؤخراً لإصابة أو حرق بالغ.
- المصاب بفرط عمل الغدة الدرقية.
- المعرض للذبحة القلبية.
- الذي يعاني من تليف البنكرياس الحوصلي.
- المصاب بالتناثر الجوفي. celiac disease.

أعراض النقص

لدى الأولاد والرضع المولودين قبل أوانهم:

- امتياح
- أوديما Edema.
- فقر الدم الانحلالي.
- لدى الكبار:
- نواق
- جمود الحس.
- عدم القدرة على التركيز
- خلل في عمل الأعصاب.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

- زيت القرقة
- الذرة
- زيت/مرغرين الذرة
- زيت بذور القطن
- زيت القمح
- السيانغ
- بذور دوار الشمس
- الجوز
- القمح

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي.
- يعالج ويحول دون نقص الفيتامين E لدى الأطفال المولودين قبل أوانهم.
- يعمل بمثابة مقاوم لتخثر الدم.
- يشجع على تكوين الخلايا الحمراء في الدم
- يحفز إعادة تدوير الفيتامين C.
- يخفف من خطر الذبحة القلبية المميتة لدى الرجال.
- يحمي من سرطان البروستات.
- يحسن المناعة، خصوصاً لدى المعانين من نقص في الفيتامين E.
- مقاوم للتأكسد (راجع المسرد) في السرطان ومرضى القلب والجذور الحرة والأنسجة في الجسم.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من أعراض التهاب اللبفي في الثدي.
- قد يخفف من مشاكل الدورة الدموية في الأطراف السفلية.
- قد يحول دون مرض القلب التاجي
- قد يحسن الأداء الجنسي.
- قد يحسن قوة العضلات والقدرة على الاحتمال.
- قد يسرع شفاء الجروح والحروق.
- قد يؤخر الشيخوخة.
- قد يخفف من أعراض سن اليأس
- قد يعالج لدغات النحل وطفح الحفاض.
- قد يخفف من الندبات.
- قد يحسن الأداء الرياضي.
- قد يعالج حب الشباب.
- قد يحول دون مشاكل العينين والرتنين لدى الأطفال

- التهاب البنكرياس الحوصلي.
- مرض الكبد.
- نشاط مفرط للغدة الدرقية.
- طفل قليل الوزن عند الولادة (يبدو أن الكمالات تزيد من عمل المناعة).
- فوق عمر 55 عاماً
- ما من مشاكل متوقعة.
- الحمل.
- ما من مشاكل متوقعة إلا عند تناول جرعات أكثر من تلك الموصى بها.
- الأطفال القليلو الوزن عند الولادة هم عرضة لنقص الفيتامين E.
- الإرضاع
- ما من مشاكل متوقعة.
- تأثيره في التحاليل المخبرية:
- قد تبدو مستويات الترياقليسريد والكولسترول في المصل مرتفعة جداً عند تناول جرعات كبيرة من الفيتامين E.
- حفظ المنتج.
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.
- معلومات أخرى
- إحتذر الجرعات التي تتخطى الكمية الموصى بها.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

إن الجرعات المفرطة تقضي على مخزون الفيتامين A في الجسم. أما الجرعات الكبيرة جداً (أكثر من 1000 وحدة دولية في اليوم) فقد تسبب الغثيان والانتعاج والصداع والإغماء والإسهال والميل إلى النزف وتعطل الوظائف الجنسية وازدياد خطر تخثر الدم وتغير الاستقلاب في الغدة الدرقية والهرمونات الكظرية والنخامية.

ما يجب فعله

- يحول دون تفاعل كيميائي اسمه تأكسد oxidation (راجع المصدر). قد يؤدي التأكسد المفرط أحياناً إلى نتائج مؤذية.
- يعمل بمثابة مساعد في العديد من أنظمة الأنزيمات.
- معلومات متفرقة:
- الفيتامين E هو جزء أساسي في العديد من مراحم الحلد ومستحضراته. لم يتم التأكد بعد من جدواه في هذا المجال، لكن تطبيقه بشكل موضعي ربما لا يسبب الأذى.
- قد يستغرق العلاج عدة أسابيع قبل أن تبدأ أعراض النقص بالتحسن.
- التجميد يقضي على الفيتامين E.
- الحرارة المفرطة تؤدي إلى تفكك الفيتامين E، لذا، تجنب قلبي الأطعمة التي تعتبر مصادر طبيعية للفيتامين E.
- يعمل الفيتامين E بمثابة مقاوم للتأكسد (راجع المصدر)، ويحول دون تأثير أنزيمات فوق الأكسيد في الروابط غير المشبعة لأغشية الخلايا ويحمي خلايا الدم الحمراء من الانحلال.
- متوافر في شكل
- أقراص أو كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل، لا يجوز مضغها أو سحقها، يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.
- قطرات: تخفف الجرعة في المشروبات قبل ابتلاعها أو تبخ مباشرة في الفم.
- الفيتامين E هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

- إذا كانت لديك حساسية تجاه الفيتامين E.
- إذا كنت تتناول Coumadin.
- إستشر طبيبك في حال
- المعاناة من فقر الدم نتيجة نقص الحديد.
- وجود مشاكل نزف أو تخثر.

كولستيرامين cholestyramine	قد يخفف امتصاص الفيتامين E.
كولستيپول colestipol	قد يخفف امتصاص الفيتامين E
مكملات الحديد	يخفف من تأثير الحديد في حال فقر الدم نتيجة نقص الحديد. يزيد من تأثير الفيتامين E لدى المتممين بصحة سليمة.
زيت معدني	قد يخفف امتصاص الفيتامين E
Sucralfate	قد يخفف امتصاص الفيتامين E.
فيتامين A	يسهل امتصاص الفيتامين A وحفظه واستخدامه. يخفف من احتمال التسمم بالفيتامين A. يؤدي الجرعات المفرطة من الفيتامين E إلى القضاء على الفيتامين A.

التفاعل مع المواد الأخرى

المدخنون يخففون من الامتصاص. لذا، يتوجب على
المدخنين تناول مكملات الفيتامين E
الكحول تقضي على مخزون الفيتامين E في الأنسجة
بدل دهن Olestra يخفف من امتصاص الفيتامين E

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستويات التوكوفيرول tocopherol في الدم
- فائض كرياتين creatine في الدم للإشارة إلى
تفكك العضلات
- تحليل هشاشة خلايا الدم الحمراء

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة
كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.
لأعراض التسمم: توقف عن تناول الفيتامين واستشر
الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تورم الثديين.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
أمراض شبيهة بالانفلونزا	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تعب أو ضعف	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ارتجاج في الرؤية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
مضادات الحموضة	يخفف امتصاص الفيتامين E.
مضادات التخثر أو الكومادين أو إينداندوين أو المستقر الأسبيرين	قد يزيد من النزف المفاجئ قد يخفف تخثر الدم إلى درجة أكبر مما هو مطلوب لتخفيف خطر الإصابة بمرض القلب.
(استخدام طويل الأمد)	



معلومات أساسية

يطلق على حمض الفوليك أيضاً اسم folacin و pteroylglutamic acid.

يأتي الفولات Folate من مصادر غذائية.

يأتي حمض الفوليك Folic Acid من المكملات.

• متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

• متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

• هل الوصفة ضرورية؟ لا

• قابل للذوبان في الماء

• الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

العيوب في الجهاز العصبي.

• يشجع على النمو الطبيعي.

• يعالج فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك

نتيجة الإدمان على شرب الكحول، أو مرض في الكبد،

أو فقر الدم الانحلالي، أو الحمل أو الإرضاع، أو

استعمال حبوب منع الحمل.

• يساعد في استقلاب الأحماض الأمينية وتحليل

البروتينات (RNA, DNA).

الفوائد الإضافية المحتملة

قد يخفف الفيتامين B-9 من خلل التنسج العنقي.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

• كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية

أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.

• الذي تغطي عمره 55 عاماً.

• المرأة الحامل أو المرضعة.

• المرأة التي تستخدم حبوب منع الحمل.

• الذي يعاني من مرض مزمن، أو من السيدا.

• الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.

• الذي استئصل جزء من معدته أو أمعائه بواسطة

عملية جراحية.

• الذي تعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.

• المرأة التي قد تصبح حاملاً.

مصادر طبيعية

الفاكهة الحمضية

وعصيرها

الهندباء

منتجات الحبوب المعززة

بالمواد المغذية

الحمص

النباتات ذات الأوراق

الخضراء

العدس

براعم النبات

كبد العجل

الشمام

الهلون

الأفوكادو

الموز

الفاصوليا

الشعندر

خميرة الجعة

الكرفس المسوق

الملفوف

بذور القمح

أعراض النقص

• فقر الدم الضخم الأرومات، حيث تصبح خلاله

خلايا الدم الحمراء كبيرة وغير متوازية الحجم.

• حدة الطبع.

• ضعف.

الفوائد

• يشجع على تكوين الخلايا الحمراء في الدم.

• يحافظ على سلامة الجهاز العصبي، الأمعاء،

الأعضاء الجنسية، خلايا الدم البيضاء وأشكال النمو

الطبيعية.

• ينظم نمو الخلايا العصبية لدى الجنين ويحول دون

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل

• ما من مشاكل متوقعة.

• لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.

الإرضاع

• ما من مشاكل متوقعة.

• لا تتناولي جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

قد يفضي إلى نتائج زائفة في اختبارات الفيتامين 12-B.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

إن الميز الغشائي الكلوي Renal dialysis يخفض

مستوى الفولات في الدم، لذا، يجدر بالمرضى

الخاضعين للميز الغشائي أن يتناولوا أكثر من 400

ملغ من حمض الفوليك في اليوم.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

إن الاستخدام الطويل الأمد للجرعات الكبيرة قد يولد

بلورات فولاسين مؤذية في الكليتين. والجرعات التي

تتخطى 1500 ملليغرام في اليوم قد تؤدي إلى

فقدان الشهية، الغثيان، انتفاخ البطن، تورط في البطن

وربما فقر دم خبيث.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول

الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات

العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة

كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

• فقدان الطاقة.

• فقدان الشهية.

• شحوب.

• لسان أحمر ومتقرح.

• أعراض عقلية خفيفة، مثل النسيان والارتباك.

• إسهال.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

• يعمل بمثابة مساعد في تحليل حامض DNA

النوري الطبيعي.

• يعمل بمثابة أنزيم مساعد في تحليل الأحماض

الأمينية والبروتينات النووية.

• يشجع على تكوين الخلايا الحمراء في الدم.

معلومات متفرقة

• يؤدي طهو الخضار إلى فقدانها بعضاً من محتواها

في الفولات Folate.

• في يناير 1998 أطلقت وزارة الصحة الأميركية

برنامجاً لزيادة محتوى الفولات في المنتجات

المحتوية على الحبوب والدقيق.

متوافر في شكل

• أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا

يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد

ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك

الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

تتناولون

لا تتناولون:

• إذا كنت تعاني من فقر الدم الخبيث (فحمض

الفوليك يجعل الدم يبدو طبيعياً، فيما تتطور مشاكل

في الجهاز العصبي قد تستحيل مداواتها لاحقاً).

• إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتشنجات.

استشر طبيبك في حال:

• المعاناة من فقر الدم

• تناول methotrexate.

الفوليك، و Methotrexate

مضاد للفولات

(راجع المسرد)

قد تحتاج النساء اللواتي

تتناولن حبوب منع الحمل

إلى المزيد من حمض

الفوليك أو الفولات في

غذائهن

يخفف من تأثير Phenytoin

يخفف من تأثير حمض

الفوليك ويعيق فاعلية

Pyrimethamine تحبب

هذا الدمج.

يخفف من تأثير حمض

الفوليك

يخفف من تأثير حمض

الفوليك.

يخفف من تأثير حمض

الفوليك.

يخفف من تأثير حمض

الفوليك.

حبوب منع الحمل

Phenytoin

Pyrimethamine

Quinine

Sulfasalazine

وعقاقير سلفا أخرى

Tramterene

Trimethoprim

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من امتصاص. لذا، يتوجب على المدخنين تناول مكملات حمض الفوليك.

الكحول يزيد من احتمال حدوث النقص، والإدمان على الكحول هو السبب الرئيسي لنقص حمض الفوليك في الجسم

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

● فولات المصل.

● خلايا الدم التي تكشف عن فقر دم ضخم الخلايا بالتزامن مع مستويات عادية للفيتامين B-12 في الدم.

● فولات خلايا الدم الحمراء.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

تفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
حـ. أصفر ساطع على الدوام) سعال	لا شيء.
حـ. حرارة مرتفعة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب.
حـ. صيق النفس نتيجة فقر الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حـ. ضعف جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

تفاعل مع	التأثير الموجد
مسكنات الألم	يخفف من تأثير حمض الفوليك
مضادات الحموضة المحتوية على الألومنيوم أو المغنيزيوم	قد يؤدي الاستخدام الطويل الأمد إلى تخفيض امتصاص حمض الفوليك. يجب تناول حمض الفوليك قبل ساعتين من تناول مضاد الحموضة.
المضادات الحيوية	قد يفضي إلى نتائج زائفة في تحاليل حمض فوليك المصل.
مضادات التشنج	يخفف من تأثير حمض الفوليك ومضادات التشنج.
كلورامفينيكول Chloramphenicol	يسبب نقصاً في حمض الفوليك.
عقاقير كورتيزون cortisone	يخفف من تأثير حمض الفوليك.
إيبوتين Epoetin	يخفف من تأثير حمض الفوليك.
Methotrexate	يخفف من تأثير حمض



معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الرصفة ضرورية؟ نعم، للجرعات الكبيرة المستخدمة لتخفيض الكوليسترول
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.



مصادر طبيعية

كبد العجل	الفول السوداني
خميرة الجعة	اللحم الأحمر
الدجاج	البطاطا
اللحم الأبيض	السمون
الفاصوليا/البازيلا	فول الصويا
المجففة	
الحبوب	سمك أبو سيف
سمك الهلبوت	التونة
زبدة الفول السوداني	الديك الرومي



الفوائد

- يعالج الحصف
- يصحح نقص النياسين.
- يخفف مستوى الكوليسترول والترايفليسريد في الدم.
- يوسع الأوعية الدموية في حال تناوله بجرعات أكبر من 75 ملغ (استشر الطبيب).
- يعالج الدوار والطنين في الأذنين.



الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من خطر النوبات القلبية.
- قد يخفف الإحباط.
- قد يخفف صداع الشقيقة.
- يحسن ربما عسر الهضم.



من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55 عاماً.
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن، بما في ذلك الأمراض المزمنة، وقصور البنكرياس، وتشمع الكبد والإسهال.
- الذي يتعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون مع خلل في استقلالهم (اضطرابات خلقية نتيجة تشوهات في الكروموزومات).



أعراض النقص

أعراض مبكرة:

- هذيان
- تعب عام
- فقدان الشهية
- صداع
- لسان أحمر ومتورم.
- آفات في الجلد، بما في ذلك الطفح، الجلد المتشقق، التجاعيد والجلد الخشن.
- عسر الهضم

- حقن يتم وصفها من قبل الطبيب أو الممرض.
- النياسين هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.
- تتوافر بعض الأشكال وفق الاسم الأحيائي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله:

- إن كانت لديك حساسية تجاه النياسين أو أي مزيج فيتامينات يحتوي على النياسين.
- إن كنت تعاني من خلل في عمل الكبد.
- إن كنت تعاني من قرحة هضمية.
- إستشر طبيبك في حال المعاناة من:
 - داء السكري.
 - النقرس.
- مرض الكبد أو المرارة.
- نزف في الشرايين.
- زرق العينين.

فوق عمر 55 عاماً

لا يمكن التكهّن بردة الفعل الحاصلة تجاه النياسين يجب تغير الجرعة وفق حاجات كل فرد.

الحمل:

قد يتعرض الجنين للخطر في حال تناول جرعات مفرطة منه. لا تستخدمه.

الإرضاع

● الدراسات غير حاسمة. استشير الطبيب بشأن المكملات.

● لا تتناول جرعات أكثر من المأخوذ الموصى به.

تأثيره في التحاليل المخبرية

● قد يؤدي تركيز catecholamine في البول إلى رفع النتائج على نحو زائف.

● قد يفضي الغلوكوز في البول إلى تفاعلات إيجابية خاطئة.

● قد يؤدي النياسين إلى رفع السكر في الدم ويزيد خطأً من مستوى هرمون النمو في الدم

● قد تؤدي الجرعات اليومية الكبيرة إلى رفع مستوى حمض اليوريك في الدم.

● التهاب الجلد/انصباح داكن

● إسهال

● حدة الطبع

● دوار

أعراض متأخرة لنقص حاد. يعرف بالحصاف

● جنون

● موت

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

● يساعد في إطلاق الطاقة من الأطعمة.

● يساعد في تحليل حامض DNA النووي.

● يصبح مكوناً في أنزيمات متشاركين (راجع المصدر)، هما NAD وNADP، ضروريين لاستخدام الدهون، تحرق الأنسجة وإنتاج السكريات.

معلومات متفرقة:

● ينتج الجسم النياسين من حمض أميني اسمه تريبتوفان.

● الفيتامين B-6 ضروري لتحويل التريبتوفان إلى نياسين.

● يمكن للجرعات الكبيرة والطويلة الأمد من مكمل اللوسين leucine أن تسبب نقصاً في التريبتوفان والنياسين.

متوافر في شكل

● أقراص أو كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

● أقراص أو كبسولات قوية التأثير: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من امتصاص المعدة.

● محلول فموي: يجب تخفيفه في نصف كوب من الماء على الأقل، وتناوله مع الوجبات أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهائها إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

غثيان أو قيؤ
توقف عن تناوله. إتصل
فوراً بالطبيب.
جفاف الجلد.
توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
مضادات السكري	يخفف من تأثير مضادات السكري.
حاصرات بيتا الأدرينالية التأثير Chenodiol	يخفض مستوى ضغط الدم كثيراً.
يخفف من تأثير Chenodiol	
Guanethidine	يزيد من تأثير Guanethidine.
مثبطات HMG-CoA	يزيد من خطر الأورام العضلية الأرومية وإحفاق الكليتين.
Isoniazid	يخفف من تأثير النياسين.
Mecamylamine	يخفض مستوى ضغط الدم كثيراً.
Pargyline	يخفض مستوى ضغط الدم كثيراً.
Ursodiol	يخفف من تأثير Ursodiol.

التفاعل مع المواد الأخرى

المدخنين يخفف من الامتصاص. لذا، يتوجب على
المدخنين تناول مكملات النياسين

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- Unnary N-1 methylnicotinamide •
- 2-pyridone/N-1 methylnicotinamide •
- Unnary. لكن نتائج الاختبارات ليست دوماً حاسمة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.
- معلومات أخرى

إن الجرعات المفرطة على المدى الطويل قد تسبب
ضرراً في الكبد أو تزيد قرحة المعدة سوءاً.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

توهج في الجسم، غثيان، إسهال، تعب، صداع، إغماء.
ارتفاع مستوى السكر في الدم، ارتفاع مستوى حمض
اليوريك في الدم، خلل في خفقان القلب ويرقان
ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة. توقف فوراً عن تناول
الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات
العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزعجاجة
كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
بول داكن اللون.	لا شيء.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إغماء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
شعور بالحر، مع تورّد الخدين.	لا شيء.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين)	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55 عاماً أو يعاني من نقص في الفيتامين B.
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن، بما في ذلك الإسهال الحاد والمرض الجوفي والتهاب الأمعاء الناحلة.
- الذي يتعرض للإجهاد لفترة طويلة من الوقت.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية
- الأبطال الرياضيون الذين يمارسون نشاطات جسدية قوية.

أعراض النقص

لا توجد أعراض مثبتة على نقص حمض البانتوثيني وحده. غير أن فقدان أحد أنواع الفيتامين B يعني عادة الافتقار إلى مواد مغذية أخرى من الفيتامين B. يتم وصف الحمض البانتوثيني عادة مع فيتامينات B الأخرى في حال ظهور أعراض نقص أي من الفيتامينات B. بما في ذلك التعب المفرط، اضطرابات النوم، فقدان الشهية والغثيان والتهاب الجلد.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين يتحول الفيتامين B5 إلى أنزيم مساعد في استقلاب طاقة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

متوافر في شكل

- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الأفوكادو	اللحوم على أنواعها
الموز	الحليب
الجبنة الأزرق	البرتقال
البروكلي	زبدة الفول السوداني
الدجاج	الفول السوداني
أوراق الملفوف الخضراء	البازيلا
البهس	فول الصويا
العدس	بذور دوار الشمس
الكبد	القمح
الكرنك	منتجات الحبوب الكاملة

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي.
- يساعد في إطلاق الطاقة من الأطعمة.
- يساعد في تحليل العديد من مواد الجسم.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن شفاء الجروح عند الحيوانات.
- قد يخفف من الإجهاد.
- قد يخفف التعب.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة)، الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله، أو خفف الجرعات لتصبح قريبة من المأخوذ الموصى به.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
Levodopa	إن المقادير القليلة من الحمض البانتوثيني تقضي على تأثير Levodopa. لكن المركب Carbidopa -levodopa لا يتأثر بهذا التفاعل.

التفاعل مع المواد الأخرى

المدخنين يخفف من الامتصاص، لذا، يتوجب على المدخنين تناول كميات هذا الحمض.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

لا تزال الطرق محدودة وباهظة الثمن. ويقتصر استخدام التحاليل على الأبحاث في الوقت الحاضر. وتتوافر طرق لقياس مستوياته في الدم والبول على مدى 24 ساعة.

ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

● الفيتامين B5 هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن وفيتامينات المركب B.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

● إن كانت لديك حساسية تجاه الحمض البانتوثيني.
● إن كنت تتناول علاج Levodopa لمرض باركنسون.

استشر طبيبك في حال المعاناة من:

● المزاج النزفي Hemophilia

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل

عدم تخطي الجرعة الموصى بها.

الإرضاع

عدم تخطي الجرعة الموصى بها

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات متوقعة

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

تجنب الجرعات التي تتخطى خمسة أضعاف المأخوذ

الموصى به.

الجرعة المفرطة/السمية

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية

- الذي استئصل جزء من معدته أو أمعائه بواسطة عملية جراحية.
- كل المواليد الجدد.
- الذي يتناول مضادات حيوية لفترة طويلة قد تقضي على الجراثيم "الصدقية" في الأمعاء.
- الذي لا يملك كمية كافية من الصفراء لامتناس الدهون (يجب التعويض عن ذلك بالحقن أو المسحوق القابل للذوبان في الماء).
- الأطفال الرضع.
- الذي يعتمد على الزيت المعدني (للمسك).

أعراض النقص

- لدى الأطفال الرضع
- إخفاق في النمو بصورة طبيعية.
- مرض المزاج النزفي عند المولود الجديد المتجلى في شكل تقبؤ الدم، ونزف دموي من الأمعاء والحبل السري وموقع الختان (تبدأ الأعراض عادة بعد يومين أو ثلاثة أيام من الولادة).
- لدى الكبار
- تخثر غير طبيعي للدم قد يؤدي إلى:
- نزف في الأنف.
- دم في البول.
- نزف في المعدة.
- نزف من الأوعية الشعرية أو الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع سوداء وزرقاء.
- ازدياد وقت التخثر (تحليل مخبري).

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا الفيتامين
- يحفز هذا الفيتامين إنتاج البروترومبين النشط (عامل II) والبروكونفرتين (عامل VII) وعوامل أخرى

معلومات أساسية

- الفيتوناديون والمناديول هما من أشكال الفيتامين K
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم
- قابل للذوبان في الدهون
- الكمية الموصى بها والمأخوذة الموصى به والمأخوذة المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

- الفصفصة
- الهليون
- البروكلي
- الكرنب المسوق
- الملفوف
- جين الشيدر
- أوراق الخس الخضراء
- الكبد
- الطحلب البحري
- السبانخ
- أوراق اللفت الخضراء

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي
- يحول دون مرض المزاج النزفي عند المولود الجديد.
- يعالج مشاكل النزف الناجمة عن نقص الفيتامين K.
- ينظم تخثر الدم الطبيعي.
- يحسن صحة العظام

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد إضافية معروفة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

ضرورة للنخثر الطبيعي الدم

معلومات متفرقة

• يضع القليل من الفيتامين K أثناء معالجة الطعام أو طهوه.

• عند حدوث اضطراب حاد في النزف نتيجة نقص الفيتامين K، قد يتوجب تغيير كامل دم المريض أثناء نوبات النزف الحادة.

متوافر في شكل

• أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

• حقن يتم وصفها من قبل الطبيب أو الممرض.

• أقراص قابلة للذوبان في الماء والسوائل.

ملاحظة: الفيتامين K غير مدرج عادة في المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

الإرضاع

عدم تخطي الجرعة الموصى بها.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

يغير أوقات البروثرومبين.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

• تجنب الجرعات المفرطة. الفيتامين K قابل للذوبان

في الدهن. قد يؤدي المأخوذ المفرط منه إلى خلل في عمل الكبد.

• عليك إخبار طبيب الأسنان الذي يريد إجراء جراحة لك بأنك تتناول الفيتامين K.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

أذى في الدماغ لدى الأطفال الرضع وخلل في عمل الكبد لدى الأطفال والكبار الذين يتناولون جرعات كبيرة.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول

الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العكسية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

فقر دم انحلالي أطلب الإسعاف

لدى الأطفال

فرط تصفّر الدم أطلب الإسعاف.

(الكثير من ياقوتين

الصفراء في الدم) لدى

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه

• إن كانت لديك حساسية تجاه الفيتامين K.

• إن كنت تعاني من نقص G6PD (راجع المسرد)

• إن كنت تعاني من مرض في الكبد.

استشر طبيبك في حال.

• تليف البنكرياس الحوصلي.

• إسهال مزمن.

• مشاكل مزمنة في الأمعاء.

• تناول أدوية أخرى.

• تنوي الخضوع لعملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) في المستقبل القريب.

فوق عمر 55 عاماً

• ما من مشاكل متوقعة.

• عدم تخطي الجرعة الموصى بها.

الحمل

• ما من دراسات متوافرة على البشر. يفضل تفاديّه عند الإمكان.

• عدم تخطي الجرعة الموصى بها.

المواليد الجدد أو الأطفال الذين تلقوا الكثير من فيتامين K، ويظهر ذلك في شكل يرقان (اصفرار الجلد والعينين) تورّد في الوجه.	Primaquine	يزيد احتمال حدوث التأثيرات الجانبية السمية بسبب نقصاً في الفيتامين K.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	Quinidine	يزيد الحاجة إلى الفيتامين K عند تناوله لفترة طويلة يخفف من تأثير الفيتامين K.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	Salicylates	عقاقير سلفا
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	Sucralfate	يسبب نقصاً في الفيتامين K.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- وقت البروثرومبين.
- بروثرومبين في المصل.
- الفيتامين K في المصل.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع مضادات الحموضة (استخدام طويل الأمد).	التأثير الموحد قد تتداخل المقادير الكبيرة مع تأثير الفيتامين K.
مضادات حيوية قوية التأثير (استخدام طويل الأمد). K.	يسبب نقصاً في الفيتامين
مضادات التخثر (عبر الفم). يخفف من تأثير مضاد التخثر.	
Cholestyramine	يخفف من امتصاص الفيتامين K.
Colestipol	يخفف من امتصاص الفيتامين K.
Coumarin (معمّل عن البرسيم الحلو)	يخفف من تأثير الفيتامين K.
Dactinomycin	قد يخفف من تأثير الفيتامين K.
Hemolytics	يزيد احتمال حدوث التأثيرات الجانبية السمية. يسبب نقصاً في الفيتامين K.
زيت معدني (استخدام طويل الأمد).	

- يعمل بمثابة مهدئ:

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن العمل الطبيعي للأعصاب والعضلات.
- قد يخفض مستوى الكولسترول في الدم
- قد يخفف الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل وتناذر النفق الرسغي.
- قد يحول دون تصلب الشرايين لدى الذين يكتشفون عن مستويات مرتفعة من السستين المثلي.
- قد يخفف أعراض تناذر ما قبل الطمث.
- قد يخفف من أعراض داء الربو.
- قد يشجع على النوم من خلال زيادة السيروتونين.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يتعرض للإجهاد لفترة طويلة من الوقت.
- المرأة التي تتناول حبوب منع الحمل أو الإستروجين.

- المصاب بفقرط عمل الغدة الدرقية.
- الذي يحتوي دمه على مستويات عالية من السستين المثلي

أعراض النقص

- ليست أعراض نقص الفيتامين B6 محددة ويصعب محاكاتها مخبرياً
- ضعف
- ارتباك عقلي

معلومات أساسية

يطلق على البيريدوكسين أيضاً اسم pyridoxal phosphate.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الأفوكادو	العسل
الموز	البطاطا
كبد العجل	السلمون
الدجاج	الجمبري
الحبوب	فول الصويا
لحم البقر المطحون	بذور دوار الشمس
اللحم الأحمر	التونة
الكستناء	القمح

الفوائد

- يسهم بنشاط في العديد من التفاعلات الكيميائية الخاصة بالبروتينات والأحماض الأمينية.
- يساعد على العمل الطبيعي للدماغ
- يشجع التكون الطبيعي لخلايا الدم الحمراء
- يساعد في إنتاج الطاقة.
- يعمل بمثابة أنزيم مساعد (راجع المسرد) في استقلاب الكربوهيدرات والبروتينات والدهون
- يعالج بعض أشكال فقر الدم.
- يعالج التسمم.
- يحافظ على مستويات طبيعية للسستين المثلي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

- إن كان لديك حساسية تجاه الفيتامين B-6
- استشر طبيبك في حال
- التعرض لإجهاد قوي بالتزامن مع مرض أو حرق أو حادث أو عملية جراحية.
- مشاكل في الأمعاء.
- مرض في الكبد.
- قرط في عمل الغدة الدرقية.
- مرض الخلايا المنجلية.

فوق عمر 55 عاماً

هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بنقص هامشي.

الحمل

- عدم تغطي المأخوذ الموصى به. يمكن أن تؤدي الجرعات الكبيرة إلى تناذر الاعتماد على البيريديوكسون عند الولد.

الإرضاع

- إن الجرعات الكبيرة (أكبر من المأخوذ الموصى به) قد تفضي إلى تأثيرات جانبية خطيرة لدى الطفل الرضيع.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

- قد يفضي إلى نتائج إيجابية زائفة في قياس البيلينوجين البولي باستعمال الكاشف Ehrlich حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

- يوصى بتناول المكملات B-6 في حال تناول chloramphenicol أو cycloserine أو hydralazine أو isoniazid أو penicillamine أو مخدرات جهاز المناعة. فهذه تخفض من امتصاص البيريديوكسين وقد تسبب فقر الدم أو الشعور بالخدر والوخز في اليدين والقدمين

• حدة الطبع

• عصبية

• أرق

• سوء تناسق في المشي.

• نشاط مفرط.

• تخطيط غير طبيعي للدماغ

• فقر دم.

• آفات جلدية.

• تغير لون اللسان

• ألم حاد في العضلات.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

- يعمل بمثابة أنزيم مساعد (راجع المسرد) في استقلاب الوظائف المرتبطة بالبروتينات والكربوهيدرات والدهون.

- يشجع على تحويل التريبتوفان إلى نياسين أو

سهرتونين

معلومات متفرقة.

تجنب طهر الأطعمة المحتوية على الفيتامين B-6

بكميات كبيرة من المياه.

متوافر في شكل

- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل، لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

- أقراص أو كبسولات قوية التأثير: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل، لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده لتفادي احتياج المعدة.

- الفيتامين B-6 هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن ومركبات الفيتامين B.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموجد
Chloramphenicol,	قد يزيد من إفراز
cycloserine,	البيريديوكسين ويسبب
ethionamide,	فقر الدم أو التهاب
hydralazine, isoniazid,	العصب المحيطي، مما
penicillamine	يسبب الألم والخدر
وقاصمات جهاز المناعة	والبرد في اليدين
(مثل mercaptopurine,	والقدمين، في حال
cyclosporine,	تناول هذه الأدوية، قد
cyclophosphamide,	تحتاج إلى المزيد من
chlorambucil,	البيريديوكسين، إستشر
azathioprine,	الطبيب.
adrenocorticoids,	
(ACTH)	
الاستروجين أو حبوب	قد يزيد من الحاجة إلى
منع الحمل.	البيريديوكسين ويسبب
	الإحباط. إتصل
	بالطبيب.
Levodopa	يمنع Levodopa من
	ضبط أعراض مرض
	باركنسون، لكن هذه
	المشكلة غير موجودة مع
	مركب carbidopa
	-levodopa.
Phenytoin	إن الجرعات الكبيرة من
	B-6 تسرع تفكك
	الفينيتوين.

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص. لذا، يتوجب على المدخنين تناول مكملات الفيتامين B-6.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستوى البيريديوكسين في الدم.
- مستوى حمض Xanthurenic في البول.

الجرعة المفرطة/السمية

• يصبح الفيتامين 6-8 ساماً عند تناوله بجرعات كبيرة (100-250 ضعف الجرعة الموصى بها)، مما يؤدي إلى خلل دائم في الأعصاب.

• قد يؤدي فائض هذا الفيتامين إلى تزايد الأكسالات في البول، مما يكوّن الحصى. العلامات والأعراض خدر في اليدين والقدمين. ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة، توقف فوراً عن تناول الفيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى. التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
الإحباط عند تناوله	توقف فوراً عن تناول
مع حبوب منع الحمل،	البيريديوكسين، إتصل
	بالطبيب عند الإمكان.
جرعات من 200 ملغ/اليوم	توقف تدريجياً من
قد تسبب الإدمان عليه.	تناول الجرعات الأكبر
وبالتالي الحاجة إلى تناول	من الجرعة الموصى بها.
جرعات أكبر منه	
(وهذا أمر غير مرغوب)	

إن تناول جرعات كبيرة (2 إلى 6 غرامات/اليوم) على مدى عدة أشهر قد يسبب علة حادة في الأعصاب (راجع المسرد) مع مشية غير ثابتة، وخدر في اليدين والقدمين وعدم الكياسة.

■ قد يعالج التهاب الشفتين.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يتعرض للإجهاد لفترة طويلة من الوقت.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الرياضيون والعاملون الذين يمارسون نشاطات جسدية قوية.
- الذي يعاني من فرط عمل الغدة الدرقية.

أعراض النقص

- متشققات وقرحات في زوايا الفم.
- التهاب اللسان والشفتين
- عينان حساستان بإفراط للضوء.
- حكاك وتقشر في الجلد المحيط بالأنف والفم والجبين والأذنين وفروة الرأس.
- ارتعاش
- أرق

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

- يعمل بمثابة جزء أساسي في أنزيمين مساعدتين (راجع المصدر)، هما الفلافين الأحادي النواة والفلافين أدينين الثنائي النواة، ضروريين لتنفس الأنسجة بشكل طبيعي.
- ينشط البيريدوكسين
- يعمل بالتزامن مع بقية الفيتامينات B.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الموز	الخضار المتنوعة
كبد العجل	
مشققات الحليب	
البيض	التونة
الخبز	القمح
الحبوب المعززة بالمواد المغذية	

الفوائد

- يساعد في إطلاق الطاقة من الأطعمة.
- يحافظ على سلامة الأغشية المخاطية التي تكسو المجاري التنفسية والدموية والإفرازية عند استخدامه بالتزامن مع الفيتامين A.
- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي والجلد والعينين.
- يشجع على النمو الطبيعي
- ينشط الفيتامين B-6.
- ضروري لتحويل التريبتوفان إلى نياسين.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن نمو الجسم أثناء مراحل النمو الطبيعية.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

الجرعة المفرطة/السمية

ليس محتملاً أن يحدث الفيتامين B-2 أعراضاً سمية لدى الأشخاص غير المعانين من مشاكل في الكلى. العلامات والأعراض: ما من أعراض متوقعة ما يجب فعله

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
بول أصفر (مع الجرعات الكبيرة).	لا حاجة للقيام بأي شيء.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموجد
مضادات الإحباط	يخفف من تأثير B-2.
Phenothiazines	يخفف من تأثير B-2.
Probenecid	يخفف من تأثير B-2.

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص. لذا، يتوجب على المدخنين تناول مكملات الفيتامين B-2. الكحول تحول دون امتصاص الفيتامين B-2.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- الريبوفلافين في المصل.
- الريبوفلافين في الكريات الحمر.
- أنزيم غلوتاثيون المرجع

معلومات متفرقة

- يحول الغذاء المتوازن دون حدوث نقص من دون تناول المكملات.
- قد تؤدي الجرعات الكبيرة إلى جعل لون البول أصفر داكن.
- قد تخفض كمية الفيتامين B-2 في الأطعمة عند معالجتها.
- إن مزج هذا الفيتامين مع بيكربونات الصودا يقضي على الريبوفلافين.
- إن تعريض الفيتامين لأشعة الشمس يقضي على الريبوفلافين. إحتفظ الحليب في أواني بلاستيكية أو أوعية كرتونية.
- متوافر في شكل أقراص. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده لتفادي احتياج المعدة.
- الريبوفلافين هو جزء أساسي موجود في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن ومركبات الفيتامين B.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله

- إن كان لديك حساسية تجاه أي واحد من الفيتامينات B
- تعاني من قصور مزمن في الكلى.
- استشر طبيبك في حال الحمل أو التخطيط للحمل.
- فوق عمر 55 عاماً.
- لديه حاجة أكبر إلى الفيتامين B-2 الحمل
- عدم تناول جرعات أكبر من المأخوذ الموصى به.
- الإرضاع
- عدم تناول جرعات أكبر من المأخوذ الموصى به.
- تأثيره في التحاليل المخبرية.
- قد يكشف تركيز catecholamine في البول عن ارتفاع زائف.
- قد يفضي تهابس الصفراء في البول إلى نتائج إيجابية زائفة.
- حفظ المنتج.
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

الحروق.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من الإحباط.
- قد يخفف من التعب.
- قد يخفف من دوّار الحركة.
- قد يحسن الشهية واليقظة العقلية.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمر 55 عاماً.
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- الذي يعاني من مرض مزمن، ولا سيما داء السكري.
- الذي يتعرض للإجهاد لفترة طويلة من الوقت.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الذي يعاني من مرض في الكبد أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو إسهال مزمن.

أعراض النقص

النقص الطبيعي:

- فقدان الشهية
- تعب
- غثيان
- مشاكل عقلية، مثل الإحباط، فقدان الذاكرة، صعوبة التركيز وفهم التفاصيل، تغيرات في الشخصية وخفقان سريع للقلب
- مشاكل في المعدة أو الأمعاء
- عضلات مؤلمة ومتورمة.
- اعتلال دماغي

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم للحقن
- قابل للذوبان في الماء
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 476.

مصادر طبيعية

عصير البرتقال	لبطاطا المشوية
البرتقال	كبد/كلية العجل
المحار	حميرة الجعة
فول الصويا	لحبق والجاودار
البازيلا	حبوب الكاملة
الزبيب	الحمص المجفف
الأرز البني والنيء	اللحم الأحمر
منتجات الحبوب الكاملة	الفاصوليا الكبيرة
	المجففة
	الفاصوليا الحمراء، المجففة

الفوائد

- يحافظ على سلامة الأغشية المخاطية.
- يحافظ على العمل الطبيعي للجهاز العصبي، العضلات والقلب.
- يساعد في معالجة القوياء المنطقية.
- يشجع على النمو الطبيعي.
- يعالج البري بري (مرض نقص الثيامين).
- يعوّض عن النقص الناجم عن تشمع الكبد أو العمل المفرط للغدة الدرقية أو الالتهاب أو الإرضاع أو الأمراض المعاصرة أو الحمل أو الإسهال الطويل الأمد أو

- الحقن الموصوفة من قبل الطبيب أو المعرض.
- متوافر في شكل جزء من مركبات الفيتامين B

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله.

إن كان لديك حساسية تجاه أي من الفيتامينات B.

استشر طبيبك في حال:

المعاناة من مرض الكبد أو الكلى

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل

عدم تناول جرعة أكبر من المأخوذ الموصى به.

الإرضاع

عدم تناول جرعة أكبر من المأخوذ الموصى به.

تأثيره في التحاليل المخبرية

يعرقل نتائج الثيوفيلون في المصل وقد يفضي إلى

نتائج إيجابية زائفة في اختبارات حمض اليوريك أو

صفراء البول

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل الفيتامين.

معلومات أخرى

يفرّز معظم فائض الثيامين في البول إن كان عمل

الكليتين طبيعياً.

الجرعة المفرطة/السمية

تسبب الجرعات الكبيرة من الفيتامين B-1 أحياناً

حساسية قوية شبيهة بصدمة استهدافية. وتؤدي ميزات

المليغرامات الفائضة إلى إحداث دوار عند بعض

الأشخاص.

العلامات والأعراض:

خدر في اليدين والقدمين.

ما يجب فعله

التخلص الكبير.

● يؤدي في النهاية إلى مرض البري البري النادر

نوعاً ما، لكنه يصيب المدمنين على الكحول.

● ألم أو وخز في الذراعين أو الساقين.

● تراكم السوائل في الذراعين والساقين.

● تضخم القلب.

● إمساك.

● غثيان.

● تقيؤ.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الفيتامين

يعمل الثيامين بالترزامن مع adenosine

triphosphate لتكوين أنزيم مساعد ضروري لتحويل

الكربوهيدرات إلى طاقة في العضلات والجهاز

العصبي.

معلومات متفرقة:

● يجب طهو الأطعمة بأقل مقدار من المياه أو البخار.

● تجنب طهو الأطعمة في درجات حرارة مرتفعة أو

لمدة طويلة.

● تجنب استعمال بيكربونات الصودا عند تناول

الثيامين إلا إذا كان مستخدماً بمثابة عامل تخمير في

المنتجات المخبزة.

● يبقى الثيامين ثابتاً عند تجميده وحفظه.

● يفترض بالغذاء المتوازن أن يوفر كمية كافية من

الثيامين للأشخاص السليمين، مما يبطل الحاجة إلى

المكملات. والواقع أن الحبوب الكاملة واللحم الأحمر

هما من أفضل المصادر الغذائية للثيامين.

متوافر في شكل

● أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا

يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد

ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر

الطبيب بغير ذلك.

● سائل: يذوّب في نصف كوب من الماء أو العصير.

يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من

انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص لذا، يتوجب على المدخنين تناول مكملات الفيتامين B-1. المشروبات. يؤدي الكربونات والسترات (الإضافات المذكورة على العديد من لصائق المشروبات) إلى خفض تأثير الثيامين. الأطعمة. يؤدي الكربونات والسترات (الإضافات المذكورة على العديد من لصائق الأطعمة) إلى خفض تأثير الثيامين.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- دراسة عمل transketolase في خلايا الدم الحمراء.
- مستوى الحمض البيروفي في الدم.
- جمع البول على مدى 24 ساعة.

• أعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول فيتامين واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات لعكسية أو التأثيرات الجانبية

• جرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

تفاعل أو التأثير ما يجب فعله
ضع جلدك أو حكاك توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بأقرب مستشفى.
ورم في مساحة الوجه. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بأقرب مستشفى.
صغير في التنفس أطلب الإسعاف
مصرفاً بعد جرعة ضمن الأوردة

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
المضادات الحيوية أو عقاقير سلفا.	يخفض مستويات الثيامين.
العقاقير المستخدمة لإرخاء العضلات أثناء العملية الجراحية.	يفضي إلى استرخاء مفرط في العضلات. أخبر الطبيب قبل الجراحة إن كنت تتناول المكملات.
حبوب منع الحمل.	يخفض مستويات الثيامين.
علاج الاعتلال الدماغي.	تناول الثيامين قبل تناول الغلوكون.

المعادن

هناك العديد من المعادن التي تشكل جزءاً أساسياً من الأنزيمات. وهي تسهم أيضاً في تنظيم العديد من الوظائف الفيزيولوجية، مثل نقل الأوكسجين إلى كل واحدة من خلايا الجسم، وتوفير الشرارة لجعل العضلات تتقلص، والمشاركة في عدة سبل لضمان العمل الطبيعي للجهاز العصبي المركزي. والمعادن أساسية للنمو وصحة الأنسجة والعظام وميانتها.

تتوافر معظم المعادن في الأطعمة. ولا تشيع حالات حادة لنقص المعادن في الولايات المتحدة وكندا. وكما هي حال الفيتامينات، ثمة أنواع معرضة لنقص أكثر من أنواع أخرى. فالنساء الحوامل والأولاد الصغار معرضون مثلاً لنقص الحديد، فيما الكبار في السن معرضون لنقص الزنك. وتزداد الحاجة إلى الكالسيوم لدى الأشخاص المعرضين لخطر ترقق العظام.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- لا تزال الوظيفة المحددة للزرنبيخ غير واضحة، لكنه يساعد في استقلاب حامض الميثيونين.
- يحدث التسمم عند تناول جرعات أكبر من 250 مليستغرام في اليوم. وتوفر معظم الأغذية نحو 140 مليستغرام في اليوم.

متوافر في شكل

Arsenicum album (Ars alb) وهو شكل مخفف من الزرنبيخ يستخدم لمعالجة المشاكل الهضمية. إنه متوافر في شكل سائل أو أقراص.

معلومات أساسية

- هذا العنصر المعدني شديد السمية
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم لبعض الأشكال

مصادر طبيعية

اللحم	الخبز
الخضار النشوية	الحبوب
	السمك

توقف: ملاحظات وتحذيرات

فوق عمر 55 عاماً

الكبار في السن معرضون أكثر لفائض الزرنبيخ نظراً لتضاؤل عمل الكبد أو الكلتيون لديهم.

الحمل

لا ينصح بتناوله.

الإرضاع

لا ينصح بتناوله

تأثيره في التحاليل المخبرية

غير معروف.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الفوائد

- يعتقد أن الزرنبيخ مهم بمقادير ضئيلة، لكن فوائد هذا المعدن لا تزال مجهولة.
- يستخدم الزرنبيخ في العلاج المثلي لبعض المشاكل الهضمية المشتعلة على ألم حاد وأعراض التجفاف.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يساعد الزرنبيخ في استقلاب حامض الميثيونين.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

يحصل معظم الأشخاص على المقدار اللازم من طعامهم.

أعراض النقص

ما من أعراض مثبتة لغاية الآن.

الدوار	بالطبيب. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تغير لون أظافر الأصابع.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنجات	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دم في البول.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تساقط الشعر.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
التهاب الجلد.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
Dimercaprol	يعالج تسمم الزرنيخ، خصوصاً خلال 24 ساعة من التعرض له.
الفيتامين C	يحمي (نوعاً ما) من التسمم بالزرنيخ.

تحاليل مخبرية لكشف النقص

يتحدد النقص من خلال تحاليل للشعر أو الدم.

الجرعة المفرطة/السمية

لعلامات والأعراض.

- تشتمل الأعراض المزمنة على الصداع والتشنج والارتباك والدوار وتغير لون أظافر الأصابع.
- تشتمل الأعراض الحادة على التقيؤ والإسهال وظهور الدم في البول وتشنجات العضلات، والضعف وتساقط الشعر والتهاب الجلد.
- قد يصاب المرء بالغيبوبة أو حتى بالموت عند تراكم مستويات الزرنيخ السامة.
- الرئتان والجلد والكليتان والكبد هي الأعضاء الأكثر تأثراً بالتسمم.
- تم ربط عدة أنواع من السرطان بالتعرض للزرنيخ.
- ما يجب فعله:
لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.
- للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
الصداع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
الارتباك	توقف عن تناوله. إتصل فوراً

الأشخاص المعرضون لترقق العظام.

أعراض النقص

نمو سيء للعظام.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- عنصر ضروري للنباتات.
- مهم لاستقلاب المعادن والطاقة.
- ينظم الهرمونات.
- مهم لنمو العظام.
- يحسن صحة أغشية الخلايا.
- يساعد في تفاعلات بعض الأنزيمات.
- متوافر في شكل
- مكمل فردي.
- جزء أساسي في مستحضرات متعددة الفيتامينات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- يستشر الطبيب في حال.
- المعاناة من ترقق العظام.
- المعاناة من فرط الكالسيوم في الدم
- الحمل.
- يجب استشارة الطبيب.
- الإرضاع
- يجب استشارة الطبيب.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أساسية

البورون موجود بتركيزات كبيرة في الغدد الدرقية (المحيطة بالغدة الدرقية)

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

التفاح	مياه الشرب	النباتات الخضراء
الخضار	(في بعض الأماكن)	
الجزر	الحبوب	المكسرات
خل التفاح	العنب	الإجاص

الفوائد

- مهم للحفاظ على العظام ونموها.
- يحول دون ترقق العظام من خلال تسريع إزالة المعادن من العظام.
- يزيد من امتصاص الكالسيوم والاستقلاب.
- يشجع على النمو الطبيعي.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يساعد في معالجة التهاب مفاصل العظام.
- قد يحسن جهاز المناعة من خلال تحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الالتهاب.
- قد يعالج ألم التهاب المفاصل والتصلب.
- قد يخفف من ارتفاع ضغط الدم.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

غثيان
توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.
فقدان الوزن.
توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع
الكالسيوم
التأثير الموحد
يساعد في استقلاب
الكالسيوم.
المغنزيوم
يساعد في استقلاب
المغنزيوم
الفوسفور
يساعد في استقلاب
الفوسفور.

تحاليل مخبرية لكشف النقص

ما من اختبارات متوافرة.

الجرعة المفرطة/السمية

علامات والأعراض:

• تقيؤ، تساقط الشعر، طفح جلدي، صداع.
• نعاس، ارتفاع حرارة الجسم، أرق، قصور
كروني خلل في الدورة الدموية وصدمة مؤدية إلى
حرب.

• يجب فعله

• جرعة الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول
نوع واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات
لعلمية أو التأثيرات الجانبية.

• جرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة
كعكة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

تفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
مفان الشهية.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الكالسيوم Calcium

اللوز
الجوز البرازيلي
البروكلي
الأرز والعصير
والحبوب المعززة
بالكالسيوم
الكافيار
الجبن
جبن الماعز
عشب البحر
الحليب
ليودينغ
السلمون المعلب
السريدن المعلب
التوفو
أوراق الفجل الخضراء
اللبن

الفوائد

- يحمي من ترقق العظام
- يعالج نقص الكالسيوم لدى المصابين بقصور عمل

معلومات أساسية

- إن Calcium gluconate و Calcium citrate هما من
الأشكال الشائعة لمكملات الكالسيوم
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
 - متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
 - هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
 - الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به
والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

- النساء طوال حياتهن، ولا سيما أثناء الحمل والإرضاع.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يتعرض للإجهاد لفترة طويلة من الوقت.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الذي أصيب بكسر في العظم.
- المراهقون الذين لا يشتمل مأخوذهم على الكثير من الكالسيوم.

Flow أعراض النقص

ترقق العظام (أعراض متأخرة).

- كسور متكررة في العمود الفقري والعظام الأخرى.
- تشوه في العمود الفقري مع حداث.
- فقدان بعض الطول.
- لين العظام.
- كسور متكررة.
- تقلصات في العضلات.
- نوبات تشنج.
- تشنجات في العضلات.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- يشارك في وظائف الاستقلاب الضرورية للعمل الطبيعي في الجهاز العصبي، العضلات والهيكل العظمي.
- يؤدي دوراً مهماً في العمل الطبيعي للقلب، عمل الكلى، تخثر الدم وسلامة الأوعية الدموية.
- يساعد في استخدام فيتامين B-12.
- معلومات متفرقة
- تعمل العظام بمثابة مخزن للكالسيوم في الجسم.
- وثمة تبادل دائم بين الكالسيوم في العظام وفي الدورة الدموية.
- إن الأطعمة الغنية بالكالسيوم (أو المكملات) تساعد في الحفاظ على التوازن بين حاجات العظام وحاجات الدم.

- الغدد الدرقية أو لين العظام أو كساح الأطفال.
- يستخدم طبيباً لمعالجة التشنجات العضلية الحادة الناجمة عن الحساسية أو النوبة القلبية أو التسمم بالرصاص.
- يستخدم طبيباً بمثابة ترياق للتسمم بالمغنيزيوم.
- يمنع تشنجات العضلات أو الساقين لدى بعض الأشخاص.
- يشجع النمو الطبيعي.
- يعزز العظام والأسنان.
- يحافظ على كثافة العظام وقوتها.
- يخفف الحمض في المعدة ويعمل بمثابة مقاوم للحموضة.
- يساعد في تنظيم خفقان القلب، تخثر الدم وتقلص العضلات.
- يعالج نقص الكالسيوم لدى المواليد الجدد.
- يشجع على حفظ وإطلاق بعض هرمونات الجسم.
- يخفف تركيزات الفوسفات لدى المصابين بقصور الكلى المزمن.
- يساعد في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من تكون الحصى في الكليتين.
- قد يخفف من تشنجات الساقين.
- قد يعالج تسمم الدم لدى النساء الحوامل.
- قد يخفف من خطر الإصابة بسرطان القولون.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة، أو الذي لا يستهلك الحليب أو مشتقاته.
- الذي يكشف عن حساسية تجاه الحليب ومشتقات الحليب.
- الذي يعاني من نقص غير معالج في اللكتاز ويتفادى الحليب ومشتقاته
- الذي تخطى عمره 55 عاماً، وخصوصاً النساء

- مشاكل في القلب أو ارتفاع ضغط الدم.
- فوق عمر 55 عاماً.
- يزداد احتمال التفاعلات العكسية والتأثيرات الجانبية.
- يزداد احتمال الإمساك والإسهال.
- الحمل.
- قد تحتاج النساء الحوامل إلى المزيد من الكلسيوم.
- يجب استشارة الطبيب بشأن المكملات.
- لا تتناول جرعات مفرطة (راجع المأخوذ اليومي المثالي في الصفحة 461).
- الإرضاع
- ينتقل العقار إلى الطفل عبر الحليب. يجب استشارة الطبيب بشأن المكملات.
- لا تتناول جرعات مفرطة (راجع المأخوذ اليومي المثالي في الصفحة 461).
- تأثيره في التحاليل المخبرية
- قد تزداد تركيزات الأميلاز في المصل والسترويد القشري المائي في المصل.
- يؤدي الاستخدام المفرط والطويل الأمد إلى تضائل تركيز الفوسفات في المصل.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.
- معلومات أخرى
- قد يكون الدلومييت ودقيق العظام مصدرين غير آمنين ربما للكلسيوم بسبب احتوائهما على الرصاص.
- تجنب تناول الكلسيوم قبل ساعة أو ساعتين من تناول الطعام أو الأدوية الأخرى إن أمكن.
- تشتق بعض أنواع كبرونات الكلسيوم من أصداف المحار. لكن لا يوصى أبداً بتناول كبرونات الكلسيوم المشتق من هذا المصدر.

- التمارين، الغذاء المتوازن، الكلسيوم الآتي من مصادر طبيعية أو من المكملات والاستروجين هي من العوامل المهمة في معالجة ترقق العظام والحوّل بدينه
- إن الألومنيوم الموجود في بعض مضادات الحموضة قد يعيق امتصاص الكلسيوم.
- أشارت الدراسات الحديثة إلى أن محتوى المعادن في العظام يزداد عند تناول مكملات الكلسيوم خلال لمراقبة.
- يتوجب على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق حفرافية غير معرضة كثيراً للشمس أو الذين يعيشون معظم وقتهم في المنازل أو المؤسسات أن يتناولوا فيتامين D مع الكلسيوم لتحسين الامتصاص.
- متوافر في شكل
- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- أقراص قابلة للمضغ يجب مضغها جيداً قبل ابتلاعها.
- الكلسيوم متوافر في شكل كبرونات وسيترات وغلوكونات، مع مستويات مختلفة من التوافر الأحيائي.

نصائح: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كانت لديك حساسية تجاه الكلسيوم أو مضادات الحمض.
- كان مستوى الكلسيوم مرتفعاً في دمك.
- كنت تعاني من داء بروك.
- إشتد الطبيب في حال
- مرض الكلى
- الإمساك أو الإسهال أو التهاب القولون المزمن.
- نرف في المعدة أو الأمعاء.
- خفقان غير منتظم للقلب.

مستحضرات الديدجيتال. يسبب اضطراباً في خفقان القلب.

Etidronate يخفف من تأثير Etidronate. لا تتناوله قبل

مرور ساعتين على تناول

مكملات الكلسيوم

يثبط عمل نيترات غاليوم.

يخفف امتصاص الحديد إلا

في حال تناول الفيتامين C

في الوقت نفسه.

يزيد من امتصاص الكلسيوم

والمغنيزيوم

قد يزيد من امتصاص

الكلسيوم

يخفف تأثير الكلسيوم

والفنتوتين. لا تتناول

الكلسيوم قبل مرور 1 ساعة

إلى 3 ساعات على تناول

الفنتوتين.

يخفف امتصاص

الثتراسيكلين.

يخفف امتصاص مكملات

الكلسيوم

Etidronate

Gallium Nitrate

مكملات الحديد

الأدوية أو المكملات

المحتوية على المغنيزيوم

حبوب منع الحمل

الاستروجين

فنتوتين

حبوب تتراسيكلين

الفيتامين D

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص.

المشروبات: الكافيين (في الشاي والقهوة والكولا

والشوكولاته) قد يخفف الامتصاص لكن لم يثبت أنه

يخفف من كثافة العظام

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

• جمع البول على مدى 24 ساعة لقياس مستويات الكلسيوم.

• مسح كثافة العظام.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

ارتباك، خفقان بطيء أو غير منتظم للقلب، ألم في

العظام أو العضلات، غثيان، قيئ (لم يتم التعرف إلى

أعراض التسمم، حتى لو وصلت الجرعات إلى غرامين

أو 3 غرامات في اليوم)

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن

واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية

أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لرجاجة

كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

العلامات المبكرة لفرط الكلسيوم في الدم

إمساك حاول زيادة مأخوذ

السوائل. توقف عن تناوله.

إتصل بالطبيب عند الإمكان.

توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

العلامات المتأخرة لفرط الكلسيوم في الدم

ارتباك توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

أطلب الإسعاف.

خفقان بطيء أو غير

منتظم للقلب.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع

فوسفات صوديوم

فوسفات صوديوم

سلولوز

يتفاعل مع

فوسفات صوديوم

فوسفات صوديوم

سلولوز

إلا عند المصابين باضطرابات حادة في الحمض القاعدي.
الأسباب.

- يمكن أن يؤدي التقيد المستمر إلى النقص.
- عند تجاهل الكلوريد عمداً في أطعمة الأطفال الرضيع، يصاب الطفل بالقلاء الاستقلابي ونقص حجم الدم وفقدان بولي كهرب. كما تحدث أيضاً عيوب نفسية حركية وفقدان للذاكرة وتأخر في النمو لكن هذه المشكلة غير موجودة في المستحضرات التجارية المتوافرة.

الأعراض

- خلل في توازن الأحماض والقواعد في سوائل الجسم (حالة نادرة).
- غثيان
- تقيد
- ارتباك
- ضعف
- غيبوبة

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- الكلوريد جزء أساسي في حمض المعدة.
 - إنه يتفاعل مع الصوديوم والبوتاسيوم وثاني أكسيد الكربون للحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في خلايا الجسم والسوائل. إنه أساسي للصحة السليمة.
 - تخضع تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم وثاني أكسيد الكربون والكلور لسيطرة آليات داخل كل خلية في الجسم.
- معلومات متفرقة:
- لا يتوجب على أصحاب الصحة السليمة بذل أي جهد للحفاظ على مستوى كافٍ من الكلوريد.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

- سائل الملح (كلوريد البوتاسيوم).
- ملح البحر.
- ملح المائدة (كلوريد الصوديوم).
- ملاحظة: الكلوريد موجود في مركبات مع جزيئات أخرى.

الفوائد

- ينظم توازن المنحل الكهربائي في الجسم.
- ينظم التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.
- يحسن عمل الأعصاب والعضلات.

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد معروفة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- المصابون بتناذر بارتر.
- الذين يعانون من اضطرابات في النبيببات الكلوية أو تليف البنكرياس الحوصلي.

أعراض النقص

ملاحظة: لا يشيع نقص الكلوريد في الولايات المتحدة

● يفترض بالغذاء السليم أن يزود الجسم بكل حاجاته اليومية.

● إن المصابين بخلل شديد في التوازن الحمضي القاعدي يحتاجون إلى الاستشفاء والرعاية الصحية المحترفة

متوافر في شكل

● أقراص صوديوم كلورايد (ملح). قد تسبب هذه الأقراص ألماً في المعدة وترقق الكليتين.

● الكلورايد جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا ينصح باعتماد مكملات الكلورايد إلا في حالات الخلل الشديد في التوازن الحمضي القاعدي، مما يتطلب رعاية طبية

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

قد يحدث خلل في توازن الأحماض والقواعد في سوائل الجسم عند وجود الكثير أو القليل من الكلورايد، وتشتمل الأعراض حينها على الضعف والارتباك والغبوبية. لا توجد أية مشكلة في تناول مقادير ملائمة من الكلورايد في شكل ملح الطعام أو بديل بوتاسيوم.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية

أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات متوقعة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

التأثير الموحد

يتفاعل مع

يحافظ على التوازن

الكلور

الحمضي القاعدي في

الجسم.

يحافظ على التوازن

البوتاسيوم

الحمضي القاعدي في

الجسم.

يحافظ على التوازن

الصوديوم

الحمضي القاعدي في

الجسم

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة في المصل.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

كلورايد في المصل.

أعراض النقص

- انخفاض حساسية الأنسجة للغلوكوز، أي ما يشبه السكري.
- خلل في استقلاب الغلوكوز والدهن والبروتينات.
- خدر في الأطراف.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- يساعد في نقل الغلوكوز إلى الخلايا.
- يحسن تأثير الأنسولين في استعمال الغلوكوز.

معلومات متفرقة

- قد ينجم التسمم بالكروم عن التعرض الصناعي المفرط، مثل الدباغة، التصفيح الكهربائي، صناعة الفولاذ، صناعة المواد الكاشطة، إصلاح محركات الديزل، صقل الأناث، صناعة الزجاج، صناعة المجوهرات، تنظيف المعادن، استخراج النفط، التصوير، صباغة الأنسجة وصناعة المواد الحافظة للخشب.

- لم يتوصل العلم الغذائي بعد إلى تحديد المقادير الدقيقة للكروم في معظم الأطعمة، علماً أنه يتم امتصاص أقل من 1 في المئة من الكروم الغذائي.

متوافر في شكل

- جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.
- مكمل فردي

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال العمل في بيئة مشتملة على تركيزات كبيرة من الكروم

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- المأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الببيض	التفاح
دهس السكر	لحم البقر
البطاطا الحلوة	خميرة الجعة
العطاطم	كبد العجل
منتجات الحبوب الكاملة	الجبنة
الذرة	الدجاج

الفوائد

- يحسن استقلاب الغلوكوز.
- يساعد الأنسولين في تنظيم سكر الدم.
- يخفف الحاجة إلى الأنسولين ويحسن قدرة احتمال الغلوكوز لدى بعض المصابين بالنوع 2 من السكري.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يسهم في تخفيف مستوى الكوليسترول وLDL في الدم.
- قد يسهم في تخفيف الوزن وزيادة تسيج العضلات.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- المصاب وبما يداء السكري.

إستشر الطبيب في حال وجود:

- داء السكري.
- مرض في الرئة.
- مرض في الكبد.
- مرض في الكلية.
- فوق عمر 55 عاماً.

ما من حاجات خاصة في حال تناول غذاء متوازن، الحمل.

يجب تفادي الكروم أثناء الحمل إلى حين توافر المزيد من المعلومات.

الإرضاع

يجب تفادي الكروم أثناء الإرضاع إلى حين توافر المزيد من المعلومات.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

إن التحاليل المخبرية التي تجرى بعد استخدام الكروم المشع السداسي التكافؤ لمدة 3 أشهر قد تفضي إلى مستويات مرتفعة زائفة في الدم.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف ويأرء بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية



العلامات والأعراض:

يمتاز الشكل الغذائي بسمية ضئيلة جداً. لكن التعرض الطويل الأمد إلى الكروم البيئي قد يفضي إلى مشاكل جلدية أو خلل في الكبد أو الكلى. ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة القرضية (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية



ما من تفاعلات متوقعة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن



التأثير الموحد

يتفاعل مع

قد يخفف من امتصاص الأنسولين اللازم لمعالجة السكري في حال تناوله بمستويات كبيرة.

الأنسولين

تحاليل مخبرية لكشف

النقص



- كروم في المصل.
- تحليل الشعر ليس اختباراً موثقاً به للتعرف إلى النقص أو السمية.

- قد يعالج بعض أنواع السرطان.

من يستفيد من الجرعات



الإضافية؟

- الذي أصيب مؤخراً بجروح أو حروق بالغة.
- المصاب بالشره المرضي.
- النباتي الذي لا يحصل على مأخوذ ملائم من B-12.

أعراض النقص



فقر الدم الخبيث، مع الأعراض الآتية

- ضعف خصوصاً في الذراعين والساقين.
- لسان متقرح.
- غثيان، فقدان الشهية، فقدان الوزن.
- نزف من اللثة.
- خدر ووخز في اليدين والقدمين.
- صعوبة في الحفاظ على التوازن.
- شعوب في الشفتين واللسان واللثة.
- ارتباك وعته.
- صداع.
- ذاكرة سيئة.

كيفية الاستعمال



أهمية هذا المعدن

يعمل الكوبالت بمثابة حافز في التفاعلات المركبة لتكوين الفيتامين B-12

معلومات متفرقة.

- الكوبالت هو عنصر ضئيل مخزن أساساً في الكبد.
- النقص نادر جداً.
- إنه جزء أساسي ضروري في تكوين الفيتامين B-12. وقد يؤدي نقص الكوبالت إلى نقص في الفيتامين B-12 وبالتالي إلى فقر الدم الخبيث.

معلومات أساسية



- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا، لكن يصعب العثور على المكملات ومن هنا أهمية مأخوذ الطعام
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية



البطلينوس
مشتقات الحليب
كلى الحيوانات
الكبد
اللحوم
المحار

ملاحظة: إن المقادير الصغيرة الموجودة في الأطعمة تشبع حاجات الجسم، إلا في الظروف الاستثنائية. تشمل بعض الأطعمة النباتية على مقادير صغيرة، لكن مصدرها الأمثل هو الأطعمة الغنية بالفيتامين B12

الفوائد



- يشجع على تكوين الخلايا الحمراء في الدم.
- جزء أساسي في الفيتامين B-12.
- يشترك في تفاعلات الأنزيمات.
- يساعد في تكوين أغشية الأعصاب النخاعية.

الفوائد الإضافية المحتملة



- قد يؤدي دوراً في معالجة فقر الدم الذي لا يستجيب إلى علاج آخر.
- قد يعالج التعب والمشاكل الهضمية والمشاكل العصبية العضلية.

المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضا فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
في الجرعات المفرطة تضخم القلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تضخم الغدة الدرقية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
كثرة كريات الدم الحمراء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموجد
الكولشيسين	قد يفضي إلى دراسات مخبرية غير دقيقة في الكويالت أو الفيتامين B-12.
النيوميسين	قد يفضي إلى دراسات مخبرية غير دقيقة في الكويالت أو الفيتامين B-12.
الحمض السليسي السفلي	قد يفضي إلى دراسات مخبرية غير دقيقة في الكويالت أو الفيتامين B-12.
الفينيتوين	قد يفضي إلى دراسات مخبرية غير دقيقة في الكويالت أو الفيتامين B-12.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- تركيز في البلازما البشري.
- قياسه في الروز الحيوي بمثابة جزء من الفيتامين B-12.

متوافر في شكل

- كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- استشر الطبيب في حال ما من مشاكل متوقعة. فوق عمر 55 عاماً.
- يجب تناول غذاء متوازن للحول دون النقص.
- الحمل:
- يجب تناوله بمثابة فيتامين B-12 إذا نصح الطبيب بذلك.
- الإرضاع
- يجب تناوله بمثابة فيتامين B-12 إذا نصح الطبيب بذلك.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

- ما من تأثيرات متوقعة.
- حفظ المنتج:
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

- في الجرعات الكبيرة (20-30 ملغ/اليوم)، يمكن أن يؤدي الكويالت إلى كثرة كريات الدم الحمراء وتضخم الغدة الدرقية وتضخم القلب مما يؤدي إلى قصور القلب الاحتقاني.
- يمكن أن يؤدي التسمم بالكويالت إلى فرط نمو الغدة الدرقية عند الأطفال.

ما يجب فعله

- أعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول

- بشكل جزءاً من أنزيم الأوكسيد الفائق المحول وقدرة المقاومة للتأكسد.

الفوائد الإضافية المحتملة

- يمكن استخدامه لمعالجة فقر الدم الغذائي بالتزامن مع الحديد والفيتامين B-12 و/أو الفولات.
- قد يحمي من مرض الأوعية القلبية. لكن التوازن بالغ الأهمية إذ لوحظت مستويات عالية من التحسس لدى المصابين بأمراض الأوعية القلبية.
- ربما يخفف من الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل
- قد يحسن عمل جهاز المناعة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55 عاماً.
- الذي يعاني من مرض مزمن، ولاسيما الإسهال المزمن، ومشاكل سوء الامتصاص (راجع المسرد) ومرض الكلى.
- كل من يتناول كميات زائدة على المدى الطويل.
- الذي أصيب مؤخراً بجروح أو حروق بالغة.

Low أعراض النقص

- فقر الدم.
- تضائل عدد الخلايا البيضاء في الدم وبالتالي تضائل مقاومة الالتهاب.
- تكون خاطئ للكولاجين.
- فقدان المعادن من العظام.
- تساقط الشعر، تلون الجلد.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الأفوكادو	المحار
السك	الفول السوداني
الخضار	الزبيب
العدس	السلمون
الكبد	فول الصويا
المكسرات	السمانج
الكرنند	الشوفان

ملاحظة: يمكن للأواني والأنابيب النحاسية أن تزيد أيضاً من محتوى النحاس في الماء والأطعمة.

الفوائد

- يشجع على تكوين الخلايا الحمراء في الدم.
- يعمل بمثابة حفاز في حفظ الحديد وإطلاقه لتكوين خضاب الدم في الخلايا الحمراء
- يساعد في إنتاج العديد من الأنزيمات المسؤولة عن التنفس.
- يشجع تكون النسيج الضام ويحسن عمل الجهاز العصبي المركزي.
- يساعد في إنتاج العديد من الأنزيمات المشتركة في تكوين الميلانين.
- يشجع العمل الطبيعي للأنتسولين.
- يساعد في الحفاظ على الميلون (النخاعين).

الحمل:

يجب استشارة الطبيب.

الإرضاع

يجب استشارة الطبيب.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

يمكن للكوياليت والحديد والنيكل وحبوب منع الحمل مع الأستروجين أن تفضي إلى مستويات مرتفعة وإنما زائفة للنحاس.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

غثيان، تقيؤ، ألم في العضلات، ألم في البطن وفقر دم. ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول

المعدن واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات متوقعة

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
الكادميوم	قد يعيق امتصاص النحاس واستخدامه
الليف	قد يعيق امتصاص النحاس واستخدامه. غير مهم سريرياً.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

يعتبر النحاس جزءاً أساسياً لعدد من البروتينات والأنزيمات، منها الليسيل والهيدروكسيل ودوبامين بيتا هيدروكسيل.

معلومات متفرقة

- قد تزداد مستويات النحاس في بلازما الدم لدى المصابين بالتهاب المفاصل الرثياني، أو النساء الحوامل، أو المصابين بمتشمع الكبد، أو الذئبة القلبية، أو انفصام الشخصية، أو التهابات الحادة.
- يوصى الذين يتناولون كمكملات الزنك على المدى الطويل بتناول 2 ملغ/اليوم من النحاس.
- إن تناذر مانكس هو عيب خلقي في استقلاب النحاس، مما يلزم التدخل الطبي.
- تتضاءل مستويات النحاس في بلازما الدم عند قصور عمل الغدة الدرقية أو الاعتلال العصبي أو قلة الكريات البيضاء أو الإسهال الحاد أو الداء الكلوي.
- يوصى معظم اختصاصيي التغذية بتناول غذاء متوازن بدل تناول المكملات التي قد تحدث خللاً في التوازن الدقيق للمعادن في الجسم.
- متوافر في شكل
- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- النحاس هو جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

المعاناة من مرض ويلسون

إستشر الطبيب في حال:

أردت تناول مكمل النحاس.

فوق عمر 55 عاماً.

ما من مشاكل متوقعة.

الفييتامين C
يخفف امتصاص النحاس.
يجب تناول جرعات كبيرة
من الفييتامين C للحصول
على هذا التأثير.
قد يعيق امتصاص النحاس
واستخدامه. ينصح بتناول
مكمل النحاس.

الزنك

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستويات النحاس في البلازما
- مستويات النحاس في البول المجموع على مدى 24 ساعة.

يحافظ على نسبة ملائمة

من النحاس مقابل
الموليبدينوم في الجسم.
وفي حال تناول كميات
مفرطة من النحاس،
ينخفض مستوى
الموليبدينوم. وفي حال
تناول كميات مفرطة من
الموليبدينوم، ينخفض
مستوى النحاس.

يرتفع مستوى النحاس. لا
تزال أهمية ذلك مجهولة
في الوقت الحاضر.

قد يعيق امتصاص النحاس
واستخدامه. غير مهم
سريرياً.

الموليبدينوم

حبوب منع الحمل

النباتات (الحبوب،
الخضار)

الفلوريد Fluoride

مرتفعاً كثيراً إذا كانت التربة غنية والمياه محتوية
على الفلوريد، والعكس صحيح.

الفوائد

- يحول دون تسوس الأسنان عند الأولاد حين يكون
مستوى الفلوريد في الماء غير كافٍ.
- يعالج ترقق العظام بالكلسيوم والفييتامين D، لكن
يجب استخدامه تحت إشراف الطبيب.

الفوائد الإضافية المحتملة

قد يؤدي دوراً في الحماية من تآكل العظام

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

الذين يعيشون في مناطق تفتقر فيها المياه إلى الكمية
الملائمة من الفلوريد (راجع الطبيب أو طبيب الأسنان).

معلومات أساسية

- الفلوريد متوافر تجارياً في شكل صوديوم الفلوريد
- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به
والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

السلمون المعلّب
السردين المعلّب
الشاي
الماء

التفاح
كبد العجل
سمك القدّ
الببيض

كلى الحيوانات

ملاحظة: يختلف محتوى الفلوريد في الأطعمة، فيكون

لا تتناولوه إذا:

تخطى مأخوذ الفلوريد من مياه الشرب 0.7 أجزاء فلوريد في المليون. فالكثير من الفلوريد يولد بقاءاً دائماً على الأسنان.

يستشر الطبيب في حال:

- المعاناة من ترقق العظام.
- وجود قصور في نشاط الغدة الدرقية.
- فوق عمر 55 عاماً:

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل:

لا تتفق التقارير حول تأثير الفلوريد على الجنين. لذا، يجب اتباع نصيحة الطبيب.

الأرضاع

يجب استشارة الطبيب. قد ينصحك بإعطاء الطفل الرضيع بعض المكملات

تأثيره في التحاليل المخبرية:

• قد يتضاءل على نحو زائف مقدار الفوسفات، الحمضي والكلسيوم في المصل.

• قد يزداد على نحو زائف مقدار SGOT ناقلة حمض أسبارتات الأميني في المصل.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

• تشنجات أو آلام في المعدة، إغماء، تقيؤ (مع دم ربما)، إسهال، براز أسود، نفس ضيق، ازدياد اللعاب وإثارة غير طبيعية

• قد تظهر بقع بيضاء أو بنية على أسنان الأولاد.

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

أعراض النقص

زيادة كبيرة في تسوس الأسنان.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

• يسهم في تقوية العظام والأسنان من خلال مساعدة الجسم على الاحتفاظ بالكلسيوم.

• يعيق نمو وتكاثر الجراثيم التي تسبب جير الأسنان

معلومات متفرقة

• إن تناول الفلوريد لا ينفي الحاجة إلى الاهتمام بالأسنان، مثل الغذاء المتوازن وفرك الأسنان بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان من حين إلى آخر.

• إن كانت مكملات الفلوريد ضرورية في منطقتك، دع الولد يستمر في تناولها إلى أن يصبح عمره 16 عاماً.

كما أن التطعيمات الموضعية كل سنة أو سنتين قد تكون مفيدة للمحوّل دون التسوس.

متوافر في شكل

• أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يحوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

• قطرات: يجب تخفيفها في 1/2 كوب من الماء أو العصير. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك. لا تتناولها مع الحليب أو مشتقاته.

• غسول: إتبع التعليمات واستخدمه مباشرة قبل النوم، بعد فرك الأسنان وتنظيفها جيداً

• هلام: إتبع التعليمات واستخدمه مباشرة قبل النوم، بعد فرك الأسنان وتنظيفها جيداً.

• معجون: إتبع التعليمات واستخدمه مباشرة قبل النوم، بعد فرك الأسنان وتنظيفها جيداً.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

بتفاعل مع	التأثيرات الموحدة
هيدروكسيد الألومنيوم.	يخفض امتصاص الفلوريد.
مكملات الكالسيوم.	يخفض امتصاص الفلوريد.

التفاعل مع المواد الأخرى

المشروبات. يخفض الحليب امتصاص الفلوريد. تناول الجرعة قبل أو بعد ساعتين من شرب الحليب.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل مخبرية متوافرة. لكن فحص الفم بحثاً عن السوس مرة أو مرتين في السنة قد يفضي إلى الأدلة اللازمة.

لجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كدلة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

تفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
مع المقادير المفرطة من الفلوريد.	
مقدار الشهية.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
مسالك.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ظهور بقع بنية أو سوداء أو بياض على الأسنان.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عثيان.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
طلع جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الجرمانيوم Germanium

يحسن امتزاج الأنسجة بالأوكسجين (راجع المسرد)

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن جهاز المناعة.
- قد يساعد الجسم في التخلص من التسمينات والسموم.
- ربما يعالج التهاب المفاصل الرثياني.
- يعالج ربما حساسية الطعام.
- يعالج ربما داء المبيضات.
- قد يحسن شفاء الجروح.
- يمكن استخدام زيت الجرمانيوم لمعالجة الجروح والحروق، الإجهاد، مشاكل الطمث سن اليأس، قدم الرياضي، الأكرزيما، تقرح الحنجرة، قرحات الفم، لدغات الحشرات، الصداع والنزف.

معلومات أساسية

يستخدم زيت الجرمانيوم في العلاج العطري

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

الألوة	الجنسة
السمفونين	البصل
الكورولا	القطر
الثوم	السماق

الفوائد

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، هالوطوية والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.
- معلومات أخرى:
- لا تستخدم الزيوت بالقرب من العينين.

الجرعة المفرطة/السمية



العلامات والأعراض:

- قد تسبب الجرعات الكبيرة الأذى للكلى والكبد والعضلات والأعصاب والدماغ.
- ما يجب فعله:
- لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب.
- للجرعة المفرطة العرضية: (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية



ما من تفاعلات متوقعة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن



ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف



النقص

ما من تحاليل متوافرة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

المصابون بكتب جهاز المناعة.

أعراض النقص

ما من أعراض مثبتة لغاية الآن.

كيفية الاستعمال



أهمية هذا المعدن

يشارك الجرمانيوم في امتزاج الخلايا بالأوكسجين.

معلومات متفرقة:

- يستخدم لإعداد رقاقات الكمبيوتر
- يفضل الحصول عليه من الأطعمة الغنية بالجرمانيوم.

متوافر في شكل

- أقراص - يجب تناولها حسب تعليمات الصانع أو الطبيب.

- مسحوق - يجب تناوله حسب تعليمات الصانع أو الطبيب.

- كبسولات - يجب تناولها حسب تعليمات الصانع أو الطبيب.

- زيت يجب تناوله حسب تعليمات الصانع أو الطبيب.

- شكل "عضوي": 25 ملغ/اليوم. قد تسبب الأشكال الأخرى أذى للكلى.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- احفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

كل من يعيش في مناطق تفتقر تربتها إلى اليود (يتم معالجة النقص عادة بواسطة ملح المائدة الممزوج باليود).

أعراض النقص

لدى الأولاد

- تباطؤ النمو.
- تأخر النمو الجنسي.
- تأخر عقلي.

• صم

لدى الكبار

- تضخم الغدة الدرقية.

أعراض المستوى المنخفض لهرمون الغدة الدرقية (الأولاد والكبار).

- أرق
- سلوك بطيء وبلود.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

يعتبر اليود جزءاً أساسياً من هرمونات الغدة الدرقية. معلومات متفرقة:

إن ملح المائدة الممزوج باليود واستخدام اليودوفور بمثابة معقم في صناعة مشتقات الحليب هما من المصادر الأساسية لليود في معظم الأطعمة.

متوافر في شكل

- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم للجرعات التي تتخطى 130 ملغ
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 476.

مصادر طبيعية

البطلينوس	سمك المياه المالحة
الحليب	(القد، الرنكة)
الخميرة الغذائية	المحار
ملح البحر	السلمون المعلب
عشب البحر	القريدس
ملح المائدة	المكسرات المملحة.
(المعالج باليود)	الوجبات السريعة

الفوائد

- يشجع العمل الطبيعي للغدة الدرقية.
- يشجع العمل الطبيعي للخلايا.
- يقلص الغدة الدرقية قبل إجراء عملية جراحية فيها.
- يختبر عمل الغدة الدرقية قبل وبعد وصف شكل إشعاعي من اليود.
- يحافظ على صحة الجلد والشعر والأظافر.
- يحول دون تضخم الغدة الدرقية.

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد معروفة.

والحرارة قد تعبران عن عمل المعدن

الجراحة المقرطة/السمية

العلامات والأعراض:

خفقان غير طبيعي للقلب، ارتباك، صعوبة في التنفس، تورم العنق أو الحنجرة ویراز أسود أو ممزوج بالدم.

ما يجب فعله

لأعراض الجراحة المقرطة. توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجراحة المقرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

ملاحظة كل هذه التفاعلات نادرة

ألم في البطن. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

حرقة في الفم أو الحنجرة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

إسهال. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

حمى. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

صداع. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

ثقل في الساقين. توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

ازدياد إفراز اللعاب. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

طعم معدني في الفم. توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

غثيان. توقف عن تناوله. أخبر

الطبيب في الزيارة التالية.

خدر أو وخز أو ألم في اليدين أو القدمين. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

● محلول قموي يجب تذويبه في نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك. ● لا يوصى بتناول الأقراص المعوية للتغليف لأنها قد تسبب التزرف وانسداد الأمعاء وحتى ثقب الأمعاء الدقيقة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

● ارتفاع مستوى البوتاسيوم في المصل.

● التوتر العضلي الولادي

● استشر الطبيب في حال:

● فرط عمل الغدة الدرقية

● مرض الكلى

● تناول أدوية للغدة الدرقية أو ليثيوم أو التريام

تيرين

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل:

في حال استهلاك الكثير من اليود أثناء الحمل، قد يصاب الطفل بتضخم الغدة الدرقية أو قصور في عملها أو القماءة (قرم والصور عقلي)

الإرضاع

● تجنبى المكملات أثناء الإرضاع.

● قد يؤدي اليود في الحليب إلى طفح جلدي وقصور في عمل الغدة الدرقية عند الطفل.

تأثيره في التحاليل المخبرية

● قد يسبب ارتفاعاً زائفاً في كل الدراسات المتعلقة بوظيفة الغدة الدرقية.

● يعرقل اختبار تحديد السترويد الموجود طبيعياً في البول

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

يتوجب على من يتناول
كربونات الليثيوم أن يتفادى
اليود الذي يجمع الغدة
الدرقية

المحيط

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

قد تشير الاختبارات إلى عمل أدنى من الطبيعي في
الغدة الدرقية، مما يعني نقصاً في اليود في بعض
الحالات.

جمع جلدي. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

خروج في الأسنان و اللثة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

تورم الغدد اللعابية. نعم أو ضعف. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
كربونات الليثيوم	يسبب تضاعف لا غير طبيعي
معالجة مرض الهوس	في نشاط الغدة الدرقية.

الحديد Iron

الكبد دهس السكر
ملاحظة. يتم امتصاص 10 في المئة من حديد الأطعمة
من الطعام الذي يستهلكه الفرد العادي. أما الشخص
الذي يعاني من نقص في الحديد فقد يمتص 20 إلى
30 في المئة.

الفوائد

- يحول دون فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو أسباب أخرى ويعالجه
- يشجع إنتاج النخاع العظمي لخضاب الدم، أي خضاب خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم.
- يشكل جزءاً من عدة أنزيمات وبروتينات موجودة في الجسم.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من آلام دورة الطمث.

معلومات أساسية

Ferrous sulfate (سلفات الحديدوز) هو الشكل الأكثر
شوعاً من الحديد

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

الخبز	بلح البحر
صفار البيض	المحار
السمك	اللحم الأحمر
الحمض	عشب البحر
العسل	منتجات الحبوب الكاملة
	المعززة بالمواد المغذية

● يعتبر الحديد جزءاً أساسياً في خضاب الدم والقلوبين العضلي، وهو عنصر مساعد في العديد من الأنزيمات الأساسية. يحفظ خضاب الدم (الجزء الأحمر من خلايا الدم الحمراء) 60 إلى 70 في المئة من كل الحديد الموجود في الجسم.

● خضاب الدم هو أيضاً جزء أساسي في الغلوبين العضلي، وهو مركب بروتين حديدي في العضلات. يساعد هذا المركب العضلات في الحصول على المزيد من الطاقة عند بذلها المزيد من الجهد.

معلومات متفرقة

- يعزى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الكبار في السن إلى فقدان بطيء للدم.
- قد يزداد محتوى الحديد في الأطعمة بشكل كبير في حال ظهورها في أواني معدنية.
- قد تحتاج إلى 3 أسابيع من العلاج قبل الحصول على الفائدة القصوى.
- يحسن الفيتامين C امتصاص الحديد.
- تم ربط المستويات المرتفعة للحديد بازدياد خطر الإصابة بمرض القلب.

متوافر في شكل

- أقراص. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.

● محلول فموي: يتم ابتلاعه مع نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أَمَرَ الطبيب بغير ذلك.

● أقراص قابلة للمضغ. يجب مضغها جيداً قبل ابتلاعها.

● أقراص معوية المغلفة: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- وجود حساسية لأي نوع من مكملات الحديد.
- التهاب حاد في الكبد.

● قد يحسن جهاز المناعة لدى المصابين بنقص الحديد.

● قد يحسن التعلم لدى المصابين بنقص الحديد.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

● معظم النساء اللواتي تعانين من دفق قوي لدورة الطمث، أو من أمد طويل أو قصير لهذه الدورة (خصوصاً عند المراهقات).

● كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.

● الذي تخطى عمره 55.

● المرأة الحامل أو المرضعة.

● الذي يعاني من مرض مزمن.

● الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.

● الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.

● الرياضيون والعمال الذين يمارسون نشاطات جسدية كثيفة.

● كل من فقد مؤخراً جزءاً من دمه، كما في دورة الطمث القوية، أو نزف غير معالج في المعدة والأمعاء.

● النباتيون الذين لا يتناولون مأخوذاً غذائياً كافياً.

● الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى 24 شهراً

Flow أعراض النقص

● قلق

● اضطراب في خفقان القلب عند الإجهاد.

● تعب

● حدة الطبع.

● شحوب في الجلد والأغشية المخاطية والأظافر.

● تصاؤل القدرة العقلية، قصور في التعلم.

● وحم (اشتياها الأكل في غير موسمه).

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.
- معلومات أخرى.
- قد يتراكم الحديد ويصل إلى مستويات مؤذية لدى المصابين بقصور مزمن في الكليتين أو بالتهاب المفصل الوجيهاني أو مرض هديكن.
- إن الاستخدام الطويل الأمد لجرعات كبيرة من الحديد قد يؤدي إلى مرض تخزين الحديد، مما يسبب بشرة برونزية وداء السكري وضرر في الكبد ومشاكل في القلب.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

- العلامات المبكرة: إسهال مع دم، تقيؤ حاد، ألم في البطن وتقيؤ مع دم.
- علامات متأخرة: ضعف، انهيار، شحوب، ازرقاق الشفتين واليدين والأظافر، ضيق في النفس، تشنجات، غيبوبة وخفقان سريع للقلب.
- قد يؤدي الكثير من الحديد إلى ازدياد خطر الإصابة بالسرطان ومرض القلب التاجي.
- ما يجب فعله
- لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية
- للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزحاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
براز أسود أو رمادي (على الدوام).	لا شيء.
دم في البراز.	أطلب الإسعاف.
ألم في الصدر.	أطلب الإسعاف.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل

- حديد دموي (ارتفاع مستوى الحديد كثيراً في الجسم).
- فقر دم انحلائي
- نقل متكرر للدم.
- ستشر الطبيب في حال.
- تودين أن تصبحي حاملاً أثناء تناول أدوية.
- ؟ تتناوله في حال.
- المعاناة من قرحة في المعدة أو التهاب الأمعاء أو لتهاب القولون.
- التهاب البنكرياس أو الكبد.
- الإدمان على الكحول.
- مرض في الكلية.
- مرض في الأمعاء.
- فائض الفيتامين - C وهذه مشكلة لدى المصابين
- حلل في تخزين الحديد.
- فوق عمر 55 عاماً:
- ليس النقص أمراً مستبعداً. راجع الطبيب على الدوام
- لتحقق من أعراض فقر الدم أو نزف الدم البطيء في
- الممران.
- في حال وجود تاريخ لمرض القلب في العائلة،
- يستشر الطبيب قبل تناول المكملات.
- الحمل.
- يزيد الحمل من الحاجة إلى الحديد. راجع الطبيب.
- خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لا تتناولي أي شيء من دون استشارة الطبيب.
- الإرضاع
- قد لا تكون المكملات ضرورية في حال تناول غذاء سليم ومتوازن. يجب استشارة الطبيب.
- قد يحتاج الطفل إلى المكملات، خصوصاً إذا كان مولوداً قبل أوانه. يجب استشارة الطبيب.
- تأثيره في التحاليل المخبرية:
- قد يسبب الحديد نتائج غير طبيعية في مستويات ياقوتين الصفراء والكلسيوم والحديد في المصل.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

يجب تناول الحديد قبل 3 ساعات أو بعد ساعتين من تناول التتراسيكلين.
يزيد من امتصاص الحديد.
ضروري لتكوين خضاب الدم وخلايا الدم الحمراء.
يفضل امتصاص الحديد.
الزئبق (جرعات كبيرة) يقلل امتصاص الحديد.

بالطبيب عند الإمكان.
إمزجه مع الماء أو العصير للتخفيف من تأثيره. أفرك الأسنان ببيلربونات الصودا أو بيروكسيد الهيدروجين لإزالة البقع.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ألم في الحنجرة.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

التفاعل مع المواد الأخرى

الأطعمة والمشروبات:

- الحليب، الجبن، اللبن والبيض تخفف كلها من امتصاص الحديد.
- يخفف الشاي من امتصاص الحديد.
- تخفف القهوة من امتصاص الحديد.
- يخفف السبانخ من امتصاص الحديد.
- تخفف النخالة والخبز الكامل الحبوب والحبوب من امتصاص الحديد.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مقدار الدم الأحمر.
- فحص مجهري لخلايا الدم الحمراء.
- مقدار الحديد في المصل.
- قياس خضاب الدم
- مقدار مركب الحديد في المصل.

يتفاعل مع	التأثير الموحد
Allopurinol	قد يسبب فائضاً من الحديد في الكبد.
مضادات الحموضة	يؤدي إلى سوء امتصاص الحديد.
كلسيوم	الاتحاد ضروري لامتصاص الكلسيوم بفعالية.
كولستيرامين	يخفف تأثير الحديد.
النحاس	يساعد في امتصاص النحاس.
مكملات الحديد (أخرى)	قد يسبب فائضاً من الحديد في الكبد.
بنكرياتين	يخفف امتصاص الحديد.
بنيسيلامين	يخفض تأثير البنيسيلامين.
سولفاسالازين	يخفض تأثير الحديد.
تتراسيكلين	يخفف تأثير التتراسيكلين.

المغنيزيوم Magnesium

مصادر طبيعية

- اللوز
- الأفوكادو
- الموز
- السكّر الأزرق
- سمك الرنكة
- النباتات الخضراء
- سمك الأسقمري
- دبس السكر
- المكسرات
- سمك الشبوط النهري

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462

- تقلصات العضلات.
- نوبات تشنج.
- ارتباك، هذيان، صعوبة في التركيز وحفظ الذاكرة.
- حدة الطباع.
- عصبية
- مشاكل جلدية
- تصلب الأنسجة اللينة
- ارتفاع ضغط الدم.
- عدم الانتظام.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- ينشط الأنزيمات الأساسية.
- يؤثر في استقلاب البروتينات والأحماض النووية
- يساعد في نقل الصوديوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا.

- يؤثر في مستويات الكالسيوم داخل الخلايا.

- يساعد في تقلص العضلات.

متوافر في شكل

- أقراص أو كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

- سائل أو مسحوق: إتبع تعليمات الصانع. يجب ابتلاعها مع نصف كوب من الماء أو العصير، وشرب الكثير من السوائل طوال اليوم.

- المغنيزيوم جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

- تتوافر الحقن بناءً على وصفة الطبيب أو الممرض.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا نتناوله في حال:

- قصور الكلى.
- حصر القلب.
- انسداد الشرايين.

سمك القد	سمك الفرخ
ملغوف	القرنفس
مشتقات الحليب	سمك أبو سيف
سمك المقلطح	القمح
سمك الهلبوت	الخبز الكامل القمح

الفوائد

- يساعد في نمو العظام.
- يساعد الأعصاب والعضلات في عملها، بما في ذلك تنظيم الإيقاع الطبيعي للقلب.
- يراقب الدفعات العصبية
- يعمل بمثابة ملين بالجرعات الكبيرة.
- يعمل بمثابة مضاد للحموضة في الجرعات الصغيرة.
- يقوي مينا الأسنان.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من تأثيرات التسمم بالرصاص.
- قد يخفف من الحمى في الكليتين
- يمكن استخدامه لمعالجة مرض القلب.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي يعاني من مرض مزمن
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- قد تزداد الحاجة عند وجود إسهال وتقيؤ
- قد يكمل علاج الذبحة القلبية الحادة، الراحة القلبية والقصور القلبي الوعائي والتسمم بالديجيتال، وإنما تحت إشراف طبي.

أعراض النقص

تحدث الأعراض الأتية بشكل نادر:

واستشر الطبيب، راجع أيضاً فقرة التفاعلات المعكبة أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما يجب فعله	يتفاعل أو التأثير
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	آلم في البطن.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	فقدان الشهية.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	إسهال
أطلب الإسعاف.	عدم انتظام في خفقان القلب
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	تقلبات في المزاج أو التفكير.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	غثيان
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	تعب أو ضعف.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	انزعاج عند التبول.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	تقيؤ

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

التأثير الموحد	يتفاعل مع
يخفض مستويات	المضادات الحيوية
المغنيزيوم.	(بعضها)
يخفض تأثير المغنيزيوم.	فوسفات صوديوم
تناوله قبل أو بعد ساعة من تناول المغنيزيوم.	السلولوز
يخفض مستويات المغنيزيوم.	مدرات البول (بعضها)
يخفض امتصاص Ketoconazole	
Ketoconazole. تناوله	

إستشر الطبيب في حال:

● الإمساك أو التهاب القولون أو الإسهال المزمن.

● أعراض التهاب الزائدة الدودية.

● نزف في المعدة أو الأمعاء.

فوق عمر 55 عاماً.

يزداد احتمال التفاعلات المعاكسة والتأثيرات

الجانبية

الحمل.

خطر على الحنين. لا تستخدمه.

الإرضاع

تجنبني المغنيزيوم إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

تأثيره في التحاليل المخبرية

● فحص غير دقيق لإفراز الحمض في المعدة.

● قد يزيد أو يخفف من تركيزات الفوسفات في المصل.

● قد يخفض مستوى pH في المصل والبول.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أخرى:

● إن قصور الكلى المزمن يدفع الجسم للاحتفاظ

بالمزيد من المغنيزيوم

● نادراً ما تسجل تفاعلات معاكسة أو تأثيرات

جانبية أو تفاعلات مع الأدوية الأخرى. فهي تحدث

عند تناول الكثير من المغنيزيوم لفترة طويلة من الوقت

أو في حال المعاناة من مرض في الكلى.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

غثيان وتقيؤ حاد، انخفاض كبير في ضغط الدم،

ضعف كبير في العضلات، صعوبة في التنفس، عدم

انتظام في خفقان القلب

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

مقدار المغنيزيوم في الدم.

قبل أو بعد ساعتين.

قد يبطئ إفراز

في Mecamylamine

البول. تجنب دمجها.

يخفف امتصاص

التتراسيكلين.

قد يرفع مستوى المغنيزيوم

كثيراً

Mecamylamine

تتراسيكلين

لـفيتامين D

التحليل Manganese

- يشترك في عملية مقاومة التأكسد

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يخفف من أعراض داء الربو.

- قد يحسن الخصوبة.

- قد يحفز نقل الفلوكوز.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة

أعراض النقص

ملاحظة. حالات النقص نادرة جداً لأن المنغنيز منتشر بوفرة في العديد من الأطعمة، فيما يحتاج الجسم إلى كميات ضئيلة منه.

- نمو غير طبيعي عند الأولاد

- ما من أعراض مثبتة ناجمة عن نقص المنغنيز عند الكبار.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- يتركز المنغنيز في خلايا الغدة النخامية، الكبد،

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462.

مصادر طبيعية

العاصوليا المجففة	دقيق الشوفان
التوت	الفول السوداني
النخالة	الهازيلا
الجوز الأمريكي	عشب البحر
الجزر	السبانخ
الكستناء	الشاي
البندق	الحبوب الكاملة

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي.
- يساعد العديد من الأنزيمات في توليد الطاقة.
- يساعد في استقلاب الكربوهيدرات.
- يساعد في عمل الأعصاب.
- يساعد في تكوين النسيج الضام.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أخرى:

راجع وزارة الصحة إن كنت تعمل في منجم أو مصنع للتأكد من عدم احتواء بيئة عملك على مقادير سامة من المنغنيز.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

هلوسات، أرق، إحباط وعنة.

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزحاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
فقدان الشهية.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
مشاكل في التنفس.	أطلب الإسعاف.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تعب غير اعتيادي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
الكالسيوم	قد يخفض امتصاص (من الأطعمة أو مكملات)
الحديد	قد يخفض امتصاص (من الأطعمة أو مكملات)
المغنيزيوم	قد يخفض امتصاص (من الأطعمة أو مكملات)

البنكرياس، الكليتين والعظام. إنه يحفز إنتاج الكولسترول في الكبد، وهو عامل مساعد للعديد من الأنزيمات.

● يعمل المنغنيز مع الفيتامين K لتحسين تخثر الدم.

معلومات متفرقة:

● المنغنيز متوافر بكثرة في العديد من الأطعمة.

● لا علاقة أبداً بين المنغنيز والمغنيزيوم.

متوافر في شكل

● كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من امتصاص المعدة.

● المنغنيز جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

● يتوافر أيضاً في شكل حقن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

كنت بصحة سليمة وتتناول الأكل جيداً.

إستشر الطبيب في حال:

● مرض الكبد.

● نقص الحديد.

فوق عمر 55 عاماً.

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل:

لا تتناولي المكملات المحتوية على المنغنيز إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

الإرضاع

لا تتناولي المكملات المحتوية على المنغنيز إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

تأثيره في التحاليل المخبرية

قد يؤدي فائض المنغنيز إلى انخفاض الحديد في المصل.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

مقدار المنغنيز في المصل.

بجرعات كبيرة

يخفض مستوى المنغنيز

في الدم

قد يخفض امتصاص

المنغنيز عند تناوله

بجرعات كبيرة.

حبوب منع الحمل.

موسفات

من أطعمة أو مكملات).

محوليل ينوم Molybdenum

الأنزيم الذي يشترك في تحويل الحمض الموي إلى الحمض البولي، والذي يتم التخلص منه بواسطة البول

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحمي الأسنان.
- قد يحسن امتصاص الحديد.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تعرض مؤخراً لإصابات أو جروح بالغة.
- الشخص المريض جداً الذي يتوجب إطعامه عبر الأوردة أو بواسطة أنبوب يدخل عبر الفم والمعدة

LOW أعراض النقص

ما من أعراض نقص ظاهرة عند البشر فالحالات نادرة جداً وتترافق مع بعض المشاكل الأخرى.

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا المعدن
- يصبح الموليبيدينوم جزءاً من العظام والكبد

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 461.

مصادر طبيعية

- القاصوليا.
- حبوب النباتات، الحبوب الكاملة.
- الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة.
- اللحم الهبر.
- اللحوم العضوية (الكبد، الكلية، بنكرياس العجل).
- البازيلا والخضار الأخرى.
- ملاحظة: قد يختلف تركيز الموليبيدينوم في الأغذية حسب حالة التربة التي زرعت فيها الحبوب والنباتات. ونادراً ما تظهر حالات نقص في الموليبيدينوم.

الفوائد

- يشجع على النمو الطبيعي.
- هو جزء أساسي من أنزيم xanthine oxidase.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض

يمكن أن ينجم داء النقرس وتناذر النقرس عن مأخوذ مفرط (10 إلى 15 ملغ/اليوم). ويؤدي الفائض المعتدل (لغاية 0.54 ملغ/اليوم) إلى نقص مفرط للنحاس في البول، ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لجزاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات متوقعة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
الحامض	يحافظ على نسبة ملائمة من الموليبدنيوم والنحاس في الدم. وحين يفيض مستوى الموليبدنيوم، ينخفض مستوى النحاس، والعكس صحيح. يؤدي ازدياد مأخوذ الكبريت إلى تضائل تركيز الموليبدنيوم.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من اختبارات متوافرة، إلا لأغراض مخبرية.

والكيتين.

- يشكل جزءاً من نظام أنزيم xanthine oxidase.

معلومات متفرقة.

يوفر الغذاء المتوازن كل الموليبدنيوم الضروري للولد أو الراشد السليم

متوافر في شكل

- كبسولات. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

- حقن يصفها الطبيب أو الممرض.

- الموليبدنيوم جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

ما من مشاكل متوقعة عند تناول جرعات تراوح من 0.15 إلى 0.5 ملغ/اليوم. لا تتناول جرعات أكبر من دون استشارة الطبيب.

استشر الطبيب في حال:

- مستويات مرتفعة من الحمض البولي.
- داء النقرس.
- نقص في النحاس.
- مرض في الكبد أو الكلية.
- فوق عمر 55 عاماً.

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل.

لا تتناوله.

الإرضاع

لا تتناوله

تأثيره في التحاليل المخبرية:

يؤدي فائض الموليبدنيوم إلى انخفاض مستوى النحاس في المصل.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد معروفة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من يعاني من تقيؤ طويل الأمد
- كل من له مأخوذة غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي يتناول كميات كبيرة من مضادات الحموضة.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.
- الذي خضع مؤخرًا لعملية جراحية.
- الذي يعاني من مرض في الكبد.
- المصاب بفقرط عمل الغدة الدرقية.

أعراض النقص

- ألم في العظام.
- فقدان الشهية.
- ضعف
- انكسار العظام بسهولة.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- إنه ضروري لاستعمال العديد من فيتامينات المركب B.
- إنه جزء أساسي مهم في كل الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والعديد من الأنزيمات.
- متوافر في شكل
- أقراص. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل. لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462

مصادر طبيعية

اللوز	الدواجن
الفاصوليا المجففة	بذور اليقطين
كبد العجل	اللحم الأحمر
جبن الشيدر	السردين المعلب
الجبن المبستر	الأسقلوب
	(محار مروحي الشكل)
الببيض	فول الصويا
السمك	بذور دوار الشمس
الحليب	الثونة
مشتقات الحليب	منتجات الحبوب الكاملة
الفول السوداني	
البازيلا	

الفوائد

- يقوي العظام والأسنان (مع الكالسيوم).
- يحسن استقلال الطاقة.
- يحسن نمو كل أنسجة الجسم ويسهم في صيانتها وإصلاحها.
- يخدم سائل الجسم للحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي.
- يحمس البول ويخفف إمكانية تكون الحصى في الكليتين.

الإرضاع

لا تتناول المكمّلات من دون استشارة الطبيب. لا تتناول جرعات مفرطة.

تأثيره في التحاليل المخبرية

قد يؤدي إلى انخفاض زائف في امتصاص العظام أثناء اختبارات التنظير التشخيصية.

حفظ المفتاح:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

- نوبات تشنج، عدم انتظام في خفقان القلب وضيق النفس.
- قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى إفراز الكالسيوم وبالتالي ترقق العظام.
- ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة، توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة) الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ألم في البطن. | توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب. |
| ألم في العظام أو المفاصل. | توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب. |
| مشاكل في الجهاز التنفسي. | توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب. |
| ارتباك | توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب. |

ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصرك الطبيب بغير ذلك.

• كبسولات لمحلول فموي: يتم ابتلاعها مع نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أصرك الطبيب بغير ذلك.

• محلول فموي: يتم ابتلاعه مع نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصرك الطبيب بغير ذلك.

• الفوسفور هو جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- مرض الكلى.
- حصى في الكلى، وقد أثبت التحليل أنها تتألف من فوسفات وأمونيوم ومغنيزيوم.
- إسنشر الطبيب في حال:
- قصور في عمل الغدة الدرقية.
- لين العظام.
- التهاب حاد في البنكرياس.
- مرض مزمن في الكلية.
- كساح الأطفال.
- نقص كظري (مرض أديسون).
- جفاف الجسم
- حروق بالغة
- مرض في القلب.
- الاستسقاء.
- ارتفاع ضغط الدم.
- تسمم الدم في الحمل.
- فوق عمر 55 عاماً
- ما من مشاكل متوقعة.
- الحمل:

لا تتناول المكمّلات من دون استشارة الطبيب. لا تتناول جرعات مفرطة

يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.	Captopril	يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.
يخفف من امتصاص الفوسفات.	سترويد قشري.	يخفف من امتصاص الفوسفات.
يزيد من الصوديوم في المصل	عقاقير كورتيزون.	يزيد من الصوديوم في المصل
يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.	مستحضرات ديجيتال.	يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.
قد يخفف من امتصاص الفوسفات.	ديلانتيين.	قد يخفف من امتصاص الفوسفات.
يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.	إينلابريل.	يزيد من خطر ارتفاع البوتاسيوم على نحو مفرط.
يجب تناولها قبل أو بعد ساعة أو ساعتين من تناول فوسفات البوتاسيوم لتفادي إعاقة مكمل الحديد.	مكملات الحديد.	يجب تناولها قبل أو بعد ساعة أو ساعتين من تناول فوسفات البوتاسيوم لتفادي إعاقة مكمل الحديد.
قد يزيد من تركيز الساليسيلات.	ساليسيلات.	قد يزيد من تركيز الساليسيلات.
يزيد من خطر داء الاستسقاء.	تستوستيرون.	يزيد من خطر داء الاستسقاء.
يحسن امتصاص الفوسفات لكنه قد يزيد احتمال وجود الكثير من الفوسفور في الدم وخلايا الجسم.	الفيثامين D.	يحسن امتصاص الفوسفات لكنه قد يزيد احتمال وجود الكثير من الفوسفور في الدم وخلايا الجسم.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

الفوسفور في المصل.

حيات تشنج.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
سحاض كمية البول في اليوم الواحد.	أطلب الإسعاف.	أطلب الإسعاف.
صفقان قلب سريع أو خيء أو غير منتظم صاع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنجات في العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
حذر أو وخز في اليدين و القدمين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
رتماش	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عطش غير اعتيادي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
سترويد ابتنائي.	يزيد من خطر داء الاستسقاء.
مضادات حموضة مع ألومنيوم أو مغنيزيوم.	قد يحول دون امتصاص الفوسفات.
مضادات حموضة ومكملات محتوية على الكلسيوم	قد يخفف من امتصاص الفوسفات.

البوتاسيوم Potassium

- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ نعم، لبعض الأشكال
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 477

معلومات أساسية

Potassium Chloride هو شكل البوتاسيوم الأكثر شيوعاً

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- الذي يتناول الأدوية المحدرة للبول أو عقاقير الكورتيزون أو مستحضرات الديجيتال.
- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة.
- الذي تخطى عمره 55
- المرأة الحامل أو المرضعة.
- المرأة التي تتناول حبوب منع الحمل.
- الذي يفرط في التدخين أو المخدرات الأخرى.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.
- الرياضيون والعمال الذين يمارسون نشاطات جسدية كثيفة، خصوصاً حين تكون القدرة على الاحتمال جانباً مهماً من التمرين
- الذي استئصل جزء من معدته أو أمعائه بواسطة عملية جراحية.
- الذي يعاني من مشاكل في الامتصاص.
- الذي تعرض مؤخراً لجروح أو قروح بالغة.
- النباتيون.

أعراض النقص

- نقص مستوى البوتاسيوم في الدم.
- ضعف، شلل.
- انخفاض ضغط الدم.
- خفقان سريع أو غير منتظم للقلب قد يؤدي إلى توقف القلب والموت

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

البوتاسيوم هو المنحل الكهربائي الإيجابي المهيمن في خلايا الجسم. ثمة أنزيم (adenosine triphosphatase) يضبط تدفق البوتاسيوم والصوديوم من وإلى الخلايا للحفاظ على حسن عمل القلب، الدماغ، عضلات الهيكل العظمي، الكليتين والتوازن

مصادر طبيعية

الهلينون	دبس السكر
الأفوكادو	البندق
الموز	الجزر الأبيض
الفاصوليا	البازيلا (الطازجة)
الشمام	البطاطا
الجزر	الزبيب
الشمندر	بديل الملح
الفاكهة الحمضية	السردين المغطى
عصير البرتقال والطماطم	
السبانخ الطازج	الحبوب الكاملة
الحليب	

الفوائد

- يحسن الخفقان الطبيعي للقلب.
- يحسن التقلص الطبيعي للعضلات
- ينظم نقل المواد المغذية إلى الخلايا.
- يحافظ على توازن المياه في أنسجة الجسم وخلاياه.
- يحافظ على حسن عمل خلايا الأعصاب، خلايا القلب، خلايا العضلات والهيكل العظمي، الكليتين وإفراز عصارة المعدة.
- يعالج نقص البوتاسيوم الناجم عن مرض أو تناول مدرات البول أو عقاقير الكورتيزون أو مستحضرات الديجيتال.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يعالج الإدمان على الكحول.
- قد يشفي حب الشباب.
- قد يعالج الحساسية.
- قد يشفي مرض القلب.
- قد يساعد في شفاء الحروق.
- قد يحول دور ارتفاع ضغط الدم.

لحمض القاعدي.

معلومات متفرقة

تحت طهو الأطعمة في كميات كبيرة من الماء.

متوافر في شكل

- محلول فموي: يتم ابتلاعه مع نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة ونصف لساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.
- البوتاسيوم غير موصى للأولاد.
- هناك بعض الأشكال المتوافرة وفق الاسم الأحيائي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- تناول أدوية مدرة للبول مقتصدة للبوتاسيوم.
- وجود حساسية لأي مكمل بوتاسيوم
- تعاني من مرض كلوي.
- استشر الطبيب في حال:
- مرض أديسون
- داء السكري.
- مرض القلب.
- انسداد معوي
- قرحة في المعدة
- تناول مدرات البول.
- تناول أدوية للقلب.
- تناول مسهلات أو المعاناة من إسهال مزمن.
- استخدام بدائل الملح أو الحليب قليل الملح

فوق 55 عاماً

- يجب الانتباه جيداً إلى مقدار الجرعات، لأن توازن البوتاسيوم بالغ الأهمية وقد يؤدي الانحراف عن المستوى الصحيح إلى نتائج خطيرة.
- يزداد خطر ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.

الحمل:

ما من مشاكل متوقعة. استشري الطبيب.

الإرضاع

لا تزال الدراسات غير حاسمة في هذا الصدد.

استشري الطبيب عن المكملات.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

- قد تتأثر دراسات عمل الكليتين ومخطط القلب

الكهريائي في حال وجود نقص أو فرط في البوتاسيوم.

- ما من تأثير متوقع في تحاليل الدم، باستثناء مستويات البوتاسيوم في المصل.

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أخرى:

تناوله مع الطعام.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

- خفقان سريع أو غير منتظم للقلب، شلل في الذراعين والساقين، انخفاض ضغط الدم، نوبات تشنج، غيبوبة، توقف القلب.
- ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. واجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لوجبة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
براز أسود.	أطلب الإسعاف
دم في البراز	أطلب الإسعاف.
صعوبة في التنفس.	أطلب الإسعاف.
ارتباك	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تعب شديد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ثقل في الساقين.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

مليينات الأمعاء	يخفف من تأثير البوتاسيوم.
Spironolactone	يزيد البوتاسيوم في الدم.
تريامتيرين	يزيد البوتاسيوم في الدم
الفيتامين B-12	قد تؤدي الأقراص القوية التأثير إلى تخفيف امتصاص الفيتامين B12
	وزيادة الحاجة إلى الفيتامين B12.

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص. قد يحتاج المدخن إلى كمالات البوتاسيوم.
الكحول تفاقم أعراض المعدة والأمعاء.
الكوكايين يسبب اضطراباً في خفقان القلب.
الماريجوانا تسبب اضطراباً في خفقان القلب.
المشروبات.

- المشروبات المالحة، مثل عصير الطماطم ومخمدرات العطش التجارية، تزيد من احتباس السوائل.
- تخفف القهوة من امتصاص البوتاسيوم وتعاكسه أعراض المعدة والأمعاء.
- الحليب القليل الملح يزيد من احتباس السوائل.
- الأطعمة
- الأطعمة المالحة تزيد من احتباس السوائل.
- يخفف السكر من امتصاص البوتاسيوم.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

- مستوى البوتاسيوم في المصل.
- مستوى الكرياتينين في المصل.
- التخطيط الكهربائي للقلب.
- مستوى pH في المصل.

خفقان غير منتظم للقلب. أطلب الإسعاف.	غثيان
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	خدر في اليدين أو القدمين.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	انزعاج في المعدة.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	وخز في اليدين أو القدمين.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	تقيؤ
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	وهن

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحّد
أميلوريد	يؤدي إلى ارتفاع خطير لمستوى البوتاسيوم في الدم.
الأثروبين	يزيد من احتمال القرحة في الأمعاء، التي تحدث عند تناول البوتاسيوم عبر الفم.
ست الحسن	يزيد من احتمال القرحة في الأمعاء، التي تحدث عند تناول البوتاسيوم عبر الفم.
الكليسيوم	يزيد من احتمال سوء انتظام خفقان القلب.
كابتوبريل	يزيد من احتمال تزايد البوتاسيوم بإفراط.
كورتيزون	يخفف من تأثير البوتاسيوم
مستحضرات ديجيتال	يزيد من احتمال سوء انتظام خفقان القلب.
إينالابريل	يزيد من احتمال تزايد البوتاسيوم بإفراط.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحمي من التأكسد المتزايد المرتبط بالتقدم في العمر.
- قد يحمي من مرض أوعية القلب والسكتات والنوبات القلبية
- ربما يخفف من تكتل الصفائح في الدورة الدموية ويحول دون الجلطات في أوعية القلب والدماغ.
- قد يحمي من الأذى الناجم عن التدخين.
- قد يكون مقاوماً فعالاً للتأكسد.
- قد يخفف من إعتام عدسة العين من خلال مقاومة التأكسد.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة
- الذي يعيش في منطقة تفتقر تربتها إلى السيلينيوم، كما في الصين وتايوان ونيوزيلندا وجنوب شرق الولايات المتحدة
- الذي يعاني من مرض في تجويف البطن.
- المصابون بالسيدا.

أعراض النقص

يؤدي نقص السيلينيوم إلى مرض عضلات القلب والعوت عند البشر.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن
يساعد السيلينيوم في حماية الجسم من التأكسد

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462.

مصادر طبيعية

الحليب	الخبالة
الفطر	البروكلي
الخميرة الغذائية	الأرز البني
دقيق الشوفان	الملفوف
البصل	الدجاج
ثمار البحر	الثوم
التونة	كلى الحيوانات
منتجات الحبوب الكاملة	الكبد

ملاحظة: يختلف محتوى السيلينيوم في الأطعمة كثيراً بسبب التنوع الكبير لهذا العنصر في التربة. فالأطعمة المزروعة في جنوب شرق الولايات المتحدة تحتوي مثلاً على مقدار أقل من السيلينيوم.

الفوائد

- يكمل الفيتامين E بمثابة مقاوم فعال للتأكسد.
- يشجع على النمو الطبيعي.
- يعمل بمثابة مقاوم للتأكسد.
- يحسن جهاز المناعة.
- يحمي من سرطان البروستات.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أخرى

إن العاملين في المناطق الصناعية التي تنتج الزجاج، مبيدات الحشرات، المطاط، أشباه الموصلات والنحاس هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض نتيجة الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد والابتلاع. وتشتمل الأعراض حينها على التهاب رئوي، داء الرئوي، انخفاض سريع في ضغط الدم، احمرار العينين، رائحة ثوم في البول والنفس، صداع، طعم معدني في الفم، احتياج في الأنف والحنجرة، صعوبة في التنفس، تقيؤ وضعف.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

- يتصلب احتمال التسمم مع السيلينيوم العضوي شرط عدم تخطي الجرعة الاعتيادية الموصى بها من قبل الصانع.
- تبين أن القاطنين في مناطق صناعية يعانون من أعراض التسمم نتيجة الجرعات المفرطة من السيلينيوم، ويكشفون عن أمراض في الكبد ومرض في عضلات القلب.
- يزداد احتمال تسوس الأسنان أو تساقطها عند الأولاد الذين يعيشون في مناطق ذات تربة غنية بالسيلينيوم.
- السيلينيوم هو جزء أساسي سام عند تناوله بجرعات مفرطة وقد يسبب تساقط الشعر، فقدان الأظافر، التعب، الغثيان، التقيؤ، الرضوخ والنفس الكريه.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

معلومات متفرقة

- يجب أن يكون السيلينيوم جزءاً من حمية المعادن والفيتامينات الحسنة التوازن.
- لم تثبت بعد حمايته من الاضطرابات الانحلالية البشرية.
- تحاول الدراسات المخبرية الإثبات أن السيلينيوم يؤدي دوراً أساسياً في مقاومة التأكسد وبالتالي الحماية من الجذور الحرة.
- إن الأشكال العضوية (من الأطعمة أو الخميرة) هي أقل سمية من سلفيد الصوديوم غير العضوي.
- لا يعرف أحد المقدار الصحيح الواجب تناوله كل يوم. فالدُّين يتناولون غذاءً متوازناً من الأطعمة المزروعة في غرب الولايات المتحدة يحظون ربما بالكمية الكافية من الأطعمة.

متوافر في شكل

- أقراص أو كبسولات: يتم ابتلاعها مع نصف كوب من الماء أو العصير. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.
- السيلينيوم جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة المعادن/الفيتامينات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت تنوي استعماله على الجلد أو فروة الرأس لمعالجة التهاب الجلد الزمامي أو القشرة وتعاني في الوقت نفسه من التهاب.

استشر الطبيب في حال:

أردت استخدام جرعة أكبر من تلك الموصى بها من قبل الصانع.

فوق عمر 55 عاماً:

ما من مشاكل متوقعة مع الجرعات العادية.

الحمل:

ما من مشاكل متوقعة مع الجرعات العادية.

الإرضاع:

ما من مشاكل متوقعة مع الجرعات العادية.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموجد
الفيتامين C	قد يخفف امتصاص السلينيوم عند تناوله في شكل غير عضوي.
الفيتامين E	يحول دون الأكسدة التي تسبب تفككاً للمواد الكيميائية في الجسم.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

جمع البول على مدى 24 ساعة

للجرعة المقرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
دوار وغثيان، من دون سبب ظاهري	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
أظافر هشة أو سوداء.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
رائحة ثوم دائمة في الجلد والنفس.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
جفاف غير اعتيادي عند استعماله على الجلد أو فروة الرأس.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تساقط غير اعتيادي للشعر أو تغير لونه	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

السليكون Silicon

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يساعد المراحل الأولى من امتصاص الكالسيوم.
- قد يحسن جهاز المناعة.
- قد يحول دون ترقق العظام.
- قد يحسن الأظافر والجلد والشعر.
- قد يخفف من مرض الأوعية القلبية.
- قد يخفف ضغط الدم.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

غير معروف.

أعراض النقص

ما من حالات نقص معروفة بسبب توافر السليكون في العديد من الأطعمة.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

التفاح	الخضار
الشعندر	النباتات الحذرية
الأرز البتي	فول الصويا
الكنبات	الحبوب الكاملة

الفوائد

ضروري لتكوين الكولاجين.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
الألومنيوم	يعاكس تأثير الألومنيوم.
البورون	يساعد الجسم في استخدام السليكون
الكالسيوم	يساعد الجسم في استخدام السليكون.
المغنيزيوم	يساعد الجسم في استخدام السليكون.
المغنيز	يساعد الجسم في استخدام السليكون.
البوتاسيوم	يساعد الجسم في استخدام السليكون.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من اختبارات موجودة بسبب عدم وجود نقص

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

• يؤدي دوراً أساسياً في نمو العظام.

• يقوي الأوعية الدموية والغضروف والأوتار.

معلومات متفرقة.

• إن معظم السليكون الموجود في الجسم متوافر في

الأنسجة الضامة

• أظهرت الدراسات على الخدين أن نقص السليكون

يسبب تشوهات في الجمجمة والعظام والمفاصل.

متوافر في شكل

• سائل- تناوله حسب توجيهات الصانع أو الطبيب.

• أقراص- تناولها حسب توجيهات الصانع أو

الطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

الحمل:

لا تتناوله.

الإرضاع

لا تتناوله.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

الفوائد الإضافية المحتملة

يبدو أن الأطعمة القليلة الصوديوم تخفف من ضغط الدم المرتفع لدى بعض الأشخاص.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من يعاني من فقدان طويل الأمد لسوائل الجسم نتيجة التقيؤ أو الإسهال.
- الذي يعاني من مرض أديسون.
- الذي يشرب الماء بإفراط لفترات طويلة من الوقت (وهذا مرض نفسي في العادة).
- الذي يعاني من بعض أنواع السرطان في الغدد الكظرية.
- الذي يتعرق بإفراط نتيجة التمارين أو الأعمال الشاقة.
- الذي يستخدم الأدوية المدرة للبول (كما ينصح المريض عادة بتناول غذاء قليل الصوديوم للتخفيف من احتباس السوائل).
- الذي يعاني من مرض مزمن في الكلى.
- أعراض النقص
- تشنجات في المعدة والعضلات.
- غثيان
- وهن
- فتور عقلي.
- تشنج وآلم في العضلات (عادة في الساقين).
- فقدان الشهية.
- في الحالات الحادة
- صدمة نتيجة انخفاض ضغط الدم.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462

مصادر طبيعية

الزيتون	اللحم المقدد
الكبيس	لحم العجل المجفف
	والطازج
اللحم المعالج	الخبز
المكسرات المملحة	الزبدة
الوجبات السريعة المملحة	البطليونس
السريدين المملح	الفول الأخضر
ملح المائدة (مصدر أساسي للصوديوم)	الحليب

المرغرين الطماطم المعلبة
ملاحظة: في معظم الأطعمة المعالجة والخضار المعلبة تجارياً، يضاف الملح لتحسين النكهة. ونذكر من الأطعمة المعالجة (والغنية أيضاً بالصوديوم) الحساء، المرق، الكبيس، رقائق البطاطا المقلية والوجبات السريعة.

الفوائد

- يساعد في تنظيم توازن الماء في الجسم.
- يؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على الضغط الطبيعي للدم.
- يساعد تقلص العضلات ونقل الأعصاب.
- ينظم التوازن الحمضي القاعدي في الجسم.

ما من مشاكل متوقعة لدى المتمتعين بصحة سليمة.
الحمل:

لا توصى النساء الحوامل بتخفيف مآخوذ الصوديوم من غذائهن.

الإرضاع

لا توصى النساء المرضعات بتخفيف مآخوذ الصوديوم من غذائهن.

تأثيره في التحاليل المخبرية

ما من تأثيرات متوقعة

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

معلومات أخرى:

● نلاحظ وجود مستويات ضئيلة من الصوديوم لدى المصابين بالتجفاف، أو الذين خضعوا مؤخراً لعملية جراحية، أو بعد فرز الكثير من العرق نتيجة ممارسة تمارين مجهدة في بيئة ساخنة.

● لعل السبيل الأمثل للتعرض عن نقص الصوديوم هو مراجعة الطبيب وإجراء العديد من التحاليل المخبرية.



الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

ورم الأنسجة، ذهول وغيبوبة.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية



الصوديوم هو منحل كهربائي موجود في كل خلايا الجسم. وظيفته الأبرز هي تنظيم توازن الماء داخل الخلايا وخارجها.
معلومات متفرقة:

● نحن نستهلك معظم الصوديوم في شكل كلورايد الصوديوم - ملح المائدة العادي.

● المشكلة الأكثر شيوعاً مع الصوديوم هي تناول الشخص السليم الكثير منه وليس القليل منه. يحتوي الغذاء المثالي على 3000 إلى 12.000 ملغ من الصوديوم كل يوم، أما المآخوذ الموصى به فهو 2400 ملغ في اليوم.

● يمكن أن تكون الكميات المفرطة من الصوديوم عاملاً أساسياً في زيادة ضغط الدم. لذا، يساعد تخفيف مآخوذ الصوديوم في خفض ضغط الدم.

● إن العلاقة بين مآخوذ الصوديوم وضغط الدم المرتفع هي في الواقع مرتبطة بنسبة الصوديوم على البوتاسيوم. هناك بعض الأشخاص الحساسون للصوديوم ويمكنهم خفض ضغط دمهم عند تناول غذاء قليل الصوديوم.

متوافر في شكل

أقراص كلورايد الصوديوم، لكنها قد تسبب كريباً في المعدة وتثقل الكليتين.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● قصور قلبي احتقاني.

● تشنج الكبد.

● فرط ضغط الدم.

● استسقاء ناجم عن أي سبب.

● تاريخ عائلي لضغط الدم.

● استشر الطبيب في حال:

● المعاناة من مرض في القلب أو الأوعية الدموية.

● مشاكل في النزف.

● صرع

● مرض كلوي.

فوق عمر 55 عاماً

وهم توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات متوقعة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

مستوى السوديوم في المصل.

التفاعل أو التأثير ما يجب معله

مع الجرعات المفرطة من السوديوم

قلق توقف عن تناوله إتصل فوراً

بالطبيب.

ارتباك توقف عن تناوله إتصل فوراً

بالطبيب.

استسقاء توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب

غثيان توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

أرق توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

تقيؤ أطلب الإسعاف.

الكبريت Sulfur

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحمي من المواد السامة.
- قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.
- تم استخدام ميثيل سلفونيل ميثان لمعالجة الحساسية.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

لا حاجة ربما إلى المكملات، إذ لم تسجل حالات نقص.

أعراض النقص

ما من أعراض موحدة.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- الكبريت هو جزء من التركيبة الكيميائية للسيستين، ميثيونين، تورين وغلوتاثيون.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

الفاصوليا المجففة
الببيض
السمك
الثوم
لحم الغنم الهبر
الحليب
الدواجن
بذور القمح

الفوائد

- يؤدي دوراً في تفاعلات تخفيف التأكسد.
- يساعد على إفراز الصفراء في الكبد.
- يساعد في الاستقلاب.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

يستبعد أن تكون الجرعة المفرطة مهددة للحياة أو تسبب أعراضاً خطيرة.

ما يجب فعله.

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لوجاجة كاملة)، الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

التدخين يخفف من الامتصاص. لذا، ينصح المدخنون بتناول مكملات الكبريت.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل مخبرية متوفرة، إلا لأغراض تجريبية.

• يساعد الكبريت في معالجة تسمم الألومنيوم

والكادميوم والزنك والرصاص.

• إنه جزء أساسي في البيوتين والفيتامين B1.

متوافر في شكل.

جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة المعادن/الفيتامينات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

ما من مشاكل متوقعة

استشر الطبيب في حال:

ما من مشاكل متوقعة.

فوق عمر 55 عاماً

ما من مشاكل متوقعة.

الحمل:

ما من مشاكل متوقعة.

الإرضاع

ما من مشاكل متوقعة.

تأثيره في التحاليل المخبرية

ما من تأثيرات متوقعة.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الفاناديوم Vanadium

معلومات أساسية

• متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

• متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا

• هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

النباتات الحبية الفطر

الشبث البقدونس

السك/ثمار البحر الصويا

الكبد

المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- ما من مشاكل متوقعة.
- استشر الطبيب في حال
- ما من مشاكل متوقعة
- فوق عمر 55 عاماً
- ما من مشاكل متوقعة.
- الحمل.
- ما من مشاكل متوقعة.
- الإرضاع
- ما من مشاكل متوقعة
- تأثيره في التحاليل المخبرية.
- ما من تأثيرات متوقعة.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

- العلامات والأعراض
- يحتمل أن يؤثر التسمم في عمل الكليتين أو الكبد أو الطحال أو نخاع العظمي.
- ما يجب فعله:
- لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن واستشر الطبيب
- للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لرجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات متوقعة

الفوائد

يؤدي دوراً في استقلاب الأسنان والعظام.

الفوائد الإضافية المحتملة

قد يحمي من النوبات القلبية

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

لا حاجة ربما إلى المكملات، إذ لم تسجل حالات نقص.

أعراض النقص

أدى إطعام الحيوانات لغذاء قليل الفاناديوم إلى تعطل القدرة على التوالد وازدياد نسبة الموت عند المواليد الحد.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

- أهميته غير معروفة عند البشر، لكن يعتقد إنها ضرورية.
- قد يكون جزءه من استقلاب الكوليسترول وكذلك إنتاج الهرمونات.
- معلومات متفرقة.
- حتى الغذاء غير الملائم من الناحية الغذائية يحتوي على كميات كافية من الفاناديوم، مما يحول دون نقصه.
- تجرى حالياً أبحاث حول دور مأخوذ الفاناديوم والغدة الدرقية.
- متوافر في شكل
- كبسولات: يتم ابتلاعها مع كوب من الماء. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.
- الفاناديوم جزء أساسي في العديد من المستحضرات

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من اختبارات متوارة إلا لأغراض التجربة.

التأثير الموحد

يتفاعل مع

قد يعيق الكروم عمل

الكروم

الفاناديوم والعكس صحيح.

الزئبق Zinc

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ لا
- هل الوصفة ضرورية؟ لا
- الكمية الموصى بها والمأخوذ الموصى به
والمأخوذ المثالي، راجع الصفحة 462.

مصادر طبيعية

لحم البقر

قلب الدجاج

صفار البيض

السمك

سمك الرنكة

لحم الغنم

شراب القيقب المركز

الحليب

دبس السكر

المحار

بذور السمسم

فول الصويا

بذور دوار الشمس

الديك الرومي

النخالة

الحنطة

منتجات الحبوب الكاملة

الخميرة

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن الخصوبة العادية.
- قد يزيد من الانتباه ويحسن الذاكرة القصيرة الأمد.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة، مثل النباتيين.
- الأولاد الصغار الذين لا يذهبون إلى المدرسة ويتناولون غذاء غير كافٍ.
- الذي تخطى عمره 55.
- الذي يعاني من مرض مزمن.
- الذي يخضع للكثير من الإجهاد لفترات طويلة.
- الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية.

الفوائد

- يشترك في التفاعلات المقاومة للتأكسد
- يحافظ على حاستي الذوق والشم

معلومات متفرقة.

● التسمم بالزنك من الاستنشاق حالة نادرة، لكنها تحدث في مصانع المواد الآتية: خلط المعادن، النحاس الأصفر، البرونز، الصمامات الكهربائية، لحام الغاز، الصفائح الكهربائية، الدهان، الزنك، المطاط، الطلاء بالزنك، قص المعادن، رش المعادن والسقوف.

● في حال تناول كميات الزنك، عليك تناولها مع الطعام للتخفيف من احتياج المعدة.

● في حال تناول الزنك لفترة طويلة، يجب أيضاً تناول النحاس بمعدل 2 إلى 23 ملغ/اليوم.

● قد تؤدي الجرعات الكبيرة من الزنك إلى تخفيض مستويات كولسترول HDL.

متوافر في شكل

● أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من السائل، لا يجوز مضغها أو سحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

● الزنك هو جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة المعادن/الفيتامينات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

وجود قرحة في المعدة أو المعى الاثني عشري.

إستشر الطبيب في حال:

● تريد تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع
● تريد تناول مكمل كلسيوم أو عقاقير تتراسيكلين (لأن الزنك قد يعيق امتصاص هذه الأدوية).

فوق عمر 55 عاماً

يزداد احتمال حدوث النقص.

الحمل:

● هناك العديد من الأغذية المحتوية على كميات ضئيلة من الزنك وقد لا تزود الجسم بحاجته إلى الزنك أثناء الحمل. إسألني الطبيب عن الكميات.

● إن استهلاك الزنك بإفراط خطر وقد يؤدي إلى مخاض مبكر أو ولادة جنين ميت.

● قد يكون النقص عاملاً في تسمم الدم وولادة أطفال

● الذي أصيب مؤخراً بجروح أو حروق بالغة.

● الذي يتناول مدرّات البول لأي سبب، مثل ارتفاع ضغط الدم والقصور القلبي الاحتقاني ومرض الكبد.

● الذي يعيش في منطقة تربتها مفتقرة إلى الزنك

● الذي يعاني من مرض في تجويف البطن.

● الذي يعاني من إسهال مزمن.

أعراض النقص

النقص المعتدل

● فقدان الشم والذوق.

● نمو بطيء لدى الأولاد.

● الصلع.

● طفح جلدي.

● رضوخ في الجلد.

● التهاب اللسان.

● التهاب الفم.

● التهاب جفني العين.

● العقم.

● انخفاض عدد المتي.

● تأخر في شفاء الجروح.

النقص الحاد

● تأخر في نضج العظام.

● تضخم الكبد أو الطحال.

● تضائل حجم الخصيتين.

● عمل الخصيتين أقل من المعتاد

● تضائل النمو أو القزم.

● مشاكل متعلقة بالعين مثل التهاب الأعصاب البصرية وسوء تمييز الألوان وإعتام عدسة العين.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا المعدن

يشكل الزنك جزءاً من التركيبة الجزيئية لأكثر من 80 أنزيماً معروفاً. تعمل هذه الأنزيمات بالتعاون مع خلايا الدم الحمراء لنقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين.

قرحة في المعدة
(ألم حارق في أعلى
الصدر يخف عند تناول
الطعام أو مضاد
الحموضة).
غثيان أو تقيؤ
توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
الكسيوم النحاس	يعيق امتصاص الكسيوم. يخفف امتصاص النحاس. يجب تناول جرعات كبيرة من الزنك للحصول على هذا التأثير.
عقاقير الكورتيزون	قد يعيق التحاليل المخبرية لقياس الزنك.
مدرات البول	يزيد من إفراز الزنك. لكن يجب تناول جرعات كبيرة من الزنك.
الحديد	يخفف امتصاص الحديد. يجب تناول جرعات كبيرة من الزنك للحصول على هذا التأثير.
حبوب منع الحمل	يخفف مستويات الزنك في الدم.
تتراسيكلين	يخفض مقدار التتراسيكلين الممتص في الدورة الدموية. يجدر بك عدم مزج الزنك مع التتراسيكلين، أو تناولهما بفاصل ساعتين على الأقل.
الفيتامين A	يساعد في امتصاص الفيتامين A.

التفاعل مع المواد الأخرى

المشروبات. لا يجدر بك استهلاك القهوة مع الزنك في
نفس الوقت لأن القهوة قد تعيق امتصاص الزنك.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

مستوى الزنك في المصل.

أدنى من الوزن المطلوب. إسألني الطبيب عن النصيحة.
● يعالج الزنك الغثيان أثناء الحمل.

الإرضاع

هناك بعض الأغذية المحتوية على كميات ضئيلة من
الزنك وقد لا تزود الجسم بحاجته إلى الزنك أثناء
الحمل. إسألني الطبيب عن المكملات.
تأثيره في التحاليل المخبرية.

● يخفف الزنك من مستويات الهرمونات الدهني ذات
الكثافة العالية لدى الشباب الذكور والذي يقلل من
خطر التعرض لمرض الأوعية التاجية للقلب.
● تؤدي الجرعات الكبيرة إلى خفض مستوى النحاس
في الدم.
حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل المعدن.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

● لا يحتمل حدوث تسمم عند تناول الجرعات الموصى
بها. ذكرنا أعراض التسمم في جدول التفاعلات
العكسية أو التأثيرات الجانبية.
● تؤدي الجرعات المفرطة إلى الدوار والنوم والصداع
وصعوبة في الكتابة ومشية ترنحية والأرق والتقيؤ
المفرط المسبب للجفاف.
ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول المعدن
 واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية
أو التأثيرات الجانبية
للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة
كاملة) الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
ألم في البطن.	أطلب الإسعاف.
نرف غير اعتيادي.	أطلب الإسعاف.
إسهال (خفيف).	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الاحماض الأمينية والأحماض النووية

الأحماض الأمينية

الأحماض الأمينية هي مجموعة كيميائية محتوية على النتروجين، الكربون، الأوكسجين والهيدروجين. تؤلف الأحماض الأمينية الهيكلية الأساسية للبروتينات، والتي بمعظمها ضرورية لنمو البشر وتغذيتهم. يفترض ألا يكون تناول المكملات التجارية أمراً ضرورياً.

الأحماض النووية

تحتوي هذه المواد الكيميائية على السكريات، الحمض الفوسفوري، قواعد البيرين والبيريميدين. وأبرز الأحماض النووية الخاضعة للدراسة هي الحمض النووي الريبي RNA والحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسجين DNA. واللافت أن الأحماض النووية الداخلة إلى الجسم في شكل مكملات هي قليلة أو عديمة الجدوى. أما الأحماض النووية الداخلة إلى الجسم في شكل حقن فقد تكون خطيرة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذة غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط
- الذي تعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.
- الذي يعاني من مرض يجمع جهاز المناعة، مثل السيدا.

أعراض النقص

- لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.
- ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين. لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.
- خلل في إنتاج الإنسولين
- خلل في استقلاب الlipid في الكبد.

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا الحمض الأميني
- يشكل جزءاً من كل البروتينات.
- يحسن نشاط وحجم الغدة الصعترية، مما يزيد من إنتاج الخلايا الأساسية لجهاز المناعة.
- معلومات متفرقة.
- قيل إن الأرجينين يزيد من نشاط بعض فيروسات العقبولة، ويقمع أخرى.
- في حال تناول الأرجينين بمثابة مكمل، يجب تناوله والمعدة فارغة قبل الخلود إلى النوم.
- متوافر في شكل
- أقراص أو كبسولات. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من

معلومات أساسية

الأرجينين هو حمض أميني

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| الأرز الأسمر | الذرة |
| الخروب | الزبيب |
| الشوكولاته | الحبوب النينة |
| البندق | بذور السمسم |
| دقيق الشوفان | بذور دوار الشمس |
| الفول السوداني/زبدة الفول السوداني | |
| منتجات الحبوب الكاملة | |

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- يحفز هرمون النمو البشري.
- ينشط جهاز المناعة.
- يساعد في معالجة مرض السيدا من خلال تنشيط خلايا جهاز المناعة.
- يستخدم لمعالجة اضطرابات الكبد.
- يزيد من الاستقلاب في الخلايا الدهنية للتخفيف من السمنة.
- يقوي العضلات
- يسرع شفاء الجروح.

الفوائد الإضافية المحتملة

قد يجمع السرطان ونمو الأورام.

لأن هذا قد يسبب تشوهات في العظام.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تفضي إلى أعراض مهمة.
ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ملاحظة: أفضت الشواذب في مكملات الأحماض الأمينية إلى العديد من المشاكل الصحية
التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

إسهال (من جرعات كبيرة) خفف الجرعة أو توقف نهائياً عن تناولها.
غثيان (من جرعات كبيرة) خفف الجرعة أو توقف نهائياً عن تناولها.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية.

الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

• مسحوق لمحتلول قموي: يتم تذويبه في نصف كوب من المياه الباردة أو العصير. يجب تناوله مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- لا يزال الشخص ولداً أو مراهقاً غير مكتمل النمو.
- وجود حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض والحليب والقمح.
- معرض لسوء التغذية لأي سبب.

استشر الطبيب في حال

المعاناة من مرض العظام فوق عمر 55 عاماً:

لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.
الحمل:

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني
معلومات أخرى:

لا يجدر بالأولاد والمراهقين تناول أي مكمل أرجنتين

- مرضى الرضوح أو مرضى السرطان الخاضعون للعلاج الكيميائي.

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة
ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين، لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا الحمض الأميني
- يتحول إلى حمض الغلوتاميك عند مروره عبر حاجز الدم-الدماغ (حمض الغلوتاميك أساسي لعمل الدماغ)
- يشارك في تنظيم التوازن الحمضي/القلوي الصحيح.
- يشارك في تحليل حمضي "DNA" و "RNA".
- معلومات متفرقة.
- يزداد احتمال ظهور التأثيرات الجانبية لدى المصابين بسوء التغذية الذين يتناولون مكملات الأحماض الأمينية.
- تحتوي العضلات على كميات كبيرة من الغلوتامين.
- يعتبر الغلوتامين من الأحماض الأمينية غير الأساسية، لكن الدراسات الحديثة أشارت إلى أنه بالغ الأهمية في حالات الضغط الشديد.
- متوافر في شكل مسحوق. إتبع تعليمات الصانع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

معلومات أساسية

يتحول الغلوتامين إلى حمض أميني اسمه الحمض الغلوتاميك.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

البقدونس النقي
السبانخ

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- يساعد الجهاز الهضمي.
- مهم لنمو العضلات.
- يخفف من تهديد العضلات.
- يحسن عمل الجهاز الهضمي لدى المصابين بالرضوح أو السرطان ويخضعون لمعالجة كيميائية.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يعالج القرحة الهضمية والمشاكل المعوية.
- ربما يعالج أمراض النسيج الضام والأذى اللاحق بالأنسجة نتيجة علاج إشعاعي.
- قد يحسن عمل الدماغ والنشاط العقلي من خلال تحسين مستويات حمض غاما الأمينوبوتيريك.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الذي يشهد تدهيداً لعضلاته نتيجة مرض (مثل السرطان أو السيدا).

العلامات والأعراض:

- قد يخفف من إنتاج هرمون النمو.
- يخفف من مخمد البيكربونات (مما يغير التوازن الحمضي القاعدي في المعدة).
- ما يجب فعله.
- لأعراض الجرعة المفرطة توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب.
- للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية.

● وجود مشاكل في الكلىتين.

● تشمع الكبد.

● تناذر راي.

إستشر الطبيب في حال:

الخضوع حالياً لعلاج كيميائي.

فوق عمر 55 عاماً.

لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.

الحمل:

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

● عليك إبقاء المكمّل جافاً تماماً كي لا تتبدد

صلاحيته.

معلومات أخرى

● من الأفضل استهلاك بروتينات كاملة بدل

الأحماض الأمينية الفردية.

الجرعة المفرطة/السمية

ل-سستين L-Cysteine

مصادر طبيعية

النباتات الحبية (بعضها).

مشتقات الحليب.

البيض

اللحم

الحبوب الكاملة

معلومات أساسية

ل-سستين هو حمض أميني.

● متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

● متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

● هل الوصفة ضرورية؟ لا

• مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.

النقص الحاد

- اللامبالاة
- تغير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة)
- النعاس.
- ضرر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون.
- رضوض في الجلد.
- وهن.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني

- يشكل جزءاً من كل البروتينات.
- يسهم في تحليل الفلوتاثيون، وهي مادة تبطل مفعول المواد الملوثة، بما في ذلك دخان السجائر.
- معلومات متفرقة.
- إن المعانين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول كميات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية.

- تناول كميات ل-سنتين مع الفيتامين C، شرط تناول الفيتامين C مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من ل-سنتين، وذلك للحؤول دون تكوّن الحصى في المرارة أو المثانة.

- يتم استخدام ل-سنتين تحت إشراف طبي في غرف الطوارئ لحماية الكبد من الجرعات الكبيرة ل-Methenacetaminop

متوافر في شكل

- كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض،

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- يتخلص من بعض المواد الكيميائية السامة، مما يجعلها غير مؤذية (مقاوم للتأكسد).

الفوائد الإضافية المحتملة

- إنه أحد الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت في شكل يعتقد أنه يبطل نشاط الجذور الحرة، مما يوفر الحماية للخلايا ويحفظها.
- قد يساعد في تقوية العضلات.
- قد يحرق الدهون.
- قد يحمي من التسمينات والمواد الملوثة، ومنها تلك الموجودة في دخان السجائر والكحول.
- قد يحارب التهاب المفاصل.
- قد يسهم في إصلاح بعض أنواع "DNA".
- ربما يساعد في علاج مشاكل الجهاز التنفسي.
- قد يبطئ توالد الفيروسات في مرض السيدا.
- قد يعالج داء الربو عند استنشاقه في شكل رذاذ.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط.
- الذي تعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة

ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين. لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

النقص المعتدل:

- نمو بطيء عند الأولاد.

كاملة) الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحّد
الأنسولين	قد يبطل تأثير الأنسولين.
غلوتامات أحادي الصوديوم.	قد يزيد ل-سستين من سمية غلوتامات أحادي الصوديوم عند الذين يعانون من "تناذر المطعم الصيني". يسبب ذلك الصداع والدوار والارتباك والإحساس بالحرق.
الميتامين C	عند تناول الفيتامين C مع ل-سستين، يمنع ل-سستين من التحول إلى سستين، مما يؤدي إلى تكوّن الحصى في المرارة أو الكلية.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوامة، إلا لأغراض تجريبية.

الحليب والقمح.

• داء السكري.

• أرادت تناوله من دون إشراف طبي.

إستشر الطبيب في حال.

• داء السكري.

• البيلة السستينية

فوق عمر 55 عاماً

لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.

الحمل.

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تفضي إلى أعراض مهمة.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لرجاجة

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.

ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين، لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

النقص المعتدل:

- نمو بطيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.

النقص الحاد:

- اللامبالاة.
- تغير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).
- النعاس.
- ضرر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون.
- رضوض في الجلد.
- ومن.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني

- ل-ليسين هو أحد الأحماض الأمينية الثمانية الأساسية التي لا ينتجها الجسم.
- تشارك كل الأحماض الأمينية البيولوجية في تحليل البروتينات في الأجسام الحيوانية.

معلومات متفرقة

- ما من دليل علمي يظهر فائدة المكملات أو الحاجة إليها.
- إن المعامين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية.

متوافر في شكل

- كبسولات. يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو

معلومات أساسية

ل-ليسين هو حمض أميني.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

البطاطا	الحب
اللحم الأحمر	البيض
منتجات الصويا	السمك
الخميرة	الفاصوليا اللينة
	الحليب

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- يحسن النمو، إصلاح الأنسجة وإنتاج الأجسام المضادة، الهرمونات والأنزيمات.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحمي من فيروسات العقبولة.
- قد يحول دون تكرار قرحات البرد ويخفف من حدة تنفسي المرض.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط

أعراض النقص

Flow

والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تقضي إلى أعراض مهمة. ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب. للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

الأطعمة الغنية بالأرجنتين (بندق، شوكولاته، بذور، خروب وزبيب) تخفف من قدرة ل-ليسين على الحؤول دون قرحات البرد أو التخفيف من حدتها.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية

العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

• ل-ليسين هو جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة الفيتامينات/المعادن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض، الحليب والقمح.
- التعرض لسوء التغذية لأي سبب كان.
- أردت تناوله من دون إشراف طبي.

استشر الطبيب في حال:

داء السكري

فوق عمر 55 عاماً

لا تتناول كميات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.

الحمل:

لا تتناولي كميات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي كميات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

ميثيونين Methionine

معلومات أساسية

الميثيونين هو حمض أميني.

• متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

• متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

• هل الوصفة ضرورية؟ لا

- النعاس.
- خدر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون.
- رضوخ في الجلد.
- وهن

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني

يشكل جزءاً من كل البروتينات.

معلومات متفرقة:

- قد يساعد الحمض الأميني المحتوي على الكبريت (مثل الكولين والتورين) على التخلص من المواد الدهنية التي قد تسد الشرايين الأساسية.
- إن المعانين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية.
- يحتاج عدد قليل من الأشخاص إلى مكملات الميثيونين.
- متوافر في شكل
- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو مباشرة بعده للتخفيف من احتياج المعدة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض، الحليب والقمح.
- كنت معرضاً لسوء التغذية لأي سبب كان.
- إستشر الطبيب في حال.
- أردت تناول الميثيونين من دون إشراف طبي.
- فوق عمر 55 عاماً.
- لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة

مصادر طبيعية

الفاصوليا	العدس
البيض	اللحم
السكك	الحليب
الثوم	البصل

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- الفوائد الإضافية المحتملة
- قد يكون فعالاً المساعد في معالجة الإحباط. إستشر الطبيب.
- قد يعتمد السستين والتورين على الميثيونين للتحليل في الجسم البشري.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- النباتيون
- الذي تعرض مؤخراً لحروق أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.

اعراض النقص

- لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.
- ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين، لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا
- النقص المعتدل:
- نمو بطيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم
- النقص الحاد:
- اللامبالاة
- تغير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).

سليمة.

الحمل:

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

لأعراض الجرعة المفرطة. توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب.

للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

ما من تفاعلات معروفة

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأعراض تجريبية.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة

أو تفضي إلى أعراض مهمة.

ما يجب فعله

فيلين ألانين Phenylalanine

منتجات السكر مع

الأسبارتام

الحليب المجفف الخالي من

الدسم

جبن المراعي

العاصوليا اللبمية

معلومات أساسية

الفيلين ألانين هو حمض أميني.

متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

هل الوصفة ضرورية؟ لا

الفوائد

● يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.

● قد يرفع على المدى القصير مستويات

النورإيبينفرين، والدوبامين، والإبينفرين. الأمر الذي

يعتبر مفيداً أحياناً ومؤذياً أحياناً أخرى (لا تتناوله

من دون إشراف طبي)

مصادر طبيعية

الفول السوداني

مك الرنكة المخمل

ذور اليقطين

بذور السمسم

اللوز

الأفوكادو

الموز

الجبن

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد إضافية معروفة.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط.
- الذي تعرض مؤخراً لجروح أو حروق بالغة
- الأطفال المولودون قبل أوانهم

اعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.

ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين. لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

النقص المعتدل:

- نمو بطيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.

النقص الحاد:

- اللامبالاة.
- تغير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).
- العاس.
- ضرر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون.
- رضوض في الجلد.
- ومن.

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني

إنه يشترك في إنتاج الدوبامين والإبينفرين، مما يؤثر في نقل الدفعات داخل الدماغ البشري والأجزاء الأخرى من الجهاز العصبي.

معلومات متفرقة.

- إذا تناول الشخص السليم الصحة المكملات لا

يصبح أبداً بصحة أفضل.

- إن المعانين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية

متوافق في شكل

- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

- هناك ثلاثة أشكال مختلفة من الفينيلالانين. DL و D و L. والنوع L هو الأكثر شيوعاً. يستشر الطبيب بشأن النوع الأمثل بالنسبة إليك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض والحليب والقمح
- كنت معرضاً لسوء التغذية لأي سبب.
- المعاناة من صداع الشقيقة.
- المعاناة من بيلة الفينيل الكيتونية. PKU.
- المعاناة من الورم القحطاني الخبيث، وهو شكل مميت من سرطان الجلد.
- تناول قاصع أو أكسيداز أحادي الأمين بمثابة مقاوم للإحباط
- المعاناة من داء السكري.

لا تتناوليه في حال:

- كنت حاملاً.
- المعاناة من نوبات القلق.

يستشر الطبيب في حال:

- ارتفاع ضغط الدم.
- تناول دواء مع الفينيل ألانين لأي سبب كان من دون استشارة الطبيب.
- فوق عمر 55 عاماً.

لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.

الحمل:

- لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.
- يتوجب على النساء الحوامل والأولاد المصابين

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية



التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
انخفاض ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع الشقيقة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ارتفاع ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
ارتفاع ضغط الدم على نحو خطراً أو مهدد للحياة.	العقاقير المضادة للإحباط (المحتوية على مخدرات أوكسيداز أحادية الأمين).
تيروسين	التأثير الإضافي للفينيل ألانين يزيد كثيراً من احتمال التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها.

التفاعل مع المواد الأخرى

تحاليل مخبرية لكشف النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية.

يمرض ببيلة الفينيل الكيتونية أن يتناولوا غذاءً خالياً من الفينيل ألانين للحفاظ على صحتهم. يجب استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية.

ما من تأثيرات معروفة

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

معلومات أخرى:

• يؤدي الفينيل ألانين إلى رفع ضغط الدم أكثر.

• قد يسبب تأخرًا عقلياً لدى الأولاد المصابين ببيلة الفينيل الكيتونية.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تفضي إلى أعراض مهمة.

ما يجب فعله:

لأعراض الجرعة المفرطة. توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزوجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

Serine سيرين

مصادر طبيعية

مشتقات الحليب

اللحوم

الفول السوداني

غلوتين القمح

الصويا

معلومات أساسية

السيرين هو حمض أميني.

• متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم

• متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم

• هل الوصفة ضرورية؟ لا

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال
- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض والحليب والقمح.
- أردت تناوله من دون إشراف الطبيب.
- يستشر الطبيب في حال تنوي تناول السيرين.
- فوق عمر 55 عاماً
- لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.
- الحمل
- لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.
- الإرضاع
- لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.
- تأثره في التحاليل المخبرية.
- ما من تأثيرات معروفة.
- حفظ المنتج:
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

الجرعة المفرطة/السمية

- العلامات والأعراض:
- غير معروفة
- ما يجب فعله:
- لأعراض الجرعة المفرطة تترك فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب.
- للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى
- التفاعلات العكسية أو
- التأثيرات الجانبية
- ما من تفاعلات معروفة.

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.
- يساعد في استقلاب الدهون.
- مهم لنمو العضلات.
- يستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة بمثابة مرطب طبيعي.

الفوائد الإضافية المحتملة

ما من فوائد إضافية معروفة.

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

كل من له مأخوذ غير ملائم من الوحدات الحرارية أو المواد المغذية، أو له حاجات غذائية متزايدة

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة. ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين، لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

كيفية الاستعمال

- أهمية هذا الحمض الأميني
- إنه يساعد في إنتاج الأجسام المضادة.
- معلومات متفرقة:
- إن الصمغين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية.
- يعتبر السيرين حمضاً أمينياً غير أساسي.
- متوافر في شكل
- جزء أساسي في بعض مكملات الأحماض الأمينية.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تورين Taurine

والمراهقين.

- قد يقوي عضلة القلب.
- قد يخفف من سمية أدرياميسين.
- قد يسهم في ضبط ضغط الدم المرتفع.
- قد يخفف من تكتل الصفائح.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط.
- الذي تعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.

ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين. لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا

النقص المعتدل

- نموبطيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.
- النقص الحاد

معلومات أساسية

التورين هو حمض أميني غير أساسي، يستطيع الجسم إفرازه.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

حليب الثدي

البيض

السماك (خصوصاً المحار والبطلينوس).

اللحم

الحليب

ملاحظة، غير متوافر من مصادر نباتية.

الفوائد

- يساعد في تنظيم توازن السوائل.

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يضبط إيقاع القلب.
- قد يسهم في الدفاع عن مقاوم التأكسد.
- قد يكون ضرورياً لنمو الأطفال والأولاد

- أودت تناول التورين من دون إشراف طبي.
- فوق عمر 55 عاماً.
- لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.
- الحمل:
- لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.
- الإرضاع
- لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.
- تأثيره في التحاليل المخبرية
- ما من تأثيرات معروفة
- حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني

الجرعة المفرطة/السمية

- العلامات والأعراض.
- لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تفضي إلى أعراض مهمة.
- ما يجب فعله:
- لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب. راجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.
- للجرعة المفرطة الغرضية (مثل تناول الولد لزجاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير	ما يجب فعله
انخفاض في الجهاز العصبي المركزي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عيوب في الذاكرة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- اللامبالاة.
- تغيير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).
- المعاس.
- ضرر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون
- رضوض في الحلق.
- ومن.

كيفية الاستعمال

معلومات متفرقة

- يتم تركيب التورين من الميثيونين والستين. والفيتامين B-6 أساسي لهذا التركيب.
- الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة لا يحتاج إلى المكملات.
- إن المعانين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية.

متوافر في شكل

- أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.
- كبسولات: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال
- لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض والحليب والقمح.
- كنت معرضاً لسوء التغذية لأي سبب.
- المعاناة من قرحة في المعدة.
- استشر الطبيب في حال:
- الصرع
- مشاكل في العينين

الأطعمة والمشروبات: قد يؤدي مأخوذ غلوتامات أحادي الصوديوم والأسبارتام إلى تخفيض مستويات التورين.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية.

التفاعل مع الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع مضادات التشنج. قد يخفف من تواتر النوبات. التأثير الموحد

التفاعل مع المواد الأخرى

تريبتوفان Tryptophan (خطر لا تناول)

- قد يساعد على النوم.
- قد يقاوم الإحباط
- قد يساعد في معالجة الإدمان على الكوكايين.
- قد يخفف الحساسية تجاه الألم المعتدل.

من يستفيد من الجرعات

الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط
- الذي تعرض مؤخرًا لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة. ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين. لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا. النقص المعتدل.

- نموي طيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.
- النقص الحاد:
- اللامبالاة.

معلومات أساسية

التريبتوفان هو حمض أميني.

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

الشعير
اللحوم (البقر، الدجاج، البط، الديك الرومي)
الحليب
الأرز الأسمر
جبن المرامي
السمك (التونة، السرطان، المحار)
الفاول السوداني
فول الصويا

ملاحظة: لا يمكنك الحصول على كمية كافية من التريبتوفان من المصادر الطبيعية لإحداث تفاعلات معاكسة.

الفوائد

يعمل بمثابة جزء أساسي أساسي لكل البروتينات.

الفوائد الإضافية المحتملة

لا تتناول التريبتوفان

تأثيره في التحاليل المخبرية

ما من تأثيرات معروفة

معلومات أخرى:

• أدى التريبتوفان إلى كثرة الحمضات في الدم، وهو

تفاعل عكسي قاتل.

• في الدراسات المخبرية التي أجريت على الحيوانات

المصابة بنقص الفيتامين B-6، تبين أن الجرعات

الكبيرة من التريبتوفان أفضت إلى سرطان في المثانة.

• إن كانت خزانة دوائك تحتوي على التريبتوفان،

تخلص منه.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

قد يسبب كثرة الحمضات في الدم، وهو تفاعل عكسي

قاتل.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول

الحمض الأميني واستشر الطبيب، راجع أيضاً فقرة

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزجاجة

كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

لقد أدى التريبتوفان إلى كثرة الحمضات في الدم، وهو

تفاعل عكسي قاتل.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

ما من تفاعلات معروفة.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

• تغير لون الشعر.

• الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).

• النعاس

• ضرر في الكبد

• فقدان العضلات والدهون.

• رضوخ في الجلد.

• وهن

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني:

• يشكل جزءاً من كل البروتينات.

• يشارك في التحليل الأحيائي لنفاقل عصبي اسمه

السيروتونين، مما يدفع ربما إلى المراحل الأولى من

النوم.

معلومات متفرقة:

أفضت المحكمات العلوية إلى موت العديد من

الأشخاص في الولايات المتحدة.

متوافر في شكل

• تم سحب التريبتوفان من أسواق الولايات المتحدة.

• يتوافر الآن مكمّل 5-hydroxytryptophan (5-HTP)

الذي يحتوي على شكل من التريبتوفان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله.

إذ قد يسبب كثرة الحمضات في الدم، وهو تفاعل

عكسي قاتل. أعلنت وزارة الصحة الأميركية أن

التريبتوفان غير آمن وسحبته من الأسواق التجارية.

استشر الطبيب في حال:

• تناول أدوية تدفع إلى النوم.

• المعاناة من داء الربو، لأن التريبتوفان قد يزيد من

مشاكل التنفس.

• تناولت أو تتناول حالياً مضادات للإحباط

فوق عمر 55 عاماً

لا تتناول التريبتوفان.

الحمل.

لا تتناول التريبتوفان.

الإرضاع

- قد يخفف من دهن الجسم.
- قد يساعد في الشفاء من الإدمان على الكوكايين (تحت إشراف طبي).

من يستفيد من الجرعات الإضافية؟

- كل من له مأخوذ غذائي غير ملائم من البروتينات.
- الأولاد والنساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يتناولن النباتات فقط.
- الذي يتعرض مؤخراً لجروح أو حروق بالغة.
- الأطفال المولودون قبل أوانهم.

أعراض النقص

لم يعرف العلم حالات نقص في حمض أميني واحد، إلا لدى الأشخاص الذين يقتصر غذاؤهم على بعض الأطعمة.

ويبدو أن نقص الأحماض الأمينية أكثر شيوعاً نتيجة النقص الإجمالي للبروتين، لكن هذه الحالة نادرة في الولايات المتحدة وكندا.

النقص المعتدل:

- نمو بطيء عند الأولاد.
- مستويات منخفضة من البروتينات الأساسية في الدم.

النقص الحاد:

- اللامبالاة.
- تغير لون الشعر.
- الاستسقاء (فائض السوائل في الأنسجة الضامة).
- المعاس.
- خسر في الكبد.
- فقدان العضلات والدهون.
- رضوخ في الجلد.
- وهن.

أعراض غير مثبتة

- فقدان الاهتمام الجنسي.

معلومات أساسية

- متوافر من مصادر طبيعية؟ نعم
- متوافر من مصادر اصطناعية؟ نعم
- هل الوصفة ضرورية؟ لا

مصادر طبيعية

الفاصوليا المعلبة	الفاصوليا الليمية
الجبن، وخصوصاً الشيدر	اللحم
جبن المرامي	بذور اليقطين
البيض	المحار
السمك	فول الصويا
البوظة	

الفوائد

- يعمل بمثابة جزء أساسي في كل البروتينات.
- قد يرفع على المدى القصير مستويات النورإبينفرين، والدوبامين، والإبينفرين، الأمر الذي يعتبر مفيداً أحياناً ومؤذياً أحياناً أخرى (لا تتناوله من دون إشراف طبي).

الفوائد الإضافية المحتملة

- قد يحسن المزاج.
- قد يساعد في التخفيف من الإحباط العقلي.
- قد يحسن الذاكرة.
- قد يخفف من الألم.
- قد يزيد من اليقظة الفكرية.
- قد يخفف من أعراض مرض باركنسون (تحت إشراف طبي).
- قد يعالج التعب المزمن.
- قد يخفف من الإجهاد.

- أردت تناول التبروسين لأي سبب كان من دون إشراف طبي.
- فوق عمر 55 عاماً
- لا تتناول مكملات الحمض الأميني إن كنت بصحة سليمة.
- الحمل

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

الإرضاع

لا تتناولي مكملات الحمض الأميني.

تأثيره في التحاليل المخبرية:

ما من تأثيرات معروفة.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل الحمض الأميني.

معلومات أخرى:

قد يؤدي التبروسين إلى ارتفاع ضغط الدم كثيراً في بعض الأحيان.

الجرعة المفرطة/السمية

العلامات والأعراض:

لا يحتمل أن تسبب الجرعة المفرطة خطراً على الحياة أو تفضي إلى أعراض مهمة.

ما يجب فعله

لأعراض الجرعة المفرطة: توقف فوراً عن تناول الحمض الأميني واستشر الطبيب. واجع أيضاً فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية.

للجرعة المفرطة العرضية (مثل تناول الولد لزحاجة كاملة): الاتصال فوراً بالإسعاف أو بأقرب مستشفى

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية

التفاعل أو التأثير ما يجب فعله

انخفاض ضغط الدم. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

صداع الشقيقة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً

• عتة الذكر

• ذاكرة سيئة.

• سمنة

كيفية الاستعمال

أهمية هذا الحمض الأميني:

إنه يشترك في إنتاج الدوبامين والإبينفرين، مما يؤثر في نقل الدفعات داخل الدماغ البشري وأجزاء أخرى من الجهاز العصبي

معلومات متفرقة

• إذا تناول الشخص الذي يمتنع بصحة جيدة المكملات، لا يصبح أفضل حالاً.

• إن المعانين من سوء التغذية هم أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية عند تناول مكملات الأحماض الأمينية، إذ يصيبهم خلل في توازن الأحماض الأمينية

• يجب تناوله مع وجبة غنية بالكربوهيدرات أو قبل الخلود إلى النوم.

متوافر في شكل

أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف الساعة من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• لديك حساسية لأي بروتين في الطعام، مثل البيض والحليب والقمح.

• كنت معرضاً لسوء التغذية لأي سبب

• المعاناة من صداع الشقيقة.

• المعاناة من PKU

• المعاناة من الورم القحطاني الخبيث، وهو شكل مميت من سرطان الجلد.

• تناول أي مخمد أكسيداز أحادي الأمين بمشاببة مقاوم للإجباط

استشر الطبيب في حال

• المعاناة من ضغط الدم المرتفع.

للتقيوسين يزيد كثيراً من
احتمال التأثيرات الجانبية
غير المرغوب فيها.

التفاعل مع المواد الأخرى

ما من تفاعلات معروفة.

تحاليل مخبرية لكشف

النقص

ما من تحاليل متوافرة، إلا لأغراض تجريبية.

بالطبيب.

ارتفاع ضغط الدم. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

التفاعل مع الأدوية أو

الفيتامينات أو المعادن

يتفاعل مع	التأثير الموحد
مضادات الإحباط	قد يرفع ضغط الدم على نحو
(محتوية على مخمدات	خطر أو مهدد للحياة.
أكسيداز أحادية الأمين).	
فينيل ألانين.	إن التأثير الإضافي

مكملات الطعام

إن المواد المذكورة في هذا القسم ليست فيتامينات ولا معادن ولا أعشاب. وتجدر الإشارة إلى وجود الكثير من المكملات الأخرى غير المذكورة هنا. ولا تزال أهمية هذه المكملات في التغذية البشرية والصحة موضع جدل بين الباحثين.

إستشر الطبيب في حال:

تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والد عال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منع أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- الجرعة الآمنة:
- في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة "الآمنة"
- هذا المكمل متوافر في شكل سائل أو كبسولات وأقراص أو مسحوق أو في مشتقات الحليب مثل اللبن.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

معلومات أساسية

الميلبة الحمضة هي جرثومة موجودة في اللبن والكفير (نوع من اللبن) ومنتجات أخرى. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل: أنزيمات للمساعدة في الهضم.

التأثيرات المعروفة

- يساعد في الحفاظ على التوازن الجرثومي الطبيعي في أسفل المعي.
- يقتل الفطريات الطوقية (المُبيّضات) والفطور السكرية والفطريات بمجرد الاحتكاك بها.
- ملومات متفرقة

تنشأ الميلبة الحمضة عند تخمير الحليب باستعمال الجرثومة *lactobacillus acidophilus* وجراثيم أخرى.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفض الكولسترول.
- قد يقضي على مشاكل الجلد.
- قد يساعد في الحؤول دون التهاب المهبل بالفطريات عند النساء اللواتي تتناولن المضادات الحيوية أو اللواتي تعانين من السكري.
- قد يساعد في هضم الحليب ومشتقات الحليب لدى المعانين من نقص اللاكتاز.
- قد يحسن المناعة.
- قد يخفف أعراض القولون التشنجي.
- قد يخفف الإسهال الناجم عن الاستخدام الطويل الأمد للمضادات الحيوية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- المعاناة من مشاكل في الأمعاء، إلا تحت إشراف طبي.
- أردت استخدامه في منطقة المهبل للالتهابات الفطرية.

الحمل

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدم المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهم مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدم المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- إحتفظه في وعاء مغلق بإحكام.

الجرعة الآمنة

- في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة "الآمنة".
- يتوافر لقاح النحل في شكل حقن وكبسولات.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

معلومات أساسية

لقاح النحل هو البذرة الذكرية المجهرية في النباتات المزهرة. إنه باهظ الثمن ويوفر كمية غير ملائمة وغير أكيدة من المواد المغذية.

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل.

- الأحماض الأمينية.
- المعادن.
- بعض الفيتامينات.

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات معروفة.

معلومات متفرقة

يفضل استخدام لقاح النحل المستخرج من مصدر محلي إذ تتضاءل احتمال حدوث ردات فعل الحساسية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يقاوم الجراثيم
- قد يجدد الجلد.
- قد يحسن المناعة.
- قد يخفف من أعراض الحساسية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً، أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

تناول هذه العشب لأي مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد توجد علاجات أخرى أكثر سلامة وفعالية).

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

قد يلي الحقنة فرط حساسية مهدد للحياة. تشمل الأعراض على حكاك حاد وفوري، شحوب، انخفاض ضغط الدم، فقدان الوعي والغيبوبة. أطلب النجدة. لا تترك الضحية. نفذ خطوات الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الاصطناعي والتدليك الخارجي للقلب. إتصل فوراً بالإسعاف. لا تتوقف عن تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي قبل وصول الإسعاف.

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
قد يسبب الحساسية لدى الحساسين للقاح. تمتاز الحساسية الخفيفة بالحكاك والألم في موضع الحقنة وورم يحدث خلال 24 إلى 48 ساعة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

Phytochemicals (Vitamin P) Bioflavonoids.

المواد الكيميائية النباتية

التأثيرات المعروفة

إنه يعالج نقص المواد الكيميائية النباتية الذي يتجلى في شكل أوعية رقيقة ونزف غير اعتيادي. معلومات متفرقة:

- توجد كمية كافية من المواد الكيميائية النباتية في الأطعمة بحيث تصبح المكملات غير ضرورية بالنسبة إلى البشر.
- تحتوي المنتجات التجارية، مثل الأقراص أو الكبسولات، على الفيتامين C.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد الكوارسيتين Quercetin في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى المعانين من السكري.
- قد يعمل بمثابة مقاوم للتأكسد، ويحول دون تأكسد الفيتامين C والأدرفالين بالأنزيمات المحتوية على النحاس.
- قد يزيد من فاعلية الفيتامين C.
- قد يحول دون البواسير

معلومات أساسية

المواد الكيميائية النباتية هي الجزء أساسي النباتي البراق اللون للنبات وقشرة الفاكهة الحمضية، الفلفل الأخضر، المشمش، الكرز، العنب، الباهيا والطماطم والبروكلي. هناك 4000 مركب على الأقل في الفاكهة والخضار والشاي.

لمزيد من المعلومات حول أنواع معينة من المواد الكيميائية النباتية ومصادرها من الأطعمة ووقايتها من الأمراض، راجع الصفحة 463. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمّل:

- إيريوديكتيول
- هسبريتين
- هسبريدين
- نوبيلاتين
- كوارسيتين
- روتين
- سيننتين
- تانجرتين

أبلغني الطبيب في حال تناول المكملات.
الأطفال والأولاد
لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون
السنتين.

معلومات أخرى:

ما من مشاكل متوقعة إذا تجاوزت سن الطفولة وكنت
تحت سن 45 وإذا أنت في صحة سليمة وتتناول
المكملات لفترة قصيرة من الوقت.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة:

- في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة
"الآمنة".

- تباع المواد الكيميائية النباتية تحت اسم Rutin
وHesperiden وهي تدخل في تركيبة العديد من
مكملات المعادن والفيتامينات.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة
سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

- قد يحول دون الإجهاض.
- قد يمنع النزف في شبيكة العين لدى المصابين
بالسكري وارتفاع ضغط الدم.
- قد يحول دون هشاشة الأوعية الدموية.
- قد يحول دون النزف من الأنف.
- قد يحول دون النزف عقب الولادة.
- قد يحول دون الاضطرابات في الدورة العيضية.
- قد يمنع تجمع الجلطات والصفائح في الدم.
- قد يحول دون سهولة الرضوض.
- قد يحول أو يعالج إعتام عدسة العين.
- قد يخفف من أعراض القوياء الشفوية عند تناوله
مع الفيتامين C.
- قد يخفض مستويات الكوليسترول.
- قد يحول الكوراستين دون أعراض الربو أو يخففها.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

تعاني من مشكلة نزف إلى حين الانتهاء من التحاليل
الهادفة إلى تشخيص سبب المرض.
يستشر الطبيب في حال:

- أردت تناول المكمل وحذلك من دون إشراف طبي.
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات
الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

أبلغني الطبيب في حال تناول المكملات.
الإرضاع

كبريتات الفسفوف Chondroitin Sulfate

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات معروفة.
معلومات متفرقة
كبريتات الفسفوف موجود في العظام والأنسجة
الضامة والفسفوف.

معلومات أساسية

هذه المادة موجودة في غضروف معظم الثدييات.
المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل
جزيئات بروتين مركبة.

التأثيرات الإضافية المحتملة

الأطفال والأولاد
لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات إن كنت تجاوزت مرحلة الطفولة أو تحت عمر 45 عاماً، شرط تناوله لمدة قصيرة وأن تكون في صحة سليمة.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة.
- في الوقت الحاضر، لم تعدد بعد صاهبة الجرعة "الآمنة".
- يتوافر كبريتات الغضروف في شكل كبسولات.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

- قد يخفض مستويات الكولسترول.
- قد يطيل وقت النزف.
- قد يخفف من مستويات الحمض البولي المرتبطة بداء المقرس.
- قد يخفف من أعراض التهاب مفاصل العظام بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوليه في حال:
- المعاناة من مشاكل النزف.
- كنت حاملاً، أو تظنين أنك حامل، أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال تناول:
- مضادات التخثر
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.
- الإرضاع
- لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأنزيم المساعد Q (CoQ) Coenzyme Q

- الفول السوداني
- السلمون
- السردين
- السبانخ

التأثيرات المعروفة

- يضبط تدفق الأوكسجين ضمن الخلايا الفردية
- يزيد الدورة الدموية.

معلومات أساسية

- الأنزيم المساعد Q هو جزء من الحبيبات الخيطية للخلايا، وهو ضروري لإنتاج الطاقة
- المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل
- يتوافر الأنزيم المساعد Q10 (مادة مغذية) في:
- لحم البقر
- سمك الاسقمري

الستين.

معلومات أخرى:

ما من مشاكل متوقعة إن كنت غير حامل ولا تتناولين جرعات أكبر من تلك الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● إحفظه بعيداً عن الحرارة والضوء.

الجرعة الأمنة.

● 200-300 ملغ، مرتان إلى ثلاث مرات يومياً.

● المنتجات الغموية المتوافرة هي: أقراص قابلة للمضغ وأقراص هلامية مركزة على الزيت.

● يفضل استخدام الأشكال السائلة أو الزيتية المحتوية على كمية صغيرة من الفيتامين E.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

● يحسن جهاز المناعة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يحسن استقلال عضلة القلب.

● قد يعالج ألم الصدر الناجم عن ضيق الأوعية التاجية.

● قد يخفض ضغط الدم.

● قد يعالج القصور القلبي الاحتقاني.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

المعاناة من مرض القلب ولم تستشر الطبيب.

إستشر الطبيب في حال:

تناول عقاقير أو أعشاب طبية بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحوضة،

الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون

حمض لينولييك المقترن Conjugated Linoleic Acid

● يخفف الدهون في الجسم.

● يقمع نمو الأورام.

● يحسن جهاز المناعة.

معلومات متفرقة

● لا يتلف حمض لينولييك المقترن عند طهوه أو حفظه.

● إنه حمض دهني من نوع أوميغا-6.

● إن التوازن بين الأحماض الدهنية أوميغا-3

وأوميغا-6 مهم للصحة الإجمالية والوقاية من

الأمراض.

● إنه حمض دهني أساسي يجب إدراجه في كل الأغذية

للحؤول دون نقصه.

معلومات أساسية

حمض لينولييك المقتن هو حمض دهني موجود في

زيت الذرة، زيت العصفور، زيت دوار الشمس، الجوز،

البذور، لحم البقر ومشتقات الحليب.

التأثيرات المعروفة

كشفت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وليس

البشر، عن التأثيرات الآتية:

يعتبر حليب الثدي غنياً بالأحماض الدهنية التي تلبي حاجات الطفل الرضيع. لا يفترض أن تكون المكملات ضرورية. استشري الطبيب قبل تناول المكمل.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منع أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

الجرعة الآمنة

يباع حمض لينوليك المقترن على أنه مكمل غذائي، لكن جمعية الصحة الأميركية لم تصادق على فاعليته وسلامته. لذا، يجب استخدامه بحذر.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

• إنه يحول دون نقص الأحماض الدهنية الأساسية الناجم عن فقدان حمض اللينوليك.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من خطر تصلب الشرايين.
- قد يخفض مستويات الكوليسترول.
- قد يخفف أعراض داء الصدف.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت بصحة سليمة وتأكل غذاءً متوازناً.

استشر الطبيب في حال:

الخضوع لعلاج مضاد للتخثر.

الحمل:

حددي مع طبيبك إن كانت فوائد حمض اللينوليك المقترن تبرر الخطر المفروض على الجنين. لا تزال مخاطره غير معروفة.

الإرضاع

الكرياتين Creatine

• لم يخضع الكرياتين لأبحاث كافية بالنسبة إلى استعماله لدى البشر.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحسن القوة والطاقة.
- قد يحسن الأداء في النشاطات التي تتطلب جهداً قصير الأمد مثل رفع الأثقال والسباحة.
- قد يخفف من التعب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

لديك حساسية تجاه الكرياتين

استشر الطبيب في حال:

• المعاناة من مرض مزمن

معلومات أساسية

ينتج الكرياتين في الكبد وهو موجود أيضاً في اللحوم. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل: البروتينات

التأثيرات المعروفة

يشجع على زيادة الوزن.

معلومات متفرقة

• قد يستفيد الأبطال الرياضيون من المقادير الإضافية من الكرياتين.

• يساعد الكرياتين على إطلاق الطاقة في العضلات من خلال زيادة إنتاج ثالث فوسفات الأدينوسين.

العلبة أو إستشر الطبيب أو الصيدلي. فالماركات المختلفة توفر جرعات مختلفة.

● في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة "الآمنة".

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
مشاكل في المعدة والأمعاء.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ارتفاع ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تشنج العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- لديك حساسية تجاه أي دواء أو طعام أو مادة أخرى.
- تفكر في تناول الكرياتين.

الحمل:

المخاطر غير معروفة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر غير معروفة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

● لا تتناوله مع أي دواء موصوف أو غير موصوف من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

● لا يعرف الكثير عن تأثيرات استخدامه على المدى الطويل.

الجرعة الآمنة:

- يتم بيع منتج الكرياتين في الأسواق بمثابة مكمل غذائي. وأعلنت جمعية الصحة الأميركية مؤخراً أن مكملات الكرياتين غير آمنة لأنها سببت موت ثلاثة أبطال رياضيين. لا يعرف ما إذا كان الكرياتين نفسه أو قذارة في المنتج أدت إلى الوفيات. لا تزال الجرعات المثلى غير معروفة. لذا، استخدمه بحذر.
- الكرياتين متوافر في شكل أقراص قابلة للمضغ وكبسولات ومسحوق إتبع التعليمات المذكورة على

Dehydroepiandrosterone (DHEA)

إستشر الطبيب في حال.

- المعاناة من مرض مزمن.
- وجود السرطان في تاريخ العائلة.
- لديك حساسية لأي دواء أو طعام أو مادة أخرى.

الحمل:

حددي مع طبيبك ما إذا كانت فوائد DHEA تبرز الخطر الذي يتعرض له الجنين. لا تزال المخاطر غير معروفة.

الإرضاع

لا يعرف ما إذا كان DHEA ينتقل عبر الحليب. تجنبه أو توقف عن الإرضاع إلى حين الانتهاء من الدواء. إطلبي نصيحة الطبيب بهذا الشأن.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

- قد لا تؤثر كمكملات الهرمونات في الجسم مثلما تفعل الهرمونات الطبيعية لأن الجسم ينتجها على نحو مختلف. لذلك، قد تؤدي الجرعات الكبيرة من المكملات إلى ارتفاع مقدار الهرمونات في الدم أكثر من المستوى السليم.

- لم يخضع DHEA لكمية وافية من الدراسات بالنسبة إلى استخدامه لدى البشر. فقد أجريت معظم الأبحاث على الحيوانات، ولا تزال تجري بعض الدراسات لتحديد الأجيّة عن تأثيره في العضلات والشيخوخة وجهاز المناعة. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الرجال والنساء حدوث تحسن في المشاعر. فقد شهد مرضى السيدا والتصلب المتعدد تحسناً في مشاعرهم عند تناول DHEA ولكن من دون حدوث تغيير في النتيجة النهائية.

- يخشى العلماء من أن تسبب مكملات DHEA مستويات مرتفعة من الاستروجين أو التستوستيرون لدى بعض الأشخاص. فهرمون التستوستيرون الطبيعي الموجود في الجسم يؤدي دوراً في سرطان

معلومات أساسية

DHEA هو سترويد منتج في الجسم البشري داخل الغدة الكظرية (الموجودة فوق الكلية).

التأثيرات المعروفة

يحسن الشعور الإجمالي بالرفاهية لدى بعض الأفراد. معلومات متفرقة

- قد يصل تركيز DHEA إلى ذروته في عمر العشرين تقريباً، ثم يبدأ بالتضاؤل تدريجياً مع التقدم في العمر.
- رغم أنه لا يعرف ما إذا كان DHEA نفسه يسبب تأثيرات هرمونية، يتولى الجسم تفكيك DHEA إلى هرمونين، هما: الاستروجين والتستوسترون. تفرز أجسام بعض الأشخاص كميات كبيرة من الاستروجين والتستوسترون من DHEA، فيما يفرز أشخاص آخرون مقادير أقل.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحسن الطاقة.
- قد يزيد القوة.
- قد يحسن المناعة.
- قد يزيد العضلات.
- قد يخفف الدهون.
- قد يحسن الشعور بالرفاهية لدى المصابين بالسيدا أو التصلب المتعدد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

لديك حساسية تجاه DHEA

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
لدى النساء: حب الشباب، تساقط الشعر، نمو شعر في الوجه وخشونة الصوت.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

البيروستات، ويعتقد أن المستويات المرتفعة من الاستروجين الطبيعي مسؤولة عن زيادة خطر سرطان الثدي عند المرأة. لا يزال تأثير DHEA مجهولاً.

• لا تتناول أي دواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة الآمنة

• يتوافر DHEA في شكل أقراص أو كبسولات. إتبع التعليمات المذكورة على العلبة أو استشر الطبيب أو الصيدلي. فالماركات المختلفة توصي بجرعات مختلفة يتم بيع منتج DHEA في الأسواق على أنه مكمل غذائي لكن سلامته وفاعليته لم تخضعان لتحليل جمعية الصحة الأمريكية. لا تزال الجرعات المثالية غير معروفة. لذا، يجب استخدامه بحذر.

• يوصى بالشرع في تناول جرعة خفيفة إذا تخطى الشخص عمر 55 عاماً إلى حين معرفة استجابة الجسم له.

الكبد المجفف Dried Liver

لا تستخدمه، لأنه قد يحتوي على الكثير من القذارات، ولا سيما التهاب الكبد. ما من دليل على وجود أي نشاط بيولوجي لأجزاء عضوية بعد الهضم. إن كنت تعاني من مشاكل في الكبد، لن يؤدي تناول المكملات إلى حل المشكلة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يقاوم الإجهاد.
- قد يشفي مشاكل اللثة.
- قد يعالج فقر الدم.
- قد ينشئ كريات حمراء في الدم.
- قد يزيد الطاقة.

معلومات أساسية

الكبد المجفف هو شكل مركّز من الكبد الحيواني المجفف.

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

الكليسيوم

الكوليسترول

النحاس

الحديد

الفوسفور

الفيتامينات A و B و C و D

التأثيرات المعروفة

إنه مصدر للفيتامينات A و B المركب C و D والحديد والكليسيوم والفوسفور والنحاس.

معلومات متفرقة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوليه في حال كنت حاملاً، أو تظنين أنك حامل، أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة.

● في الوقت الحاضر، لم تعدد بعد ماهية الجرعة الآمنة.

● يتوافر الكبد المجفف في شكل أقراص أو مسحوق.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

إستشر الطبيب في حال

تناول عقاقير أو أعشاب طبية بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضّع في حال تناولت أمهاتهن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون الستين.

حفظ المنتج

اللبس الخشن Dietary Fiber

ونخالته

البذور الفراولة

الحبوب الكاملة والخبز الكامل

معلومات أساسية

تتألف جذران خلايا النباتات من ليف يمنحها التركيبة النباتية وثباتها. لا يتفكك هذا الليف عند امتزاجه مع الأنزيمات في الجهاز الهضمي، ولذلك يمرّ الليف من دون امتصاصه.

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل: المواد المركبة وغير المركبة في كبروهيدرات النبات (نشويات)

مصادر الطعام الذوابة مصادر الطعام غير الذوابة

التفاح الأرز الأسمر

الشعير الخضار

الفاكهة الحمضية الجوز

الفول المجفف المطهو الخضار النيئة

الشوفان ودقيقه جذور الخضار

التأثيرات المعروفة

● يتمتع عدة أضعاف وزنه في المياه، مما يجعل البراز أكبر حجماً ويقلل من احتمال الإصابة بالإمساك.

● يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالسكري.

● يساعد في التخفيف من الكولسترول والترايفليسريد في الدم.

● الليف القابل للذوبان الموجود في الشوفان مفيد جداً لخفض مستوى الكولسترول.

- إن تناول مقادير كبيرة من الألياف قد يخفف من امتصاص المعادن، ولا سيما الكالسيوم والحديد والزنك.
- تناول مكملات الألياف على نحو منفصل عن مكملات الفيتامينات والمعادن.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظ في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة:

- يرى معظم الخبراء أن زيادة الليف أمر مفيد للصحة.
- إن المأخوذ الموصى به للتخفيف من خطر مرض القلب والسرطان وتحسين ضبط الجلوكوز في الدم هو 25-30 غراماً في اليوم.
- يتوافر الليف تجارياً في شكل كبسولات، أقراص، أقراص قابلة للمضغ وقطرات فموية.

درجة السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن أي معدّل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نفخة البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
انتفاخ البطن الزائد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
انسداد الأمعاء الغليظة (نادر، لكن هذا الاحتمال بالطبيب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
يزداد في حال وجود التهاب سابق). ومن أعراض الانسداد نذكر:	
ورم في البطن، ألم في البطن، حمى وانعدام الحركة في الأمعاء.	

معلومات متفرقة

- تعتبر الفاكهة الطازجة والخضار والجوز والبذور ومنتجات الحبوب الكاملة والبطاطا من أفضل مصادر الليف الخشن غير القابل للهضم.
- يمكن زيادته تدريجياً في الغذاء على مدى عدة أسابيع لتفادي الأمراض في المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من خطر الإصابة بمرض القلب.
- قد يخفف خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
- قد يخفف خطر التهاب الرئج.
- قد يخفف خطر الإصابة باليوسير.
- قد يخفف خطر السمنة.
- قد يخفف ليف القمح ونخالة الشوفان من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- المعاناة من مرض كرون.
- استشيري الطبيب في حال كنتِ حاملاً، أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- الحمل.

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمى المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمى المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

حمض لينوليك غاما (GLA) Gamma-Linolenic Acid

توقف: ملاحظات وتحذيرات

STOP

- لا تتناوله في حال:
 - كنت بصحة سليمة وتتناول غذاءً متوازناً.
 - تخضع لعلاج مقاوم للتخثر، لأن هذا قد يزيد من النزف.
 - تتناول أدوية أخرى مثل phenothiazines.
 - استشر الطبيب في حال:
 - المعاناة من أي مرض.
 - الحمل:
- يبدو أن حمض لينوليك غاما آمن، استشرى الطبيب قبل تناوله.
- الإرضاع
 - يبدو أن حمض لينوليك غاما آمن، استشرى الطبيب قبل تناوله.
- الأطفال والأولاد
 - لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى
 - إن حمض لينوليك غاما العامل مع الأخرجات يصبح جزءاً من بعض البروستغلاندينات التي تحدث أحياناً من الالتهاب في الجسم. إلا أن تناول زيت زهرة المساء قد يسبب نتائج مؤذية غير متوقعة.
 - يفترض بمرضى انفصام الشخصية أن يتفادوا تناول حمض لينوليك غاما.
 - توقف عن تناول حمض لينوليك غاما قبل أسبوعين من أي عملية جراحية.
 - إن تناوله مع الفيتامين E قد يحول دون تأكسد الزيت.
- حفظ المنتج:
 - يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

معلومات أساسية

- حمض لينوليك غاما موجود في مكمل اسمه زيت زهرة المساء.
- المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:
 - أحماض دهنية موجودة في:
 - نبتة زهرة المساء.
 - السمك.
 - حليب ثدي الأم.
 - الطحالب الزرقاء - الخضراء.

التأثيرات المعروفة

- مسكن للألم.
- مضاد للالتهاب.
- يخفف من مرض الكبد.
- له خصائص مضادة للتخثر، مما يجعله مفيداً في الحؤول دون النوبات القلبية الناجمة عن الجلطات.
- يساعد الذين يمانون من الأكرزما.
- يعمل بمثابة مصدر للأحماض الدهنية الأساسية.

معلومات متفرقة

- قد يؤدي النقص إلى الأكرزما.
- قد يتوجب على من يخفف من مأخوذ الزيت والدهون أن يتناول المكملات.
- تنمو زهرة المساء في البرية. إنها عبارة عن جذع طويل فيه أزهار صفراء تفتتح في الليل. يمكن الحصول على الزيت من خلال عصر البذور الصغيرة للزهرة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- يستخدم في المستحضرات الخارجية لمعالجة الأمراض الجلدية مثل داء الصدف.
- قد يخفف من الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجةسمية هذا المكمل.
لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صداع، عسر هضم، غثيان.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تعيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة
- يتوافر حمض لينوليك غاماً في شكل كبسولات: يجب ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف إلا إذا أصر الطبيب بغير ذلك.
- في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة الآمنة.

درجة السمية

إينوزيتول Inositol

السكري.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يحمي من الاعتلال العصبي المحيطي المرتبط بداء السكري
- قد يعمل بمثابة مهدئ للقلق.
- قد يساعد في ضبط مستوى الكوليسترول في الدم.
- قد يعالج الإمساك بفضل تنشيطه العمل العضلي لل القناة الغذائية.
- قد يحسن النوم.
- لا يزال تأثيره في معالجة اضطرابات مرض ألزهايمر قيد الدرس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت بصحة سليمة.
- استشر الطبيب في حال:
- المعاناة من داء السكري مع الاعتلال العصبي المحيطي: ألم، خدر، وخز، إحساس بالبرد والحرارة على نحو متناوب في اليدين والقدمين - الإشراف الطبي

معلومات أساسية

يطلق على الإينوزيتول أيضاً اسم موانوزيتول. إنه موجود في حليب الثدي وكبد العجل والشمام والفاكهة الحمضية (باستثناء الليمون) والفاصوليا المحففة والحمص والعدس والحليب والجوز والشوفان والأرز والقمح ومنتجات الحبوب الكاملة. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل السكر

التأثيرات المعروفة

- يؤدي دوراً مماثلاً للكولين في التخلص من الدهون خارج الكبد.
- يعمل في نقل الأعصاب.
- يشكل جزءاً مهماً من الشحم الفوسفوري، الذي هو مركب منتج في الجسم.
- معلومات متفرقة
- هذا المكمل مفيد للأشخاص الغاضعين لإشراف طبي لمعالجة مشاكل النوم أو القلق.
- يستفيد المواليد الجدد من الإينوزيتول عبر حليب

الجرعة الآمنة:

- في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماعية الجرعة "الآمنة"
- الإينوزيتول متوافر في شكل كبسولات: يجب ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير، لا تمضغها أو تسحقها، يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

درجة السمية

- لا يحتمل أن يحدث هذا المكمل خطراً على الحياة أو يسبب أعراض مهمة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

ضروري هنا.

- المعاناة من اضطراب في النوم أو القلق.

الحمل:

لا تتناوليه.

الإرضاع

لا تتناوليه.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

قد يزداد الإفراز مع علاج الليثيوم

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف ومبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- احفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

الجوجوبا Jojoba

طبية.

- تستخدم الجوجوبا في العطور.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يخفف من الألم الناجم عن التهاب المفاصل الرثياني.
- قد يخفف من الورم
- قد يشجع على الشفاء.
- قد يعالج البشرة الجافة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي: *Simmondsia chinensis*

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

أحماض أمينية.

التأثيرات المعروفة

يعمل بمثابة جزء أساسي ملطف في العديد من أنواع الشامبو، معجون الأسنان، مستحضرات ما بعد الحلاقة، مستحضرات البشرة ومزيل الماكياج

معلومات متفرقة

- الجوجوبا فريد بين النباتات لأن بذوره تحتوي على زيت شمع سائل.

- تنمو النبتة في منطقة أريزونا الأميركية وتستخدمها الهند في أريزونا الجنوبية بمثابة عشبة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال ما من مشاكل متوقعة إن كنت راشداً وغير حامل أو مرضعة، ولا تتناول مقادير أكبر من تلك الموصى بها من قبل الصانع.

السنتين.

معلومات أخرى.

لم يثبت وجود أية فوائد عند تناوله عبر الفم.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

الجرعة الآمنة:

في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة
"الآمنة"

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة
سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

استشر الطبيب في حال.

• كنت حاملاً، أو تتظنين أنك حامل أو تتويين الحمل في
المستقبل القريب.

واستشره في حال:

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات
الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى

الحمل

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي
تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن
هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدم المكمل إلا
إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال
تناولت أمهاتهم مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا
المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا
تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون

ل-كارنيتين L-Carnitine

التي هي الأفران الاستقلابية للخلايا (خصوصاً خلايا
القلب والكليتين)، حيث تتأكسد لتوليد الطاقة.

• يتم تركيبه في الكليتين والكبد من الحمضين
الأمينيين الأساسيين، ليسين وميثيونين، إضافة إلى
الفيتامين B-6 والفيتامين C والحديد.

معلومات متفرقة

• بما أن الكارنيتين يحتاج إلى أحماض أمينية
أساسية ليتم تصنيعه في الجسم، قد يحتاج كل من
يعاني من نقص في البروتين أو الأحماض الأمينية
إلى تناول المكملات.

• يتوجب على الذي تعرض مؤخراً لحروق أو إصابات
بالفة، أو يعاني من نقص في عمل الغدة الدرقية، أو
يكتفي بتناول النباتات فقط أن يتناول المكملات
أيضاً. إتصل بالطبيب.

معلومات أساسية

يتم إنتاج ل-كارنيتين في الجسم من الحمضين
الأمينيين "ليسين" و"ميثيونين". وهو موجود طبيعياً
في الأفوكادو، حليب الثدي، مشتقات الحليب، اللحم
الأحمر (خصوصاً لحم الغنم والبقرة) وفول الصويا.

التأثيرات المعروفة

• يشجع على النمو الطبيعي.
• ضروري للمواليد الجدد، خصوصاً المولودين قبل
أوانهم.
• ينقل الأحماض الأمينية إلى الحبيبات الخيطية،

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج بعض أشكال المرض القلبي الوعائي.
- قد يحمي من مرض العضلات.
- قد يساعد في تقوية العضلات.
- قد يحمي من مرض الكبد.
- قد يحمي من السكري.
- قد يحمي من مرض الكلية.
- قد يساعد في الحماية الغذائية.
- قد يجعل الحماية الغذائية ذات الوحدات الحرارية المنخفضة أسهل تحملاً إذ يخفف من مشاعر الجوع والضعف.
- قد يزيد الطاقة والنشاط لدى المعاني من القصور القلبي الاحتقاني.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال
- لديك حساسية لأي بروتين طعامي، مثل البيض أو الحليب أو القمح.
- كنت معرضاً لسوء التغذية لأي سبب كان.
- لا تتناوليه إن كنت حاملاً، أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال
- المعاناة من مشاكل في الكبد أو الكليتين.
- الحمل.

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

- قد يؤدي النقص إلى وهن في العضلات أو تشنجات

أو انخفاض في مستويات السكر في الدم.
• قد يخفف AZT من مستويات الكارنيتين.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة

• في الوقت الحاضر، لم تحدد بعد ماهية الجرعة الآمنة.

- متوافر في شكل أقراص: يتم ابتلاعها كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تمضغها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة أو ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك. تجنب كل أقراص dl-carnitine لأنها قد تكون سامة.
- متوافر في شكل أستيل ل-كارنيتين.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض القسم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ضعف في العضلات.	توقف عن تناوله. استشر الطبيب.
أعراض الوهن	لا تتناول المكملات من دون استشارة الطبيب.
العضلي (ضعف تدريجي في بعض مجموعات العضلات من دون وجود دليل على الضور) لدى المصابين بمرض الكلى ويخضعون منذ فترة طويلة للميز	
القشائي الدموي ويتناولون dl-carnitine	

- قد يعالج ضرر الكبد الناجم عن الإدمان على الكحول.
- قد يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت بصحة سليمة وتتناول غذاءً متوازناً.
- إستشر الطبيب في حال:
- تدوي معالجة مرض ألزهايمر بالليستين/الكولين.
- الحمل:

المكملات غير ضرورية.

الإرضاع

المكملات غير ضرورية.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

• قد يؤدي فائض الليستين إلى زيادة مستويات الفوسفور إلا إذا احتوى الغذاء على مقدار ملائم من الكليسيوم

• قد يعرض إلى نتائج غير دقيقة في تحليل الليستين المخبري عند اختبار سائل السلي.

• إن حمض النيكوتينيك يخفف من فاعلية الليستين. حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في حرارة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تثيران من عمل المكمل.

الجرعة الآمنة:

- لا تتناول أكثر من غرام واحد في اليوم.
- الليستين متوافر في شكل أقراص. يتم ابتلاعه

معلومات أساسية

يطلق أيضاً على الليستين اسم phosphatidylcholine. الليستين موجود في كل المنتجات النباتية والحيوانية، بما في ذلك الملفوف والقمح والكافيار والبيض والحمص والبقول الأخضر والعدس واللحم العضوي والبدور وليستين الصويا وفول الصويا. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

الكولين

الأحماض الدهنية

الفليسرين

الفوسفور

التأثيرات المعروفة

- يحمي من الأذى اللاحق بالخلايا نتيجة للتأكسد.
- إنه مصدر أساسي للمادة الكيميائية "كولين".

معلومات متفرقة

• لا بد من تواجد الليستين لتصنيع الكولين في الجسم البشري.

• إنه موجود في مواد كيميائية تساعد على مرور العديد من المواد المغذية من الدورة الدموية إلى الخلايا.

• إنه يستخدم بمثابة مكثف في العديد من الأطعمة، بما في ذلك المايونيز والمرغرين والبطولة.

• قد يتوجب على الذي يتناول النياسين أو حمض النيكوتينيك لمعالجة ارتفاع مستوى الكوليسترول وثلاثي الفليسرين في مصل الدم أن يتناول مكملات الليستين أو الكولين.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحمي من المرض القلبي الوعائي

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
رائحة كريهة من الجسم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

كاملة مع كوب من الماء أو العصير. لا تضيفها أو تسحقها. يجب تناولها مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

• اللستين متوافر أيضاً في شكل سائل: يجب تخفيفه في نصف كوب من الماء أو العصير، وشربه مع الأكل أو بعد ساعة ونصف من انتهاء الوجبة إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك.

درجة السمية

لم تحدث المراجعات الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

Melatonin الميلاتونين

- قد يحارب المرض.
- قد يحسن الحياة الجنسية.
- قد يخفف من الفتور والتكؤ.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- لديك حساسية تجاه الميلاتونين.
- إستنشر الطبيب في حال:
- المعاناة من مشكلة صحية مزمنة.
- لديك حساسية تجاه أي دواء أو طعام أو مادة أخرى.
- الحساسية من ارتفاع ضغط الدم أو مرض قلبي وعائي (تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الميلاتونين يقلص الأوعية الدموية، مما قد يسبب الخطر على الأشخاص المعانين من هذا المرض)
- الحمل:

ناقش مع الطبيب إن كانت فوائد الميلاتونين تبرر الخطر الذي قد يتعرض له الجنين. لا يزال الخطر غير معروف لأن الميلاتونين لم يخضع لمقدار كافٍ من الأبحاث في هذا المجال

معلومات أساسية

الميلاتونين هو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الجسم وتفرزه خلال الليل فقط وتكون مستويات الميلاتونين مرتفعة لدى معظم الأشخاص خلال ساعات النوم العادية. إنها تزداد بسرعة خلال آخر المساء، وتصل إلى الذروة بعد منتصف الليل، ثم تنخفض في أوائل الصباح.

التأثيرات المعروفة

- تعب
- يساعد في التخفيف من اضطرابات النوم.
- يساعد في شفاء الأرق وتناذر التمثل.

معلومات متفرقة

لم يخضع الميلاتونين لأبحاث كافية بالنسبة إلى استخدامه في الجسم البشري.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يبطئ الشيخوخة

الهرمونات الطبيعية نفسها لأن الجسم يعالجها بطريقة مختلفة. قد تؤدي الجرعات الكبيرة من المكملات إلى ارتفاع مستويات الهرمونات في الدم أكثر من اللازم.

• الميلاتونين متوافر في شكل أقراص أو كبسولات: إتبع التعليمات المذكورة على الصبوة أو استشر الطبيب أو الصيدلي. فالماركات المختلفة توصي بجرعات مختلفة.

• لم تحدد في الوقت الحاضر ماضية الجرعة "الأمنة".
• يوصى الأشخاص الذين تجاوزوا 55 عاماً أن يبدأوا بتناول مقادير صغيرة إلى حين تحديد استجابة الجسم للمكملات.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار، ارتباك أو صداع	خفف الجرعة أو توقف عن
في صباح اليوم التالي.	تناوله. إتصل بالطبيب عند
	الإمكان.

الإرضاع

ليس معروفاً إن كان الميلاتونين ينتقل إلى الطبيب. استشريري الطبيب قبل تناوله.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

- لا تتناول أي دواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.
- لا يجدر بالسائق أو قبطان الطائرة أو الذي يعمل في منطقة خطيرة أن يستمر في العمل أثناء استخدام الميلاتونين إلى حين التأكد من كيفية تأثيره فيه.
- يتعطل تأثير الميلاتونين بفعل الكحول والتدخين.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الأمنة:

- يتم بيع الميلاتونين في الأسواق التجارية بمثابة مكمل غذائي، من دون أن تصادق جمعية الصحة الأميركية على مدى فاعليته وسلامته. لا تزال الجرعات المثالية غير معروفة. استخدمه بحذر.
- قد لا تفضي مكملات الهرمونات إلى تأثيرات

أحماض أوميغا-3 الدهنية، زيت السمك Omega-3 Fatty Acids

حمض DHA

حمض EPA

معلومات أساسية

أحماض أوميغا-3 الدهنية هي مكمل غذائي متوافر في شكل كبسولات أو زيت. تأتي هذه الأحماض من السمك الذي يعيش في المياه الباردة، ولا سيما القد، التونة، السلمون، الهلبوت، القرش والاسقمري. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

التأثيرات المعروفة

- إن شعب الأسكيمو الذي يتناول أطعمة غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية يكشف عن مستويات منخفضة جداً من ثلاثي الغليسريد والكوليسترول في

وعقاقير أخرى.

الحمل

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمى المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهم مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمى المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

- يصبح هذا الدهن فاسداً بسرعة وسهولة.
- لا يعرف أحد المقدار الصحي وغير الصحي.
- تؤدي أحماض أوميغا-3 الدهنية إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم، وجعل البراز زلقاً، وانتفاخ في البطن.
- تخفف من قدرة الدم على التخثر وقد تسبب نزفاً مفرطاً عند التعرض لحادث.
- ينصح الناس عادة بالتوقف عن تناول هذه الأحماض قبل 3 أو 4 أسابيع من إجراء عملية جراحية.
- تخفض الحرارة على الأحماض الدهنية الأساسية، ولذلك لا يجدر بك طهوها أو معالجتها.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تعيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة:
- لم تحدّد في الوقت الحاضر ماهية الجرعة الآمنة.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدّل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

مصل الدم، كما يكشف عن مستويات مرتفعة من كوليسترول HDL المعروف بأنه يحمي من ترسب اللويحات التي قد تسد الأوعية الدموية الأساسية وتسبب نوبة قلبية أو سكتة أو مشاكل صحية خطيرة أخرى. إن اليابانيين الساحليين يكشفون عن حماية غذائية متشابهة واكتشافات متشابهة. وقد تؤدي زيادة مكملات أوميغا-3 الدهنية إلى مستويات مرتفعة من الكوليسترول في الدم

• إن أحماض أوميغا-3 الدهنية تحمي من مرض الشرايين القاحية.

• كما تحمي أيضاً من تصلب الشرايين

معلومات متفرقة

يفضل زيادة مأخوذك من السمك "الزيتي" على تناول مكملات أحماض أوميغا-3 الدهنية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد تحمي من الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل.
- قد تحمي من السكتة.
- قد تحسن استجابة جهاز المناعة.
- قد تعيق تكوّن الجلطات في الدم.
- قد تزيد الميل إلى فقر الدم لدى النساء في دورات الطمث.
- قد تخفف من إعادة انسداد الشرايين بعد تقويمها جراحياً.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- تعاني من داء السكري، لأن المكملات غنية بالدهون.
- تعاني من مشكلة تخثر الدم (لأن أحماض أوميغا-3 قد تعيق التخثر).

استشر الطبيب في حال.

تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
قد تفضي الكميات الكبيرة إلى النزف، أو تضاعف المناعة، أو زيادة الاستعداد لبعض الأورام الخبيثة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

حمض الباربيتاميك الأميني السلفيني (PABA) Para-Aminobenzoic

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعيد النضارة إلى البشرة.
- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج الإمساك.
- قد يعالج المشاكل في المعدة والأمعاء.
- قد يعالج العصبية والاهتياج.

معلومات أساسية

تتولى جراثيم الأمعاء إنتاج هذا الحمض، ويمكن العثور عليه في الأطعمة التالية: نخالة، أرز أسمر، كلى الحيوانات، كبد الحيوان، دبس السكر، بذور دوار الشمس، منتجات الحبوب الكاملة واللبن. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل: أنزيمات للمساعدة في تفكيك البروتين وتحليله.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال تناول السلفوناميد أو المضادات الحيوية داخلياً لأن هذا الحمض قد يمنعها من فرض كامل تأثيرها.
- استشرى الطبيب في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- لا تتناوليه داخلياً لأن المخاطر تفوق الفوائد.
- ما من مشاكل متوقعة في حال استخدام هذا الحمض موضعياً.

التأثيرات المعروفة

- يحمي من ضرر أشعة الشمس ما فوق البنفسجية عند استخدامه بمثابة قناع شمسي موضعي.
- يعالج مرض الوُضَح الجلدي الذي يكشف عن بقع بضاء في بعض أنحاء الجلد.
- يزيد من فاعلية حمض الفوليك ومركبات الفيتامين B والفيتامين C.

معلومات متفرقة

يحفز هذا الحمض الجراثيم المعوية المفيدة، ويتيح لها إنتاج حمض الفوليك الذي يساعد في إنتاج الحمض البانتوثيني.

الإرضاع

- لا تتناوليه داخلياً لأن المخاطر تفوق الفوائد.
- ما من مشاكل متوقعة في حال استخدام هذا الحمض موضعياً.
- الأطفال والأولاد
- لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:

- يخفف من فاعلية المضادات الحيوية.
- يخفف من فاعلية السلفوناميد (عقاقير سلفا).
- حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة

- لم تحدّد في الوقت الحاضر ماهية الجرعة الآمنة.
- إنه جزء أساسي في العديد من المستحضرات المتعددة المعادن/الفيتامينات. لا تتناول المكملات الفموية من دون إشراف الطبيب.
- إنه جزء أساسي في العديد من قناعات الشمس الموضعية.

درجة السمية

يحتزن هذا الحمض في الأنسجة. وفي حال الاستمرار في تناول جرعات كبيرة، قد يحدث تسمماً في الكبد. ويعتبر الغثيان والتقيؤ من أبرز أعراض التسمم لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حرارة مرتفعة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
مرض في الكبد، يتجلى في عمل غير طبيعي للكبد ويرقان وتقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

برغنونول Pregnenolone

الأبحاث على الحيوانات. لا تزال الدراسات مستمرة للتعرف إلى أجوية أكثر دقة بشأن تأثير البرغنونول في الذاكرة والشيخوخة.

- إنه علامة سابقة لـ DHEA.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحسن الذاكرة.
- قد يبطئ الشيخوخة.
- قد يساعد في معالجة إصابات الحبل الشوكي عند استخدامه مع أدوية مضادة للالتهاب.
- قد يخفف من الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل.

معلومات أساسية

يستخدم الجسم البرغنونول لإنتاج الستيرويد. وهو يزيد مستويات الستيرويدات والتستوستيرون في الجسم. التأثيرات المعروفة ما من تأثيرات مثبتة.

معلومات متفرقة

- لم يخضع البرغنونول لمقدار كافٍ من الأبحاث بالنسبة إلى استخدامه لدى البشر، إذ أجريت معظم

غذائي، لكن جمعية الصحة الأميركية لم تصادق بعد على فاعليته وسلامته. لا تزال الجرعات المثالية غير معروفة. يجب استخدامه بحذر.

● قد لا تؤثر مكملات الهرمونات في الجسم تماماً مثلما تفعل الهرمونات الطبيعية لأن الجسم يعالجها بطريقة مختلفة. وقد تفضي الجرعات الكبيرة من هذا المكمل إلى ارتفاع مستويات الهرمونات أكثر من اللزوم في الدم.

● يتوجب على الذي تخطى عمر 55 عاماً أن يبدأ بتناول جرعات صغيرة من هذا المكمل لتحديد استجابة الجسم له.

● الهرغنونول متوافر في شكل كبسولات: إتبع التعليمات المذكورة على العلبة أو استشر الطبيب أو الصيدلي. فالماركات المختلفة توصي بجرعات مختلفة.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الحرة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
أعراض غير متواترة:	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
لدى النساء: نمو شعر في الوجه، ولدى الرجال: تضخم الصدر.	

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- لديك حساسية تجاه البرغنونول.
- تعاني من سرطان مرتبط بالهرمونات أو يوجد تاريخ للسرطان في عائلتك.
- استشر الطبيب في حال:
- المعاناة من مرض مزمن.
- لديك حساسية تجاه أي دواء أو طعام أو مادة أخرى.

الحمل:

حذري مع طبيبك إذا كانت فوائد البرغنونول تبرر الخطر الذي قد يتعرض له الجنين. لا يزال الخطر غير معروف تماماً.

الإرضاع

ليس معروفاً إن كان البرغنونول ينتقل إلى الحليب.

استشيري الطبيب قبل تناوله

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

لا تتناوله مع أي دواء من دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة:
- يباع البرغنونول في الأسواق التجارية بمثابة مكمل

وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن مثانول الأولاد.

• إحتفظه في وعاء كتنم داخل البراد.

الجرعة الآمنة

لم تحدد مامية الجرعة "الآمنة" لغاية الآن.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
فرط حساسية مهدد	أطلب النجدة. لا تترك
للحياة بعد إجراء	الضحية لوحده. إبدأ خطوات
الحقنة. تشمل	الإنعاش القلبي الرئوي
الأعراض على حكاك	والتنفس الاصطناعي
حاد وفوري، شحوب،	والتدليك الخارجي للقلب.
انخفاض ضغط الدم،	أطلب الإسعاف ولا تتوقف
فقدان الوعي وغيبوبة.	عن الإنعاش القلبي الرئوي
	قبل وصول الإسعاف.

معلومات أساسية

الهلام الملكي هو مادة هلامية بيضاء لبنية تفرزها الغدد اللعابية عند النحل العامل لتحفيز نمو النحلة الملكة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

الحمض البانتوثيني (جزء من فيتامينات المركب B).

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات مثبتة

معلومات متفرقة

يجب إدخال هذه المادة إلى الجسم بواسطة الحقنة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يبطئ الحياة.
- قد يعالج مشاكل العظام والمفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتيزي.
- قد يحمي من سرطان الدم.
- قد يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم
- قد يعالج داء الربو
- قد يعالج الأرق.
- قد يعالج مرض الكبد والكلىتين.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوليه في حال

كنت حاملاً، أو تظنن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب

إستنشر الطبيب في حال:

تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- خضعت مؤخراً لعملية جراحية.
- تعرضت لنوبة قلبية.
- لا تزال في مرحلة النمو.

استشر الطبيب في حال:

تناول أي دواء آخر.

الحمل:

حددي مع طبيبك إذا كانت الفوائد تبرر المخاطر التي قد يتعرض لها الجنين. لا تزال المخاطر غير معروفة.

الإرضاع

ليس معروفاً إن كان غضروف القرش ينتقل إلى الحليب. استشري الطبيب قبل تناوله.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دوز السنتين.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

الجرعة الآمنة

• يتم بيع غضروف القرش في الأسواق التجارية بمحاكاة مكمل غذائي، ولم تصادق جمعية الصيغ الأميركية على سلامته وفاعليته. لا تزال الجرعات

المتألية غير معروفة. لذا، يجب استخدامه بحذر.

• يتوافر غضروف القرش في شكل مسحوق أم كبسولات. من المهم الحصول على مكمل مؤلف 100

في المئة من غضروف القرش للحصول على الفائدة القصوى. يجب أن يكون أبيض اللون.

معلومات أساسية

يستخرج غضروف القرش من الغضروف المسحوق سمك القرش

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل: الأحماض الأمينية

الكسيوم

عديد السكريد المخاطي.

الفوسفور

البروتين

بعض الأحماض الأمينية

التأثيرات المعروفة

إن عديد السكريد المخاطي الموجود في هذا الغضروف يحول دون نمو أوعية دموية جديدة

معلومات متفرقة

يتساءل بعض الأطباء عن فاعلية تناول المكملات الفموية لغضروف القرش. فهم يرون أن الجزء الأساسي للنشاط للمكمل قد يتلف أثناء الهضم، ولا يدخل بالتالي إلى الدورة الدموية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحسن جهاز المناعة.

• قد يخفف تورم المفاصل والتصلب بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

• قد يكون فعالاً في معالجة بعض مشاكل العين التي تحصل نتيجة نمو غير ملائم لأوعية دموية جديدة، إضافة إلى التهاب المفاصل وداء الصدف والتهاب الأمعاء.

• قد يحمي من السرطان.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض
ما يجب فعله
ما من شيء متوقع.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

الطحالب الأزرق - الأخضر Spirulina

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوليه في حال:
كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تتوين الحمل في المستقبل القريب.
إستشر الطبيب في حال:
تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
الحمل:

لا تستخدميه إلا إذا وصفه الطبيب لك.
الإرضاع

لا تستخدميه إلا إذا وصفه الطبيب لك.
الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من مشاكل متوقعة إن لم تكن المرأة حاملاً وتناولت مقادير أكبر من الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.
- الجرعة الآمنة

معلومات أساسية

الأسماء الأحيائية: *Spirulina maxima* و *platensis* *Spirulina*

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

مركبات الفيتامين B

بيتا كاروتين

حمض غاما لينولونيك

حديد

بروتين

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات معروفة.

معلومات متفرقة

- هذا الطحلب باهظ الثمن وطعمه كريه.
- إنه طحلب مجهري أزرق-أخضر اللون ينمو على سطح البحيرات القلوية في المناطق الاستوائية.
- يتم زراعته تجارياً في العديد من الأماكن، بما في ذلك المكسيك وتايلند واليابان وجنوب كاليفورنيا.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحسن الطاقة
- قد يحمي جهاز المناعة.
- قد يخفض الكوليسترول في الدم.
- قد يخفض الشهية.
- قد ينفع الذي يعاني من نقص السكر في الدم.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

- لم تحدد ماحية الجرعة "الأمنة" في الوقت الحاضر.
- إنه متوافر في شكل مسحوق وأقراص. إتبع تعليمات الصانع المذكورة على العلبة أو استشر الطبيب.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

Superoxide Dismutase

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:
المعاناة من أية مشكلة طبية.
استشر الطبيب في حال:
تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين،
المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة،
الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات
وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه من دون إشراف طبي

الإرضاع

لا تستخدميه من دون إشراف طبي.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون
السنين.

معلومات أخرى:

• إن الأشكال الفموية المتوافرة عديمة الجدوى.

• قد تؤدي الحقن إلى حساسية مفرطة.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبأبرد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

إنه أنزيم مرتبط بالنحاس والزنك والمنغنيز.
المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:
أنزيم يشارك في استخدام خلايا الجسم للنحاس
والزنك والمنغنيز.

التأثيرات المعروفة

يبطل تأثير الجذور الحرة وفرط الأكسيد.

معلومات متفرقة

إنه يحمي من الجذور الحرة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من ضرر تأكسد الخلايا المرتبط بالسرطان وعلاجاته.
- قد يحتوي على خصائص مقاومة للتأكسد (في أشكال الحقن فقط).

درجة السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن أي معذل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حساسية مفرطة	أطلب النجدة. لا تترك
مهددة للحياة بعد	الضحية لوحده. إبدأ خطوات
إجراء الحقن. تشتمل	الإنعاش القلبي الرئوي
الأعراض على حكاك	والتنفّس الاصطناعي
حاد، شحوب، انخفاض	والتدليك الخارجي للقلب.
ضغط الدم، فقدان الوعي	أطلب الإسعاف ولا تتوقف
وغيبوبة.	عن الإنعاش القلبي الرئوي
	قبل وصول الإسعاف.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

الجرعة الآمنة:

- لم تحدد ماهية الجرعة "الآمنة" في الوقت الحاضر
- إن الشكل الفموي لهذا المكمل يتلف في الأمعاء قبل امتصاصه، ولذلك تبقى الأشكال القموية عديدة الجدوى إلا إذا كانت مغلفة للسماح بامتصاصها في الأمعاء الدقيقة.
- إنه متوافر في شكل حقن، لكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي.

بذرة القمح Wheat Germ

إنها مصدر ممتاز للمواد الكيميائية المذكورة أعلاه.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد تخفف من أعراض التغذية العضلية الناقصة.
- قد تحسن القوة الجسدية والقدرة على الاحتمال.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

ما من مشاكل متوقعة إن لم تكن المرأة حاملاً ولم تتناول جرعات أكبر من تلك الموصى بها من قبل الصانع.

استشر الطبيب في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

معلومات أساسية

بذرة القمح هي نواة حبة القمح الموجودة في طرف السنبل.

المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

الكالسيوم	معظم الفيتامينات B
النحاس	الفوسفور
المغنيزيوم	الفيتامين E
	(أحد أغنى المصادر الطبيعية)

المنقّيز

بروتين

التأثيرات المعروفة

وتناولت المكمل لفترة قصيرة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- تفسد بذرة القمح بسرعة، لذلك يجب حفظها في البراد.

الجرعة الآمنة

- لم تحدد ماهية الجرعة "الآمنة" في الوقت الحاضر.
- إنها متوافرة في الأطعمة وفي شكل رقائق يمكن مزجها مع الأطعمة الأخرى. وهي متوافرة أيضاً في شكل زيت يجب حفظه دوماً في البراد.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

المستقبل القريب.

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهم مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من مشاكل متوقعة إذا تجاوزت مرحلة الطفولة أو ما زلت تحت عمر 45 عاماً وتتمتع بصحة جيدة

عشب القمح Wheat Grass

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحمي من السرطان.
- قد يعمل بمثابة مقاوم للتأكسد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوليه في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال تناول هذه العشبة لأي مشكلة طبية لم تتحسن خلال

معلومات أساسية

هذه المنتجات مشتقة من جذور القمح وأوراقه. المواد الكيميائية الموجودة في هذا المكمل:

الفيتامينات B

الكلووفيل

بعض المواد الكيميائية النباتية

Superoxide dismutase

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات مثبتة.

أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

لم يثبت حدوث مشاكل لدى النساء الحوامل اللواتي تتناولن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الإرضاع

لم يثبت حدوث مشاكل لدى الأطفال الرضع في حال تناولت أمهاتهن مقداراً صغيراً أو عادياً من هذا المكمل، لكن هناك احتمال لحدوث المشاكل. لا تستخدمي المكمل إلا إذا وصفه الطبيب لك.

الأطفال والأولاد

لا يجدر منح أي مكمل للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من مشاكل متوقعة إن لم تكن المرأة حاصلاً وتناولت جرعات أكبر من تلك الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل المكمل.

الجرعة الآمنة

لم تحدد مامية الجرعة "الآمنة" في الوقت الحاضر.

درجة السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معزل رسمي لدرجة سمية هذا المكمل.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

الأعشاب الطبية

كيفية استعمالها.

❖ إذا قررت استخدام الأعشاب الطبية، أطلع الطبيب على الأنواع المراد استخدامها ومقادير الأدوية الأخرى التي تتناولها. سوف تلاحظ في الجداول التالية أن هذه الأعشاب تؤثر في مفعول الأدوية أو العلاجات الموصوفة من قبل الطبيب.

❖ كوني حذرة عند استعمال الأعشاب الطبية خلال الحمل أو الإرضاع وعليك مراجعة الطبيب قبل الشروع في تناولها.

❖ وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن معظم الأعشاب الطبية تُستخدم لمعالجة "كل" الشخص وليس لعداوة عارض معين كما هي حال الأدوية التقليدية. ولجعل هذا القسم أكثر سهولة، عمدنا إلى توزيعه إلى قسمين: الأعشاب الشائعة والأعشاب الأقل شيوعاً.

يحاول هذا القسم تزويدك بمقدار كافٍ من المعلومات لتفادي التسمم في حال قررت تناول الأعشاب الطبية من دون وصفة طبيب. إن كنت تستخدم الأدوية العشبية، يفترض أن تكون خبيراً بالأعشاب. وإن كنت تشترها، يحق لك أن تعرف كل شيء عن تأثيراتها الجانبية، وتفاعلاتها العكسية، وسميتها والمخاطر الأخرى الناجمة عن استخدام مواد غير خاضعة للإجراءات الصارمة.

يستخدم الطب الشرقي الأعشاب الطبية منذ آلاف السنين، لكن عدداً ضئيلاً من هذه الأعشاب خضع لدراسات علمية مسهبة. وأبرز التحذيرات في هذا المجال:

❖ لا تمنح الأطفال أو الأولاد الأعشاب الطبية من دون استشارة اختصاصي أو الحصول على موافقة الطبيب.

❖ لا تستخدم الأعشاب الطبية إطلاقاً إلا إذا كنت تجد

الأعشاب الشائعة



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): membranaceous Astragalus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية: الجذر
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Asparagine
- Astragalosides
- Calcyosin
- Formononetin
- Kumatakenin
- الستيروول Sterols



التأثيرات المعروفة

- ينشط ويحمي جهاز المناعة
- يولد تفرعاً فورياً.
- معلومات متفرقة.

متوافر في شكل شاي، وخلاصة سائلة، وكبسولات وجذر مجفف.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من التعب والضعف.
- قد يعالج الزكام والانفلونزا
- قد يزيد القدرة على الاحتمال.
- قد يعالج مشاكل نقص جهاز المناعة (السيدا، السرطان).
- قد يخفف أعراض التعب المزمن.
- قد يحسن الشهية
- قد يخفف من الإسهال.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

● كنتي حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة حالياً من ارتفاع الحرارة.

● إستشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

استخدميه فقط بعد استشارة الطبيب.

الارضاع

استخدميه فقط بعد استشارة الطبيب

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الشلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.



السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

استخدميه فقط بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع:

استخدميه فقط بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية:

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): myrtillus

Vaccinium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

كامل النبتة، ولا سيما الثمرة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Anthocyanins

● Flavonoids

● Hydroquinone

● Loeanolic Acid

● Neomyrtillin

● الصوديوم

● حمض التانيك Tannins

● حمض أورسوليك Ursolic Acid

التأثيرات المعروفة

● يعمل بمثابة مدرّ للبول.

● يعالج التهابات المجرى البولي.

● مضاد للتأكسد.

● يخفف الإسهال الحاد (عنب الأراج المجفف فقط).

● قابض للأنسجة الحية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يقاوم الالتهاب.

● قد يعالج مشاكل النظر، بما في ذلك إعتام عدسة العين.

● قد يخفف من التهاب التجويف الفمي.

● قد يعالج البواسير

توقف: ملاحظات وتحذيرات

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:
كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

يستشر الطبيب في حال

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسّر خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادّ الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية المكملات وعقاقير أخرى.

• المعاناة من جرح أو حرق بالغ.

الحمل:

لا تستخدميه من دون وصفة طبية.

الرضاع

لا تستخدميه من دون وصفة طبية.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد دون السنّتين.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية



لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي مبدّل رسمي لدرج

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Calendula officinalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الزهرة

• الزهيرات الصغيرة

• البتلات

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Calenduline

• Chlorogenic Acid

• Flavonoids

• Triterpenes

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



• يسرّع شفاء الجروح من خلال تخفيف الالتهاب وتحفيز نمو الأنسجة الجديدة.

• يساعد في علاج داء الصدف وحب الشباب والأكزيما.

• له خصائص مقاومة للفطر لمعالجة الطفح الجلدي بما في ذلك طفح الحفاض وقدم الرياضي.

• مقاوم للالتهاب.

معلومات متفرقة:

متوافر في شكل مستحضرات سائلة، مراهم، زيوت، صبغات وأوراق/أزهار طازجة أو مجففة.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يفيد المفص وقرحة المعدة والتهاب المعدة.

• قد يخفف من ألم الدورة الشهرية.

• قد يعالج مشاكل المرارة.

• قد يعالج القروح الأكالة في الفم.

سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة



ما من شيء متوقع.

اللبق المسحل Cascara Sagrada (Cascara Buckthron)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المنخص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدّواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Rhamnus purshiana

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية: اللحاء

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Anthraquinone •

Cascarosides •

زيوت متطايرة •

التأثيرات المعروفة

• يستخدم بمثابة مسهل خفيف.

• منشط

معلومات متفرقة

• لا يوصى باستعماله لفترات طويلة.

• إنه منتج طبي مذكور في لائحة الأدوية المعترف بها في الولايات المتحدة.

• متوافر في شكل خلاصة أو خلاصة سائلة مجففة في كبسولة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يعالج الإمساك المتقطع.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المفتوح:

- يجب حفظه في مكان جاف وبأرد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر النبق المسهل خطراً قليلاً، خصوصاً للأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر

من اللازم لفترات طويلة من الوقت.

إنه مخصص للاستخدام القصير الأمد فقط، لأن استخدامه على المدى الطويل قد يسبب تناذر الأمعاء الكسولة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال حاد.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنجات في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

مخلب القطر Cat's Claw (Una de Gato)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Uncaria tomentosa

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الجذر

اللحاء

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• الفلوكوسيد

• Oxindole alkaloids

• Polyphenols

• Quinovic acid

• Triterpenes

التأثيرات المعروفة

- مقاوم للالتهاب.
- يحسن جهاز المناعة (مقاوم للفيروسات).
- معلومات متفرقة:
- متوافر عادة في كبسولات وشايات وخلاصات سائلة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف أعراض التهاب المعدة
- قد يساعد في معالجة الربو.
- قد يقاوم التأكسد
- قد يريح من الغثيان والتأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي.
- يخضع للاختبار مع AZT لمعالجة مرضى السيدا

دون السنتين.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معّل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

- | | |
|-------|---|
| إسهال | خفف الجرعة وراقب نفسك |
| | لمدة أسبوع أو أسبوعين. قد يستمر الإسهال مدة أسبوع |
| | أو أسبوعين ثم يختفي. إتصل بالطبيب عند الإمكان. |

- قد يساعد في شفاء قرحة المعدة.
- قد يحسن الدورة الدموية
- قد يخفف من التهاب الأمعاء.
- قد يشجع العمل الطبيعي للأمعاء
- قد يقاوم السرطان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- زرع نسيج أو عضو في الجسم لأن هذه العشبة تميل إلى تنشيط جهاز المناعة لرفض الخلايا الغريبة.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل
- لا تستخدمه.
- الإرضاع
- لا تستخدمه من دون وصفة الطبيب.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يحسن شفاء رضوض الفم الناجمة عن المعالجة الكيميائية، إضافة إلى القروح الأكلالة في الفم.
- قد يخفف من احتياج المعدة ويساعد في التخلص من الغازات وعسر الهضم
- يستخدم بمثابة كمادة أو في الفرك الخارجي للتخفيف من الألم
- قد يخفف من الألم الناجم عن التهاب المفاصل.
- قد يحسن تدفق الدم.
- قد يحسن شفاء القروح في المعى الاثني عشري.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.
- تعاني من مشكلة نزف.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

معلومات أساسية

يعرف هذا الفلفل أيضاً باسم الفلفل الحريف، أو فلفل أفريقيا، أو الفلفل الأمريكي، أو الفلفل الأحمر الحريف، أو الفلفل الإسباني
الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Capsicum frutescens, Capsicum annuum
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Apsaicine •

Capsaicin •

Capsanthine •

Capsaicin •

Capsico •

حمض الفوليك •

الفيتامينات A و B و C •

التأثيرات المعروفة

- يخفف من الاحتياج عند وضعه على الجلد الذي يغطي مفصلاً ملتهباً.
- منشط
- مقاوم للتأكسد.
- يخفف ألم الاعتلال العصبي السكري.
- يعالج الصداع الحنقودي.
- معلومات متفرقة
- متوافر في شكل مسحوق.
- متوافر في شكل كبسولات زيتية.
- متوافر في شكل طعام طازج.
- يستخدم بمقادير صغيرة بمثابة تابل.
- ما من تأثيرات متوقعة في الجسم عند استخدامه بكميات صغيرة لتحسين نكهة الطعام.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

قد يؤدي استنشاق الغلغل الأحمر إلى حساسية في الحويصلات الرئوية.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

● يعتبر الغلغل الأحمر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

● قد يؤدي المأخوذ المفرط من الغلغل الأحمر إلى التهاب في المعدة، أو تلف في الكبد أو الكليتين.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال، منتظم أو	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
ممزوج بالدم.	بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.
تقيؤ دم.	أطلب الإسعاف.

Chamomile البابونج

● Tiglic Acid

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

● يخفف من تشنج العضلات.

● يخفف من تشنجات الدورة الشهرية.

● مقاوم للالتهاب.

● مسكن خفيف.

● يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً

● يقتل الجراثيم في الحلد.

● يخفف من تشنجات المعدة والغازات وعسر الهضم.

● معلومات منفردة.

● تستخدم الأزهار لصناعة الخلاصة والشاي العشبي.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Anthemis nobilis, A.flores

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء مختلفة من كل النبتة، حسب التقاليد والثقافة
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● العرار Antheme

● حمض العرار Anthemic Acid

● Anthesterol

● Apigenin

● Chamazulene

● الراتينج

● حمض التانيك

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لذا، لا تستخدمه.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفرغان من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

حساسية لدى الأشخاص توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالحساسين لغبار طلع

بالطبيب.

عشبة الرجيد الأميركية

(نادرة).

حساسية مفرطة مهددة أصرخ طلباً للنجدة. لا تترك

للحياة قد تحدث بعد الضحية يابشر في حركات

الحقنة. وتشمل الأعراض الإنعاش القلبي الرئوي

حكاك حاد وشحوب والتنفس الاصطناعي

وانخفاض ضغط الدم والتدليك الخارجي للقلب.

وفقدان الوعي إتصل بالإسعاف وتابع

والفيبيوية حركات الإنعاش إلى حين

وصوله.

اهتياج الجلد توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

تقيؤ توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

● يتوافر البابونج في شكل شاي وصفغة وزيت وأزهار خضرة أو محففة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

الاستعمال الداخلي:

● قد يعالج الأرق.

● قد يعالج الإسهال.

● قد يعالج التهابات القصبات الهوائية.

● يستخدم للفرغرة لمعالجة تقرّح الحنجرة والتهاب اللثة.

● قد يلطف حروق الشمس والجروح والخدوش والعيون المتقرّحة.

الاستعمال الخارجي:

● يستخدم بمثابة كمادة.

● قد يعالج حراج الجلد.

● قد يعالج البواسير.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا نتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.

● تعاني من مشكلة نزف.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لذا، لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لذا، لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

• قد يعالج الأكزيما والحكاك في فروة الرأس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو ثنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

لا تتناوله إلا بوصفة من الطبيب.

الرضاع

لا تتناوله إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيبت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع ميدنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة:

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Stellaria media*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

أجزاء مختلفة من كل النبتة، حسب التقاليد والثقافة.
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• حمض الأسكوربيك (الفيتامين C)

• أملاح البوتاس

• Rutin

التأثيرات المعروفة

الاستعمال الداخلي

• يحمي الأنسجة المكشوفة.

• يستخدم بمثابة مكمل للفيتامين C.

• يخفف من الإمساك.

الاستعمال الخارجي

• يستخدم بمثابة مرهم للطفح والقروح.

• يلطّف الجروح والخدوش.

معلومات متفرقة:

• بما أنه يحتوي على مقدار كبير من الفيتامين C،

يستطيع عشب الطير معالجة داء الأسقربوط.

• إنه متوافر في شكل لحاء مجفف، زيت، مرهم وصفة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

الاستعمال الداخلي:

• قد يعالج التعب.

• قد يعالج التهاب القصبات من خلال تخفيف سماكة المخاط في الرئتين.

• قد يزيد من إنتاج البول.

الاستعمال الخارجي

• قد يعالج لدغات الحشرات.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض ما يجب فعله
مثل مؤقت. أطلب الإسعاف فوراً.

السمية



يعتبر عشب الطير آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الطحالب البحرية Chicory

استشر الطبيب في حال

• تناول هذه العشبة لمدد طويلة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
الحمل:

لا تتناوليه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تتناوليه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة


يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية



لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Cichorium intybus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض الأسكوربيك (الفيتامين C)

• الإينولين

• الفيتامين A

التأثيرات المعروفة



• ملين

• مدر خفيف للبول.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• يعالج ربما عسر الهضم.

• يعالج ربما اليرقان.

• يعالج ربما الروماتيزم وداء النقرس.

• قد يعالج احتياج الجلد في شكل كمادة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال.

كنتر حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
خفقان سريع للقلب.	راجع الطبيب.
جلد أحمر أو منتفخ	توقف عن استعماله. إتصل
أو مهتاج.	بالطبيب عند الإمكان.
	إستخدم القفازات عند
	الإمساك به.

الكامفور (Cinnamon)

التأثيرات المعروفة

- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- يعمل بمثابة غسول للفم.
- يخفف من الإسهال.
- معلومات متفرقة.
- يستخدم لصناعة السليوليد والمتفجرات والمواد الكيميائية الأخرى.
- متوافر في شكل مسحوق وحبوب وصيغة

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يؤدي السفرول إلى السرطان.
- قد يخفف من عسر الهضم.
- قد يحول دون القرحة
- قد يحارب تسوس الأسنان.
- قد يخفف من الغثيان.
- قد يخفف من تشنجات الدورة الشهرية.
- قد يساعد في معالجة الربو.
- قد يساعد في معالجة فقدان الشهية.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Cinnamomum camphora

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الأوراق
- الجذور
- اللحاء
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- زيت الكافور
- Cineole
- Cinnamic aldehyde
- أحماض دهنية
- صمغ
- ليمونين Limonene
- مانيتول Mannitol
- حمض التانيك
- زيوت

تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيّران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر الكمون ساماً، خصوصاً للأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون كميات كبيرة لفترات طويلة. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
دوار	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب
هلوسة	أطلب الإسعاف.
قد تؤدي الجرعة الكبيرة إلى الغيبوبة أو تلف في الكليتين	أطلب الإسعاف.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المعص التنجني.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا

جذر الثعبان الأسود Cohosh, Black (Black Snakeroot, Rattle Root)

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذمور

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• الفلوكوسيد

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Cimicifuga racemosa

الحمل:

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى

يجب ألا يمتد استخدام هذه العشبة لأكثر من ستة أشهر.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يقال أنه خطر قليلاً، خصوصاً على الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون كميات كبيرة لفترات طويلة.

لأعراض التسهم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة**

العلامات والأعراض ما يجب فعله

التهاب المعدة والأمعاء توقف عن استعماله. إتصل

بتجلى في ألم وغثيان فوراً بالطبيب.

واسهال.

غثيان أو تقيؤ توقف عن استعماله. إتصل

فوراً بالطبيب.

• حمض Isoferulic

• إيوزفلاون Isoflavones

• حمض التانين

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يعالج نوبات التوجع وأعراض سن اليأس.

• يعالج تناذر ما قبل الطمث PMS

• يعالج عسر الطمث.

التأثيرات الإضافية**المحتملة**

• قد يعالج الإسهال.

• يمكن استخدامه بمثابة ترياق لسم الأفعى المجلجلة.

• قد يخفض ضغط الدم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المقص التنسجي.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

- قد يعالج داء الصدف والطفح الجلدي.
- قد يعالج التهاب الجلد.
- قد يساعد الجسم في التخلص من السوائل الفائضة من خلال زيادة إنتاج البول.

تنبيهات: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب لأنه عليك التخفيف من مأخوذ البوتاسيوم.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

لا تتناوله داخلياً.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Symphytum officinale

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الأوراق

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Allantoin

• Consolidine

• الهلام النباتي

• الفوسفور

• البوتاسيوم

• Pyrrolizidine

• النشاء

• Symphytocynglossine

• حمض التانيك

• الفيتامين A و C

التأثيرات المعروفة

- يخفف من الالتهاب الناجم عن إصابة.
- يحسن شفاء الجروح والخدوش ولدغات الحشرات.

معلومات متفرقة

• قد يسبب السمفوطن الأذى للكبد في حال تناوله داخلياً.

• قد يصبح ساماً عند وضعه على الجلد أيضاً

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- يستخدم في الكمادات لشفاء الجروح والتقرحات.
- قد يحمي الأنسجة المكشوفة.
- قد يعالج حروق الشمس.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
دوار	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
نعاس	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن استعماله. إتصل

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك



السمية

السفوطن خطوفي حال تناوله داخلياً.
لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناولوه في حال:

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشرية، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المخص التنجني.

● المعاناة من مرض في الكلية أو المجرى البولي.

استشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد من دون الستين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع بمبدئ بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Turnera diffusa
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● أربوتين

● الكلوروفيل

● دميانيان

● الراتنج

● النشاء

● السكر

● حمض التانيك

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



ما من مزايا طبية مثبتة.

معلومات متفرقة

● يمتاز بطعمه المرّ جداً.

● يستخدم بمثابة مادة مضافة في الأطعمة المخبوزة.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

● يستخدم بمثابة مثير للشهوة الجنسية.

● قد يخفف من الصداع.

● قد يخفف من الإحباط أو القلق أو الأرق.

● قد يحسن القدرة الجنسية.

● يستخدم بمثابة ملين خفيف.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تغير في تواتر البول.	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عن الإمكان.
إسهال	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
أرق	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يمكن اعتبار الدميانا آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

السلطة بما: البريئة Dandelion

• بروتينات

• راتنج

• Taraxacerin

• الفيتامينات A و B و C و E

التأثيرات المعروفة

ما من مزايا طبية مثبتة

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج عسر الهضم
- قد يعالج الإمساك.
- قد يعالج التهاب الكبد.
- قد يعالج اليرقان.
- قد يعالج الروماتيزم.
- قد يعالج فقر الدم.
- قد يساعد في در البول.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Taraxacum officinale

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

• الجذور

• البراعم

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• مرّيات

• دهون

• غلوتين

• صمغ

• إينولين

• حديد

• نياسين

• بوتاس

• قد يحسن الشهية.

بوصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفسدان من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يمكن اعتبار الهندباء البرية آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض

ما يجب فعله
حرقة في الفم وإسهال
توقف عن استعماله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.
(نادر)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً

حشيشة السعال الصينية Dong Quai (Chinese Angelica)

• كومارين Coumarins

• الفيتامين B 12

• زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Angelica sinensis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

• الجذر

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

التأثيرات المعروفة

• يعالج سوء انتظام الطمث

• يخفف من ألم تشنجات الطمث.

معلومات متفرقة:

متوافر في شكل شاي وأقراص.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف ضغط الدم.
- قد يرخي العضلات.
- قد يخفف من أعراض سن اليأس، بما في ذلك نوبات التوهج.
- قد يحسن الدورة الدموية.
- قد يرخي الأمعاء.
- قد يقاوم الالتهاب.
- قد يثبط تجميع لويحات الدم، ويحمي بالتالي من مرض القلب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا نتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- تناول أدوية لضغط الدم المرتفع.
- كنتِ معرضة لدفق غزير خلال دورة الطمث.
- تنوي الخضوع لعملية جراحية خلال أسبوعين أو أقل بسبب إمكانية ازدياد وقت النزف.
- استشر الطبيب في حال:
- استخدام هذه العشبة أساساً.
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

يجب توخي الحذر عند استعمال هذه العشبة مع أدوية أخرى مرفقة للدم.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- 4 إلى 7 غرامات (20 ملغ)، ثلاث مرات يومياً بين وجبات الطعام.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
اعتياج وأرق	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
 - كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من داء السل، أو التصلب المتعدد أو مرض الكولاجين.
- استشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
 - خضعت لعملية زرع عضو.

الحمل

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): E. pallida,

Echinacea angustifolia

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- أجزاء متنوعة من كامل النبتة، تختلف حسب البلد أو الثقافة

● المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Alkaloids ●

Echinacoside ●

Flavonoids ●

Isobutyl amides ●

الأستيلين المتعدد ●

السكريات المتعددة ●

زيوت متطايرة ●

التأثيرات المعروفة

مقاوم للالتهاب.

معلومات متفرقة

ثمة عشبة أخرى معروفة أيضاً باسم الزهرة المخروطية coneflower ويقال إنها سامة. لذا، عند تناول الزهرة المخروطية، تأكد أنها angustifolia Echinacea.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يقاوم التحسينات في الالتهابات الداخلية والخارجية.
- قد يخفف من أعراض الزكام والانفلونزا.
- قد يساعد في شفاء الجروح.
- قد يقيم الأورام.
- قد يزيد من عمل المناعة بعد علاج السرطان.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
التهاب الجلد (لدى المرض الحساسين).	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة

- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.
- أثبتت فاعلية هذه العشبة عند استعمالها على نحو متقطع فور ظهور أعراض المرض ولمدة ستة أسابيع أو أقل.

السمية



لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

زهرة السحار Evening Primrose

- قد يقاوم تخثر الدم.
- قابض ربما للأنسجة الحية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- تناول دواء لارتفاع ضغط الدم.
- معرضة لدفق غزير خلال دورة الطمث.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الارضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Oenothera biennis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الزيت المستخرج من الحبوب.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض غاما لينولنيك.

التأثيرات المعروفة



- مقاوم للالتهابات.
- يخفف ضغط الدم المرتفع.
- يعالج الأكزيما الاستشرائية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يرخي العضلات.
- قد يخفف من أعراض ثناذر ما قبل الطمث.
- قد يزيّن العيتين والشعر والأظافر.
- قد يعالج الأكزيما والتهابات الجلد الأخرى.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
انزعاج في البطن.	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
صداع	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
طفح جلدي.	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

بريق العين Eyebright

التأثيرات الإضافية المحتملة

- الاستعمال الداخلي
- قد يعالج احتقان الأنف.
- قد يعالج السعال.
- قد يعالج التهاب الحيوب الأنفية
- قد يعالج الحساسية.
- الاستعمال الخارجي
- يستخدم بمثابة غسول للعينين للتخفيف من الازعاج الناجم عن إجهاد العينين أو احتياج بسيط.
- قد يعالج التهاب باطن الجفن.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

• *Euphrasia officinalis*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• كامل النبتة باستثناء الجذور.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• مزيات

• حمض بانتوثيني

• حمض التانيك

• الفيتامينات A وB-12 وC وE وD

• زيوت متطايرة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:
كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

التأثيرات المعروفة

• يخفف الالتهاب.

المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولسد حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

غثيان	توقف عن استعماله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن استعماله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الأشجار Feverfew (Altamisa, Bachelor's Buttons)

- Parthenolide
- Pyrethrins
- Santamarin
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف سماكة المخاط ويزيد من سيولته في الرئتين والأنابيب القصبية
- يخفف من حدة وتواتر نوبات صداع الشقيقة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Tanacetum parthenium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- اللحاء
- الأزهار المجففة
- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

قد يؤدي مضغ الأوراق إلى تقرحات في الفم.
حفظ المفتوح.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشب.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.
- يجب توقيف العلاج من حين إلى آخر لتحسين فاعليته على المدى الطويل.

السمية

يعتبر الأقحوان آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
آلم في البطن.	أطلب المساعدة الطبية
تقرح داخلي في الفم.	أطلب المساعدة الطبية.
فرط حساسية مهدد للحياة بعد الحقن.	أصرخ طلباً للنجدة. لا تترك الضحية. باشر في حركات الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الاصطناعي والتدليك الخارجي للقلب.
حاد وفوري، شحوب، انخفاض ضغط الدم، فقدان الوعي، غيبوبة.	إتصل بالإسعاف وتابع حركات الإنعاش إلى حين وصوله.

• يقاوم التشنج.

التأثيرات الإضافية المحتملة

الأوراق

- قد يعالج اضطرابات دورة الطمث.
- قد يعالج الزكام العادي.
- قد يعالج عسر الهضم والإسهال.
- قد يحسن الشهية.

الأزهار المجففة

- قد يعالج طفيليات الأمعاء (الديدان).
- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- قد يخفف من التهاب المفاصل.
- قد يقاوم الالتهاب.
- قد يخفف حرارة الجسم المرتفعة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

- لديك حساسية تجاه حشيشة الحمى.
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشب لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

- قد يلطف أعراض سن اليأس.
- قد يخفض مستويات الكوليسترول والترايغليسريد.
- قد يخفف السعال.
- قد يلطف الزيت البشرة أو يجعلها أكثر طراوة.
- يستخدم في الكمادات الموضوعة على الصدر للتخفيف من الزكام والسعال.
- قد يعالج الحروق عند استخدامه خارجياً.
- قد يحمي الأنسجة المكشوفة.
- قد يخفف من الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل.
- قد يحسن جهاز المناعة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدة طويلة لمشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- المخاطر تفوق الفوائد، لا تستخدميه.
- الإرضاع:
- المخاطر تفوق الفوائد، لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد:
- يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Linum usitatissimum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الزيت
- الحبوب
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- زيت ثابت
- غلوكوسيد
- صمغ
- Linamarin
- حمض لينوليك
- حمض لينولينيك
- هلام نباتي
- بروتين
- حمض التانيك
- شمع

التأثيرات المعروفة

- يعالج اضطرابات الجلد.
- يساعد الأمعاء في التخلص من البراز.
- مقاوم للالتهاب
- ملين للمعدة.
- يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية.
- معلومات متفرقة
- لقد تحسنت تنقية هذا المنتج.
- يزداد استعماله في منتجات الحبوب.
- جيد لزيادة الألياف إلى مأخوذك من الطعام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المفتوح.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

الثوم Garlic

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Allium sativum*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

البصلة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Allicin

Allyl disulfides

حديد

مغنيزيوم

منغنيز

Phytoncides

بوتاسيوم

سيلينيوم

كبريت

ألدريد غير مشبع

الفيتامينات A و B-1 و C

زيوت متطايرة

- يحمي من الالتهاب.
- يخفف من عسر الهضم.
- يخفف سماكة المخاط ويزيد من سيولته في الرئتين والمجاري الهوائية.
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- يساعد في ضبط ضغط الدم.
- يخفض مستوى الكوليسترول عند الذكور المصابين بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
- مقاوم للتأكسد.
- مقاوم للفيروسات والجراثيم.
- يخفف من تجمع لويحات الدم.
- مقاوم للتخثر.

معلومات متفرقة:

- يستخدم الثوم بمثابة تابل.
- تجنب منح الثوم للأولاد بمثابة عشبة طبية.
- يمكن استخدام الثوم بمثابة منكه في أطعمة الأولاد.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التشنج وآلم البطن عند الكبار.
- قد يقمع بعض أنواع السرطان.

التأثيرات المعروفة

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

- يجب عدم تناول أكثر من 5 فصوص ثوم يومياً.
- يمكن تناول فصين أو 3 فصوص ثوم طازجة مفرومة للحصول على الفوائد العلاجية.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
التهاب جلدي عند اللبس.	ضع القفازات.
اهتياج في المعدة والأمعاء، غثيان.	خفف الجرعة.
ازدياد عدد خلايا الدم البيضاء في التحاليل المخبرية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انخفاض ضغط الدم بسرعة. وتشمل الأعراض فقدان الوعي والعرق البارد والشحوب وخفقان القلب بسرعة.	أطلب الإسعاف.
طرح جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

• قد يزيد الجلد احمراراً من خلال زيادة تدفق الدم فيه.

• قد يعالج التهاب الجيوب الأنفية.

• قد يحسن الدورة الدموية.

• قد يعالج الحروق عند استعماله خارجياً في شكل رطب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت تخضع لمعالجة أي مشكلة طبية. إستشر الطبيب أولاً.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

- قد يخفف الحمى.
- قد يعالج صداع الشقيقة
- قد يعمل بمثابة مقاوم للتأكسد.
- قد يخفف ألم التهاب المفاصل (مقاوم للالتهاب).

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناولوه في حال:
 - كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصفي الاثنى عشري، أو الارتداد البيلموسي، أو التهاب القولون التقرحي أو المغص التشنجي.
 - يستشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
 - المعاناة من أمراض في المعدة أو الأمعاء.
- الحمل:
 - لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
 - لا تستخدميه لدوار الصباح أثناء الحمل.
- الإرضاع
 - لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Zingiber officinale
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
 - Bisabolene
 - Borneol
 - كمفين Camphene
 - كولين
 - سينول
 - سيترال
 - Sesquiterpane
 - زيوت متطايرة
 - Zingerone
 - Zingiberene

التأثيرات المعروفة

- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- يقاوم الالتهاب عند وضعه فوق الجلد أو المفصل الملتهب.
- يعالج الفتيان والتقيؤ.
- يعالج دوار الحركة.
- معلومات متفرقة:
 - يستخدم الزنجبيل بمثابة منكه للطعام.
 - ما من تأثيرات، جيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم، عند استخدام الزنجبيل بكميات صغيرة جداً لتحسين نكهة الطعام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج صر الهضم.
- قد يعالج الانزعاج في البطن.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حرقة في الفم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطمونة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التعليق Ginkgo Biloba

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Ginkgoaceae, Ginkgo biloba

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• خلاصة الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Bilobalide •

• أحماض الجنكة

• الفلوكوسيد

Isorhamnetin •

• Terpene lactones

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج طنين الأذنين والدوار.

• قد يخفف من فقدان الرؤية الناجم عن التقدم في العمر.

• قد يخفف الأعراض المرتبطة بمرض راينو.

• يساعد ربما في معالجة المرض الوعائي المحيطي.

التأثيرات المعروفة

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
امتياح، أرقى	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- عانيت من سكتة دماغية أو أنك معرض لها.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدد طويلة لمشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

الجنسة Ginseng

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Arabinose
- الكافور
- Ginsenosides
- هلام نباتي
- Panaxosides
- راتنج
- سابونين
- نشاء

معلومات أساسية

- يطلق أيضاً على نبتة الجنسة اسم الجنسة الآسيوية أو الكورية أو الصينية.
- الاسم الأحيائي (الجنس والتنوع):
- Panax quinquefolius
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- الجذور

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى
الحمل:

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب،

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب،

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون الستين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفلة ولا
تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التأثيرات المعروفة

• ينشط عمل الدماغ والقلب والأوعية الدموية.

• يزيد إفراز الهستامين.

• يحسن الشهية والهضم.

• منشط

• مقاوم للتأكسد.

معلومات متفرقة

• إنه علاج صيني محبب يستخدم لكل شيء تقريباً.

• يعود أصل هذه النبتة إلى ولاية جوجيا الأمريكية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• يستخدم بمثابة مثير للشهوة الجنسية.

• قد يزيد القدرة العقلية والجسدية.

• قد يعالج أعراض سن اليأس.

• قد يخفف من تأثيرات التعرض للإشعاعات.

• قد يخفف مستوى الجلوكوز في الدم لدى المصابين
بالسكري.

• قد يخفف من الأرق.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل
قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد
البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص
التشنجي.

• الإصابة بمرض كيسي في الصدر، أو سرطان في
الثدي، أو مرض في القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

السمية

تعتبر الجرعة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة
لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Hydrastis canadensis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذومور

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

Albumin •

Berberine •

Candine •

• دهون

• هيدراستين

Lignin •

• راتنج

• نشاء

• سكر

• زيوت متطايرة



التأثيرات المعروفة

• مقاوم للالتهاب.

• يخفف النزف.

• قد تحسّن الكميات الكبيرة الجهاز العصبي المركزي.

• يحسن قوة الأوعية الدموية الصغيرة

• ملين للأمعاء.

معلومات متفرقة:

يمتاز الحاتم المذمّب بطعم مرّ حاداً.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يحسّن جهاز المناعة.

• قد يعالج الحثار.

• قد يعالج اضطرابات الكبد.

• قد يعالج سوء الهضم

• قد يحسّن الشهية.

• قد يخفف من التهاب الجيوب الأنفية.

• قد يعالج الإسهال المعدي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد الهمومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المنصّ التشنجي.

• المعاناة من مرض القلب أو داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

• تناول الكومادين.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة




العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صعوبات في التنفس	أطلب الإسعاف.
نوبات تشنج	أطلب الإسعاف.
إحباط	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
احتياج في الفم	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
والحنجرة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
خدر في اليدين والقدمين	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضعف يؤدي إلى شلل العضلات	أطلب الإسعاف.

تزال تحت عمر 45، وليست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية



يعتبر الخاتم المذهّب خطراً قليلاً خصوصاً على الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً أو الذين تناولوا كميات كبيرة لفترات طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الكولا (Gotu Kola)

- Theobromine
- مركبات Triterpenoid

التأثيرات المعروفة



- ينشط الجهاز العصبي المركزي.
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- مقاوم للالتهاب.
- يعالج مشاكل الجلد (الحروق، التهاب النسيج الحلوي).

معلومات متفرقة:

ما من تأثيرات، جيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم، عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة جداً لتحسين

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Centella asiatica
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الحبوب
- الجذور
- الحبوب
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- كافين
- Catechol
- Epicatechol
- Flavonoids
- راتنج

نكهة الطعام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف التعب.
- قد يخفف القلق.
- قد يحسن الدورة الدموية في الساقين.
- قد يحسن الذاكرة.
- قد يساعد الجذام leprosy.
- قد يخفف من تشنجات الليل.
- قد يخفف من الوخز أو الخدر في الأطراف.
- قد يسرع شفاء الجروح.
- قد يعالج الأكزيما.

دون الستين.

معلومات أخرى:

قد يسبب التهاباً في الجلد عند الاحتكاك

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة

إليك.

السمية

تعتبر الكولا آمنة نسبياً عند تناولها بكميات صغيرة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات

العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض

الحرقة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة

المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تفاقم القرحة في المعدة أو المعى الاثنى عشري أو المريء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عدم القدرة على النوم	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ارتفاع مستوى الكوليسترول	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عصبية	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
حساسية للضوء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التنجني.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدميه.
- الإرضاع.
- لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المعكملت وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في التلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجعات الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Vitis vinifera*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

هذه الفقرة لا تنطبق هنا

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● الأحماض الدهنية الأساسية

● Proanthocyanidins

● Tocopherols

التأثيرات المعروفة

● مقاوم للأكسدة.

● يساعد في الحماية من تصلب الشرايين.

● يحول دون أذى الجذور الحرة.

● يحسن الدورة الدموية.

● مضاد للالتهاب.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يحمي من تأثيرات الإشعاعات.

● قد يحمي من مرض شبكية العين.

● قد يخفف من الدوالي.

● قد يساعد في شفاء الجروح.

● قد يحول دون تسوس الأسنان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

المعاناة من مرض مزمن، من دون استشارة الطبيب.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر

فاعلية)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
 - كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض القلب.
- استشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
 - لا تستخدميه.
- الإرضاع:
 - لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد:
 - يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
 - لا تحاول وصف الأدوية لنفسك. وإن كنت تظن أنك تعاني من مرض القلب، استشر الطبيب على الفور.
- حفظ المنتج:
 - يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
 - إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Crataegus oxyacantha
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
 - الثمار
 - البزاعم
 - الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
 - أستيل كولين
 - ملونات من نوع أنثوسيانين
 - Cardiotonic amines
 - كولين
 - حمص Cratagolic
 - Flavonoids
 - غلوكوسيد
 - Purines
 - Saponins
 - أحماض Triterpene

التأثيرات المعروفة

- يخفف التنفس
- يزيد دفق الدم إلى القلب.
- يخفف سرعة خفقان القلب.
- يقاوم عدم الانتظام.
- يوسع الأوعية الدموية التاجية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج ضغط الدم المرتفع.
- قد يعالج تصلب الشرايين.
- قد يعالج مشاكل الدورة الدموية.
- قد يخفف مستوى الكوليسترول في الدم.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صعوبات في التنفس.	أطلب الإسعاف.
عدم انتظام في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الروفا Hyssop

معلومات متفرقة

متوافر في شكل شاي وكمامات وصبغة وأشكال مجففة
أو طازجة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج الالتهاب الشعبي.
- قد يسكن الجسم قليلاً (مقاوم للقلق).
- قد يرخي العضلات.
- قابض ربما للأنسجة الحية: قد يشفي الجروح عند استخدامه خارجياً.
- ربما له خصائص مقاومة للفيروسات.
- قد يخفف من عسر الهضم.
- قد يشفي من قروح البرد.
- قد يخفف كمية الغازات في الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:
كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Hyssopus officinalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الأجزاء الهوائية (أي التي فوق سطح الأرض)
- الزيت العطري
- الأزهار
- الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

- Diosmine
- Flavonoids
- Hyssopin
- حمض Isolic
- Marrubiin
- حمض Oleanolic
- راتنج
- حمض التانينك
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

يحفز على السعال ويخفف من الاحتقان الصدري.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب في حال استمر الإسهال.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب في حال استمر الغثيان.

عاجلة).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك لأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

كافا كافا Kava Kava

• Methysticin

• نشاء

• Yangonin

التأثيرات المعروفة

• يقمع الجهاز العصبي

• مضاد للقلق.

معلومات متفرقة

• يستخدم لصنع مشروب كحولي متخمّر.

• تأثيره المسكن خفيف.

• متوافر في شكل لحاء مجفف وكبسولات وصفات.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Piper methysticum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Demethoxyyangonin

• Dihydrokawain

• Dihydromethysticin

• Flavorawin A

• Kawain

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يخفف من أعراض القلق.
- قد يدفع إلى النوم المريح
- قد يعالج التعب.
- يطهر ربما المجاري البولية التناسلية.
- قد يعالج السعال.
- قد يرخي العضلات.
- مسكن للألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تخطين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- تشغل أو قيادة معدّات كبيرة.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر فلفل الكاوة خطيراً قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً ويتناولون جرعات كبيرة لفترات طويلة

لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حساسية في الجلد.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
اهتياج في المعدة والأمعاء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
سكون مفرط.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
قد تؤدي الجرعات الصغيرة المتكررة إلى لون كزبي في الأظافر والجلد، والتهاب الجسم والعينين	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

شمول الطبل Milk Thistle (Mary Thistle, Wild Artichoke)

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بناء على وصفة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يحب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون الستين.

معلومات أخرى:

قد يصاب المرء بالإسهال عند استخدامه خلال الأيام
الأولى للاستعمال

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة
سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Silybum marianum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

● الفاكهة

● الأوراق

● الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Silymarin ●

التأثيرات المعروفة

● يحمي الكبد من المواد الكيميائية المضرة

● يزيد إفراز الصفراء وشففها.

● مضاد للتأكسد.

● يساعد في معالجة التهاب الكبد المزمن.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يخفف من اليرقان.

● قد يخفف من الالتهاب الناجم عن التهاب الكبد
وتشمعه.

● قد يخفف من التهاب المرارة.

● قد يساعد في مداواة داء الصدف.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

إستشر الطبيب في حال

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): v. thapsus
Verbascum thapsiforme, V. phlomoides,
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأزهار

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Saponin



التأثيرات المعروفة

• يغطي الأنسجة المكشوفة ويحميها.

• يلطّف الجلد المهتاج.

• يعالج السعال واحتياج الحنجرة.

معلومات متفرقة

متوافر في شكل شاي وكمامات ورناد للاستنشاق.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من الاحتياج الشعبي عند تدهينه.

• قد يعالج حروق الشمس والبهاسير والجلد المصاب والغشاء المخاطي عند استعماله موضعياً.

• قد يعالج تشنجات المعدة.

• قد يعالج الإسهال.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّاداة مشكلة طبية لم تتحسن

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدّل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
احتياج بسيط في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

Myrrh السمر

- يستخدم بمثابة غسول للفم.
- يعالج الالتهاب الشعبي.
- يعالج الحنجرة المتقرحة.
- قد يعالج القروح الأكلية.
- قد يعالج الأكزيما.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Commiphora molmol

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• الراتنج من الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض الخن

• حمض النمليك

• أحماض المر

• راتنج

• زيوت متطايرة

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

يستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

التأثيرات المعروفة



يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

معلومات متفرقة

يستخدم المر أساساً في العطور والبخور.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يعالج سوء الهضم.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة. قد يكون المرء ساماً في التركيزات الشديدة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنّج	إتصل بالإسعاف.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
نعاس	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيئ الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

الشوفان (Oat Beard) Oats

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Avena sativa
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- زلال
- غلوتين
- زيت الصمغ
- مركّب البروتين
- أملاح
- سابونين Saponin
- نشاء
- سكر

التأثيرات المعروفة

- يساعد على النوم
- يخفض مستوى الكوليسترول.
- يساعد البشرة الجافة.

معلومات متفرقة

يجب زيادة مأخوذ الشوفان تدريجياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من الإحباط
- قد يعالج مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم.
- قد يخفف من عسر الهضم
- قد يعالج الأرق.

دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

ما من تحذيرات في هذا الشأن.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

البقدونس Parsley

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- كافور البقدونس
- Apiol
- Pinene
- الفيتامينان A و C
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Petroselinum crispum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• الجذور

• الجذوع

● يخفف من التهاب المجاري البولية.

● ينشط الرحم

● يساعد في الهضم.

● يزيد عمل الكليتين، أي أنه يساعد الجسم في التخلص من فائض السائل من خلال زيادة إنتاج البول.

معلومات متفرقة

● عند تناول البقدونس الأخضر، ما من مشاكل متوقعة.

● يتوافر البقدونس في شكل صبغة وأوراق وذور وجذور وجزور.

● إنه مصدر جيد للفيتامينين A و C.

التأثيرات الإضافية

المحتلة

● قد يعالج دورة الطمث المؤلمة وتناذر ما قبل الطمث.

● قد يعالج سوء الهضم.

● قد يخفف من الغازات.

● قد يسهل مرور الحصى في الكليتين.

(111)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

● المخاطر تفوق الفوائد المتوقعة. يفضل تفادي أي دواء مصنوع من البقدونس.

● يمكن تناول البقدونس الأخضر المستعمل بمثابة تابل.

الإرضاع

● المخاطر تفوق الفوائد المتوقعة. يفضل تفادي أي دواء مصنوع من البقدونس.

● يمكن تناول البقدونس الأخضر المستعمل بمثابة تابل.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الفلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر البقدونس آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين)	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حساسية للضوء	تجنب التعرض لأشعة الشمس القوية.

عشبة السحام Pau D'Arco (Lapacho, Taheebo)

- إنه متوافر في شكل كبسولات وصفات وشاي ولحاء مجفف.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- ربما يقاوم الالتهاب.
- قد يعالج الروماتيزم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو ثنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Tabebuia (توجد عدة أنواع منها avellanedae و impetiginosa)

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- اللحاء الداخلي
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

- Bioflavonoids
- Naphthoquinones

التأثيرات المعروفة

- مضاد حيوي
- مضاد للفطريات.
- مضاد للطفيليات.
- يخفف من عسر الهضم.
- معلومات متفرقة
- يوصف بمثابة علاج للسرطان، ولكن تأثيراته في السرطان لم تثبت في هذا الوقت.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك. والمعدل هو 250 ملغ إلى غرام واحد في اليوم.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معطل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

إن الاستخدام الطويل الأمد لهذه العشبة (أكثر من 7-10 أيام) يجب أن يخضع لإشراف الطبيب.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

النعناع Peppermint

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Mentha piperita*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● البراعم المزهرة

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● المنتول

● المنتون

● أسيتات الميثيل

● حمض التانيك

● Terpenes

● زيوت متطايرة

- يزيد من تدفق حمض الصفراء لعمل المرارة كما يجب.
- ينشط المعدة والأمعاء.
- معلومات متفرقة
- يستخدم النعناع لإضافة النكهة إلى المستحضرات الطبية وغير الطبية.
- ما من تأثيرات، سواء جيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم، عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة لتحسين نكهة الطعام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- قد يخفف من الأرق.
- ربما يحارب الجراثيم

التأثيرات المعروفة

- يمالج انزعاج المعدة.

دول السنيتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخيطت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة. لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين) تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.
- المعاناة من داء الصرع أو اضطرابات عصبية أخرى.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع:

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع:

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

قد يصاب الأشخاص الحساسون للقبار أو العشب بحساسية تجاه حشيشة البراغيث.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Plantago psyllium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• الفلوكوسيد

• هلام نباتي

التأثيرات المعروفة

• يحسن حركة الأمعاء.

• يطري البراز.

• يخفف من خطر مرض القلب من خلال التخلص من فائض الكوليسترول في الدم.

معلومات متفرقة

حشيشة البراغيث هي منتج شعبي متوافر من دون الحاجة إلى وصفة طبيب.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الإمساك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

كنتي حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

البرسيم الأحمر (Red Clover (Cowgrass

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب. يمتاز البرسيم الأحمر ببعض المزايا الشبيهة بالأستروجين.

الإرضاع
لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد
يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:
ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج
• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر البرسيم الأحمر آمناً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Tnfolium pratense

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأزهار

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض الفوليك

• الفلوكوسيد

• Isoflavonoids

التأثيرات المعروفة

• يخفف نشاط الجهاز العصبي المركزي.
• يساعد في التخلص من البلغم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من تشنجات أعلى البطن.
• قد يعالج عسر الهضم.
• قد يلين الإفرازات في المجاري العشبية بسبب الالتهابات أو الأمراض الرئوية المزمنة.
• يحتوي على مركبات مضادة للأورام ويمكن استعماله مع عقاقير أخرى لمعالجة بعض أشكال السرطان.
• قد يخفف من أعراض سن اليأس.
• قد يساعد جهاز المناعة الضعيف.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:
• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
• المعاناة من مرض القلب أو السكتة.
• استشر الطبيب في حال:
• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه.

الرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيit الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. قابلية الحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Crocus sativus*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• العلوكوسيد

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يخفف من امتصاص المعدة والأمعاء.

• يزيد التعرق

• يزيد سيولة إفرازات الشعبات الهوائية.

معلومات متفرقة

• ما من تأثيرات، سواء جيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم، عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة لتحسين نكهة الطعام. لكن الزعفران يصبح ساماً جداً عند استخدامه في كميات كبيرة. لذا، إستخدم الجرعة الموصى بها.

• الزعفران باهظ جداً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحسن التنفس لدى المصابين بداء الربو أو السعال الحاد.

• قد يخفض مستوى الكوليسترول.

• قد يخفف من عسر الهضم.

• قد يساعد في ضبط ضغط الدم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نزف في الأنف	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
خفقان القلب بهبط	أطلب الإسعاف.
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

يعتبر الزعفران آمناً عند استخدامه بالكميات الملائمة لفترات قصيرة.
لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

القصعين Sage

- يجمع مركز ضبط الحرارة في الدماغ
- يخفف التشنج في العضلات العظمية أو الطرية.
- ينشط جهاز المعدة والأمعاء.
- ينشط الجهاز العصبي المركزي.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

- يستخدم القصعين بمثابة منكه وفي العطور.
- ما من تأثيرات، حيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة لتحسين نكهة الطعام. لكن الاستخدام الطويل الأمد لكميات كبيرة قد يسبب نوبات تشنج وفقدان الوعي.
- يتوافر القصعين في شكل طازج أو مجفف، أو في شكل صبغة أو شاي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- قد يطرد الحشرات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Salvia officinalis*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- الكافور
- Flavonoids
- راتنج
- Salvane
- Saponin
- حمض التانيك
- Terpene
- Thujone
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تفسدان من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر القصعين آمناً عند استخدامه بالكميات الملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
جفاف في الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تورم الشفتين.	قد يؤدي شرب الشاي إلى تورم الشفتين. توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- قد يعالج التهابات الفم والحنجرة عند استخدامه بمثابة غسول للفم.
- قد يخفف من تعرّق الليل المرتبط بسنّ اليأس.
- قد يخفف من ألم لدغات الحشرات عند استخدامه على نحو خارجي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال: كنت حاملاً أو تغنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - إستشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

قد يخفف القصعين من دفق الحليب. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت للطفولة ولا

عشبة يوحنا St. John's Wort (Klamath Weed)

• تناول أدوية أخرى مضادة للإحباط.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

• لا تتناول هذه العشبة مع الأدوية المضادة للإحباط، إلا إذا وصفها الطبيب لك.

• إن كنت تظن أنك مصاب بالإحباط، أطلب المساعدة الطبية قبل استعمال عشبة يوحنا

• قد تؤدي عشبة يوحنا، بالجرعات الكبيرة، إلى حساسية تجاه الضوء.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Hypericum perforatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأزهار

• البتلات

• الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Hypencin

• راتنج

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يخفف من المزاج السيء (الخفيف إلى المعتدل).

• يخفف من القلق.

• يرفع قليلاً الجهاز العصبي المركزي.

• يعمل بمثابة مضاد للجراثيم للمساعدة في شفاء

الجروح.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يقاوم الفيروسات.

• قد يعالج الاضطراب العاطفي الموسمي.

• يستخدم خارجياً للحروق الخفيفة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إحتياج في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تلون غير طبيعي للجلد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
حساسية للشمس.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً، خصوصاً عند الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات كبيرة لفترات طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الساسافراس Sassafras

معلومات متفرقة

إنه محظر في الولايات المتحدة كعامل منكه لأنه قد يسبب السرطان.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- يستخدم بمثابة "منشط" للجسم.
- قد يعالج داء السفلس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Sassafras albidum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● اللحاء

● الجذور

المواد الكيميائية الموحدة في هذه العشبة:

● Cadinene

● كافور

● إوجينول

● Phellandrene

● Pinene

● Safole

التأثيرات المعروفة

● يقمع الجهاز العصبي المركزي.

● إحتياج الأغشية المخاطية.

● ما من تأثير طبي مثبت.

السمية

قد يسبب الساسفراس مرض السرطان. لا تستخدمه. يعتقد أنه غير آمن وغير فعال. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صعوبات في التنفس.	أطلب الإسعاف.
غيبوبة.	أطلب الإسعاف.
توسع بؤبؤ العين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
فقدان الوعي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في القلب والكبد والكليتين	أطلب الإسعاف.
متمثل في ورم الأطراف وضيق النفس والهرقان والدم في البول.	
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نزف في الأنف (متكرر).	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

● تناول عقاقير أو أعشاب طبيعية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل. المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
 - كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.
 - إستشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
 - المعاناة من تضخم البروستات.
- الحمل:
 - لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الإرضاع:
 - لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد:
 - يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
 - ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع بمبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
- حفظ المنتج:
 - يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Serenoa repens*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية
- الثمار
 - الحبوب
 - المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
 - أحماض Capric
 - أحماض Caproic
 - أحماض Lauric
 - أحماض Oleic
 - أحماض دهنية
 - راتنج

التأثيرات المعروفة

- يحسن التبويل لدى الرجال المصابين بوزم حميد في البروستات.
 - يعالج أعراض البروستات المتضخمة.
 - يبطل الأغشية المخاطية.
- معلومات متفرقة
- يمكن أكل ثمار هذه العشبة لكن طعمها ليس لذيذاً

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهاب المثانة المزمن.
- قد يعالج التهاب إحليل البول والالتهابات الأخرى في الأعضاء التناسلية الذكورية.
- قد يحسن الشهية
- قد يقاوم الالتهاب.
- قد يحسن جهاز المناعة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

لمباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- لحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

Slippery Elm (Red Elm) الألتصر

التأثيرات المعروفة

- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والشعبات الهوائية ويزيد من سيولته.
- يلطف الحنجرة المتقرحة.
- يخفف من إزعاج السعال.
- معلومات متفرقة
- متوافر في شكل شاي وكمامات وحبوب صغيرة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج القرحة.
- قد يعيد الإسهال.
- قد يلطف الجروح والخدوش ويشفيها عند استخدامه على نحو خارجي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Ulmus rubra, U. fulva
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.
- اللحاء الداخلي
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
Bioflavonoids ●
- كلسيوم
- أوكسالات الكلسيوم
- هلام نباتي
- فوسفور
- سكريد متعدد
- نشاء
- حمض التانيك
- راتنج

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حساسية	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

• المعاناة من تضخم البروستات.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولسيت حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

إيتا شجرة النعناع Tea Tree Oil

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Melaleuca alternifolia

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الزيت العطري

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• عناصر جديدة للجراثيم

• Terpene hydrocarbons

التأثيرات المعروفة

- يعمل بمثابة مطهر للجروح.
- له خصائص مقاومة للجراثيم والفطريات.
- يساعد في معالجة لدغات الحشرات.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من حب الشباب.
- يستخدم في شامبو البراغيث

حدث ذلك، يجب تخفيف الزيت بالمياه المقطرة أو زيت الفيتامين E أو إستشر الطبيب.

• يمكن استعمال زيت شجرة الشاي بمثابة مطهر لكن لا يوصى بابتلاعه عبر الفم.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

اهتياج الجلد توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

• قد يشفي من قدم الرياضي.

• قد يساعد في تلطيف اللوزتين الملتهبتين.

• قد يعالج التهابات المثانة.

• قد يخفف من أعراض الزكام والانفلونزا.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر مفعالية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

• قد يشعر أصحاب الجلد الحساس بالاهتياج. إذا

التأثيرات الإضافية

مخاطر محتملة

- قد يخفف من تشنجات دورة الطمث.
- قد يخفف من تناثر الأمعاء المتهاجة.
- قد يعالج القلق.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- يستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Valeriana edulis, V. officinalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الجذور

- الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- حمض الخل

- الحامض الزيدي

- الكمفين

- Chatinine

- الحمض النعطي

- الغلوكوسيد

- Pinene

- الراتنج

- حمض النارددين

- Valerine

- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يرفع الجهاز العصبي المركزي.

- يعالج ضغط الدم المرتفع.

- يعالج الأرق.

- يهدئ ويدفع إلى السكون

معلومات متفرقة

- تحب القطط هذه العشبة.

- لا تستخدمها مع المسكنات أو المهدئات كي لا يختلط التأثير.

- تجنب القيادة عند تناول هذه العشبة.

- يتوافر النارددين في شكل شاي أو جذور مجففة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- يجب استخدام النوع الطازج فقط. فالناردين المجفف يفقد فاعليته.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

علي الحمام (Verain (European Vervaine, Verbena

- قد يعالج الصداع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الممعي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أمشاپ طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Verbena officinalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Verbenaline

التأثيرات المعروفة

- ينشط المعدة والأمعاء.
- ينشط الجهاز العصبي التلقائي نظير الودي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السعال.
- قد يعالج الألم في أعلى البطن.
- قد يدفع إلى التقيؤ.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مهنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة**

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

يوتيمبي Yohimbe**معلومات أساسية**

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)
Corynanthe yohimbe, Pausinystalia yohimbe
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• اللحاء

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Yohimbine**التأثيرات المعروفة**

- يجمع الاستجابات المباشرة من الجهاز العصبي التلقائي.

- يرفع ضغط الدم.

• يجمع الأوكسيداز الأمين وقد يسبب ارتفاعاً كبيراً في ضغط الدم، وحتى السكتات، عند تناوله مع الجبن والأطعمة الأخرى المحتوية على التيرامين.

- يزيد أو يحسن الرغبة الجنسية.

معلومات متفرقة

- قد يسبب الهوس قلقاً كبيراً عند حقنه عبر الأوردة

• لا يتوافر بشكل شائع في الولايات المتحدة وله الكثير من التأثيرات الجانبية والقليل من الفوائد المحتملة.

التأثيرات الإضافية**المحتملة**

الجرعة الآمنة:

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر خطراً، خصوصاً بالنسبة للأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات كبيرة لغثرات طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
آلم في البطن	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
اضطراب	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
قلق	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تعب	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
ارتفاع ضغط الدم	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
سرعة خفقان القلب	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
أرق	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
شلل العضلات	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضعف	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

● قد يعالج العجز الجنسي

● قد يعالج تشنجات الطمث المؤلمة

● قد يعالج آلم الصدر الناجم عن مرض الأوعية التاجية.

● قد يعالج تصلب الشرايين.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض الكبد أو الكلية.

استشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

● التفكير في تناول اليوهيمي.

الحمل

لا تستخدميه.

الإرضاع

لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

لن يساعدك هذا المنتج أبداً وقد يسبب لك أعراض التسمم.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الأعشاب الأقل شيوعاً

النقرس.

● قد يساعد في معالجة التهابات الشعبات والحناق.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التنسجي.

استشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه.

الارضاع

لا تستخدمه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

● Aconitum napellus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● الأوراق

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Aconine

● Aconitine

● Benzoylamine

● Neopelline

● Picroaconitine

التأثيرات المعروفة

● المقادير الصغيرة تنشط الجهاز العصبي المركزي والأعصاب المحيطية.

● الكميات الكبيرة تقمع الجهاز العصبي المركزي والأعصاب المحيطية - وهذا خطير.

● يسوي سوء الانتظام في خفقان القلب.

● قد تكون جرعة من 5 مل (أي ملعقة طعام) مميتة فعلاً.

● مقاوم للالتهاب.

معلومات متفرقة:

يستخدم منذ قرون كسم في السهام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يخفض الحرارة المرتفعة في الجسم.

● قد يسوي سوء الانتظام في خفقان القلب.

● قد يلطف تقرح الحنجرة والتهابها.

● قد يخفف من ألم التهاب المفاصل الرثياني وداء

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حرق أو خدر في اللسان والشففتين	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صعوبة في البلع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
امتياز	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
أرق	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
صعوبة في الكلام	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ازدواج الرؤية	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة، خصوصاً بالنسبة للأطفال والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات كبيرة لغترات طويلة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الصبار الأمريكي Agave

التأثيرات المعروفة

- يسبب انحلال خلايا الدم الحمراء.
- يسبب امتياز الجلد.
- امتياز بطانة المعدة والأمعاء.
- الكميات الصغيرة تقمع الجهاز العصبي المركزي.
- يؤذي الخلايا (يذوّب أغشية خلايا الدم الحمراء ويغير نفاذ الأنسجة).
- معلومات متفرقة
- تستخدم أليافه لصنع الحبال.
- يستخدم نسفه بمثابة شراب مركز.
- تحتوي الجذور والأوراق على مواد كيميائية نشطة.

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Agave lecheguilla
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- الأوراق
- الجذور
- النسغ
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Diosgenin
- خضاب التخليق الضوئي
- مواد سترويد كيميائية
- فيتامين C

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إحساس (احتمال)	أطلب الإسعاف.
بعيد في حال تناوله	
بكميات كبيرة).	
إسهال.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
زيادة الحساسية للضوء.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان
برقان.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حكاك وطفح جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
نزف غير اعتيادي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- تستخدم الجذور والأوراق للتخفيف من ألم الأسنان
- قد يوفر التغذية.
- قد يحلّ مكان الهرمونات.
- قد يعمل بمثابة قاصع لجهاز المناعة في الجسم.
- قد يسبب الإجهاض.
- قد يعالج الزحار
- قد يخفف ألم الوثء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من أعراض مرض ناجم عن نقص في الهرمونات.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الممي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- المعاناة من مشاكل في المعدة
- تناول الكورتيزون أو التستوستيرون أو الستيرويد المنشط للذكورة.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مهنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

جار الماء الأسود (Alder Buckthorn) Alder, Black

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً، خصوصاً بالنسبة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Alnus glutinosa, *Rhamnus frangula*, *Frangula*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Anthraquinone glycosides

• Emodin

• Rhamnose

التأثيرات المعروفة

• امتصاص المعدة والأمعاء.

• يسبب التقيؤ.

معلومات متفرقة.

• يستخدم جار الماء في الأدوية المخصصة للحيوانات بسبب خصائصه المسهلة.

• يصبح مفعوله المقيئ أقل عند تجفيف النبتة لسنة كاملة أو أكثر.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف مؤقتاً من الإمساك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

للأولاد والذين تخطوا 55 عاماً ويتناولون جرعات كبيرة لفترات طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تشنجات حادة في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الفصل Alfalfa

- له خصائص مقاومة للفطريات.
- معلومات متفرقة:
- إنه يستخدم عادة في كبسولات أو في شكل شاي.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج النزف غير الاعتيادي.
- قد يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.
- قد يخفف الإمساك.
- قد يعالج دوار الصباح.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Medicago sativa
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الأوراق
- البتلات/الزهرة
- البراعم
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- بروتينات
- صابونين
- الفيتامينات A و B و D و K

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- تناول أدوية مقاومة للتخثر.
- المعاناة من الذئب الحمامي.
- إستشر الطبيب في حال:

التأثيرات المعروفة

- يوفر بروتينات وفيتامينات مفيدة للحمية الغذائية.
- ينشط دورة الطمث.
- ينشط إنتاج الحليب لدى النساء المرضعات.

المعاناة من مشكلة نزف.

الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه ضمن غذاء متوازن. وتبين أن المنتجات الأخرى المستخرجة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه ضمن غذاء متوازن. وتبين أن المنتجات الأخرى المستخرجة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

• ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

• قد يؤدي تناول كميات كبيرة من براعم الفصّة إلى فقر دم.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء.

المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

تعتبر هذه النبذة آمنة إجمالاً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما يجب فعله

توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان

العلامات والأعراض

تشنجات في البطن

إسهال

الملح الأخضر (Allspice (Clove Pepper, Jamaican Pepper

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• احتياج الأغشية المخاطية، بما في ذلك غشاء المعدة والأمعاء.

• يساعد في طرد الغازات من الأمعاء للتخفيف من المص.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Pimenta dioica
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• زيت مثبّت بالحمض

• Eugenol

• رائنج

معلومات متفرقة:

- المواد الكيميائية النشطة موحودة في الثمار
- يوفر النكهة في معجون الأسنان ومنتجات أخرى.
- يستخدم بمثابة تابل عطري في الأطعمة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف الإسهال.

دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة إجمالاً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
قد يؤدي مقدار 5 مل من الأوجينول (أي ملء ملعقة طعام) إلى نوبات تشنج وغثيان وتقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص الشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

- يستخدم بمثابة جزء أساسي في بعض مستحضرات التجميل.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يقتل جرثومة *Pseudomonas aeruginosa* عند وضعه على الجلد، لكنه لا يسرع الشفاء.
- قد يعالج انعدام دورات الطمث عند تناوله داخلياً.
- قد يخفف من الصداع عند وضعه على الرأس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- المعاناة من قرحة في المعدة.
- المعاناة من مشاكل في الأمعاء الدقيقة.
- المعاناة من التهاب القولون التقرّحي.
- المعاناة من التهاب الرتج.
- المعاناة من البواسير.
- استشر الطبيب في حال:
- المعاناة من مشكلة في الجهاز الهضمي.
- أردت تناوله داخلياً.
- الحمل:
- لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الرضاع
- لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
- لا تزال الخصائص الشافية للألوّة المحقونة داخلياً قيد الدرس وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

معلومات أساسية

يطلق على الألوّة أيضاً اسم الألوّة المتوسطة أو ألوّة بريبادوس أو ألوّة كوراكاو الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Aloe vera, A. barbadensis, A. officinalis
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- Aloectin B
- Anthraquinones
- السكرّيد المتعدد
- الراتنج
- حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

- يساعد الإفراز الحليبي (وليس المستحضر المجفف) من الأوراق في تخفيف الالتهاب وتسريع الشفاء في حروق الدرجة الأولى والثانية.
- يعمل بمثابة مسهل، لكن فائدته أو خطورته ترتبط بعدة عوامل.
- يعالج حروق الأشعة أو أشعة X.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.
- له خصائص مقاومة للجراثيم والفيروسات.
- يشفي الجروح إجمالاً.
- يشفي قروح الجلد.
- معلومات متفرقة
- ليس مفيداً لتنظيف الأمعاء قبل عملية جراحية لأنه ينظف فقط الأمعاء الدقيقة.
- يستخدم بمثابة جزء أساسي في العديد من المسهلات الشائعة

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تشنجات في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال ممزوج بالدم.	أطلب الإسعاف.
اهتياج الأمعاء.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
اهتياج بسيط في الجلد.	مظف الجلد بمياه معقمة. لا تستخدم الألوّة مجدداً.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
بول أحمر.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ازدياد تواتر البول.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
والشعور بألم في الظهر	

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.



السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة إجمالاً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الحوشيرة (Alum Root (American Sanicle

معلومات متفرقة

- تستخدمه بعض قبائل الهنود في أميركا الشمالية لمداداة العديد من الأمراض.
- يستخدم بمثابة منظف للجسم.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

- قد يعالج مرض القلب.
- قد يحول دون الالتهاب في الجلد المصاب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

معلومات أساسية



- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Heuchera*
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة
- حمض التانيك

التأثيرات المعروفة



- يقلص الأنسجة
- يحول دون إفراز السوائل.

- المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- يحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة. غير أن التأثيرات السامة تفوق كثيراً كل الفوائد المحتملة
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
- التفاعلات العكسية أو
- التأثيرات الجانبية أو أعراض
- الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
عسر هضم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
أدمة (تورم اليدين والقدمين).	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

- المعاناة من مرض في الكبد أو الكلية.
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المقص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

التأثيرات السامة تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدم هذه العشبة داخلياً.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المسك الأميركي (American Dogwood) (American Dogwood)

- اللحاء
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- حمض بتوليك
- كورنين

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Cornus florida*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إجهاض أطلب الإسعاف.

التهاب الجلد. توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان

التأثيرات المعروفة

- امتياج المعدة والأمعاء ويعمل بمثابة مسهل.
- يسبب انقباضات في الرحم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف الحرارة.
- قد يقتل الجراثيم في الطلع الجلدي الملتهب ولدغات الحشرات.
- قد يعالج الملاريا.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

كنت حاملاً لأنه يسبب الإجهاض.

إستشر الطبيب في حال:

تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حشيشة السعال Angelica (European Angelica, Garden Angelica)

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

- حمض الملاك
- الراتنج
- زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Angelica archangelica

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- كامل النبتة

التأثيرات المعروفة

إن الزيوت المتطايرة تمنح حشيشة الملاك التأثيرات الآتية:

- يخفف سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الهوائية ويزيد سيولته.
- يزيد التعرق.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- تستخدم الحبوب والحبور للتخفيف من رائحة وحجم غارات البطن.
- قد يسبب دورة الطمث.
- قد يخفف من المغص وانتفاخ البطن.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تغطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

- قد يعالج التهاب الشعبات الهوائية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

التأثيرات السامة تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدم هذه العشبة داخلياً.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Pimpinella anisum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- Anethole

- Creosol

- Dianethole

- زيوت عطرية

- Flavonoids

- بروتينات

- Sterols

- Terpene

التأثيرات المعروفة

- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة مقدار البول المنتج.

- يخفف السعال.

معلومات متفرقة

- يستخدم اليانسون أيضاً في العطور والصابون والمشروبات والأطعمة المخبوزة وبمشابة متكّه للطعام.

- إنه متوافر في شكل شاي أو صبغة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من عسر الهضم.
- قد يخفف من المغص.
- قد يقتل قمل الجسم عند استخدامه خارجياً.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
الزيت قد يسبب إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صعوبة في التنفس غثيان أو تقيؤ	أطلب الإسعاف. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نوبات تشنج اهتياج الجلد عند وضعه عليه	أطلب الإسعاف. توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة:
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة
لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

حلتيت (Devil's Dung) Asafetida

- يستخدم بمثابة تابل.
- يوفر نكهة لذبدة في صلصة وورسترشير.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يخفف سماكة المخاط في الرئتين والمجاري
الهوائية ويزيد سيولته.
- قد يعالج المغص.
- قد يخفف مؤقتاً من الإمساك.
- قد يعالج اضطرابات الأعصاب.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Ferula assafoetida, E foetida
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- صمغ
- راتنج
- زيوت متطايرة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل
قرحة المعدة أو المعدي الاثنى عشري، أو الارتداد
البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

التأثيرات المعروفة

- امتياج بطانة المعدة والأمعاء مما يلين البراز.
- معلومات متفرقة.
- تعرّف إليه الأطباء الأوروبيين بفضل الأطباء العرب.
- له رائحة شبيهة بالثوم وطعم مرّ، مما يجعله دواءً
جيداً للإرضاء.

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

البرباريسل (European Barberry) Barberry

- كولومبامين
- هيدراستين
- جاتروديزين
- أوكسيكانيتن
- بالماتين

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Berberis vulgaris*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

• لحاء الجذر

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• بريامين

• بريرين

• بريروين

التأثيرات المعروفة

- يوسع الأوعية الدموية.
- يبطئ خفقان القلب.
- ينشط عمل الأمعاء ويساعد في التخفيف من

الإسك.

• يخفف من تقلص المجاري الهوائية.

معلومات متفرقة

• يتم تحويل الثمرة إلى هلام.

• تستخدم الجذور لصنع الصوف.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من الإسهال.

• قد يخفف من سوء الهضم وعسر الهضم وحرقة الفم.

• قد يعالج التهابات الجلد.

• قد يخفف من أعراض التهاب الكبد ومرضى الكبد

واليرقان

دون الستتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا

تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتحتج مبدئياً

بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا

تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• يحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر خطراً قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين

تخطوا 55 عاماً أو الذين تناولوا كميات كبيرة لفترات

طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

تغير في خفقان القلب. توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

تويات تشنّج. توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثيان، تقيؤ. توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

امتناع المعدة، إسهال. توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر

فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،

المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الارضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال لديك حساسية تجاه الشعير أو الغلوتين.
- إستشر الطبيب في حال تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أمشأب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الإرضاع.
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد.
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنن.
- معلومات أخرى.
- إن الشعير الملوث بالفطريات قد يسبب التسمم للحيوانات.
- حفظ المنتج.
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاحة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك

السمية

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)
- *Hordeum distichon*
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- أجزاء متنوعة من كامل النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- رماد
- سلولوز
- هوردين
- سكر مقلب
- Lignin
- ملت
- نيتروجين
- بكتين
- بنتوسان
- بروتين
- نشاء
- سكروز

التأثيرات المعروفة

- يوفر التغذية للجسم.
- معلومات متفرقة.
- الشعير هو من الحبوب ويحتوي أساساً على مواد مغذية.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- يستخدم بمثابة منشط بعد امتياج المعدة والأمعاء.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة



ما من شيء متوقع.

الشحمية Bayberry (wax Myrtle)

معلومات أساسية

الاسم الأحادي (الجنس والنوع): *Myrica cerifera*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• الفاكهة/ الثمار

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• أليومين

• بريرين

• زيت عطري

• فلافونويد

• حمض غاليك

• صمغ

• Myricitrin

• Myricinic acid

• Palmitin

• راتنج

• نشاء

• سكروئ

• حمض التانيك

• Triterpenes

• يخفف من احتقان الأنف.

• يخفف من الحمى.

• يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند

تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة:

• أدت حقن خلاصة اللحاء إلى تسبب السرطان في

الحيوانات المخبرية.

• تستخدم الشحمية عموماً بمثابة جزء أساسي أساسي

في مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية

والشموع.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

الاستعمال الداخلي:

• قد يسبب التقيؤ.

• قد يعالج الزكام الشائع.

• قد يعالج الإسهال.

• قد يعالج اليرقان.

الاستعمال الخارجي:

• قد يشفي القرحة.

• قد يعالج مشاكل اللثة

• قد يخفف من ورم الدوالي.

• قد يحسن الدورة الدموية.

التأثيرات المعروفة

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع
- قد يؤثر في توازن الالكتروليت من خلال زيادة الصوديوم وخفض البوتاسيوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتورم اليدين والقدمين.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من مشاكل متوقعة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- هناك تاريخ للسرطان (لا يوصى باستعماله بسبب احتوائه على التانين).
- إستشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الإرضاع
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى

تطلب الحب (Bearberry (Uva-ursi

- حمض Ellag c
- Ericolin
- حمض Gallic
- Hydroquinone
- حمض Marc
- Myricetin
- Quercetin
- حمض التانيك
- حمض Ursolic
- زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Arctostaphylos uva-ursi

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- أربوتين
- كلورين

الحمل

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 4، 5، ولسر حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- احفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة (ليس أكثر من أسبوع واحد).

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من مشاكل متوقعة

التأثيرات المعروفة

- يقلص الأنسجة البولية.
- يحول دون إفراز السوائل.
- يخفف من الألم البولي.
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.
- معلومات متفرقة.

- يصبح البول أخضر اللون عند تناول عنب الدب.
- كان يستخدم بكثرة لمعالجة التهابات المجاري البولية قبل تطوير العقاقير الأكثر فاعلية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- الأوراق المغلقة والمسحوقة
- قد يكون جيداً لالتهابات الكليتين.
- قد يسكن الألم.
- قد يخفف من الغثيان.
- قد يخفف الطنين في الأذنين.
- قد يعالج مشاكل التنفس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Betula alba, B.lenta

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• اللحاء

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• بتولين

• Methyl salicylate (شبهه بالأسبيرين)

• راتنج

• قطران

التأثيرات المعروفة

• يقاوم الاحتياج عند وضعه على الجلد الذي يغلف مفصلاً ملتهباً.

• يخفف الالتهاب في الأنسجة.

معلومات متفرقة:

• تمتاز الأوراق برائحة عطرية جميلة لكن طعمها مرّ.

• يجب شرب الكثير من الماء عند معالجة التهابات المجاري البولية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الروماتيزم والقصور القلبي الاحتقاني عند نقيه لاستخراج خصائصه الطبية.

• قد يعالج المشاكل الجلدية عند استعماله موضعياً.

• قد يقلص الأنسجة.

• قد يعالج التهاب المفاصل.

• قد يحول دون إفراز السوائل.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من مشاكل متوقعة

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.

الزهرة الثلاثية Birthroot

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Trillium erectum, T. pendulum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- راتنج
- صابونين
- نشاء
- حمض التانيك
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• احتياج الأغشية المخاطية.

• يعالج احتياج المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

• يستخدمه الهنود في جنوب شرق الولايات المتحدة بمثابة مسهل.

• يستخدم أيضاً بمثابة كمادة مسكّنة للألم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يعالج عدم انتظام دورة الطمث أو ازدياد تواتر هذه الدورة.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من مشاكل متوقعة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

الاستخدام Bistort

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Polygonum bistorta

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- حمض التانيك.

التأثيرات المعروفة

تستخدم جذور النبتة لقيض الأنسجة الحية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد تسبب الجذور التقيؤ

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المنص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الارضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنتِ تخططين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نزف من المعدة يتجلى	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
في تقيؤ دم أحمر فاتح	بالطبيب.
أو مادة شبيهة بحبوب	
القهوة.	
تلف الكلية يتجلى	أطلب الإسعاف.
في وجود دم في	
البول، وتضائل إنتاج	
البول، وتورم اليدين	
والقدمين.	
غثيان، تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.

تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية



لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الخس العمر (Bitter Lettuce (Prickly Lettuce)

- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



يقمع الجهاز العصبي المركزي.

التأثيرات الإضافية




المحتملة

- مسكن ويخفف من القلق أو الاضطرابات العصبية.
- قد يعالج السعال.
- قد يعالج ألم الصدر الناجم عن مرض الشريان التاجي.
- قد يسبب "النشوة" عند تدخينه

توقف: ملاحظات وتحذيرات



معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Lactuca virosa, *L. scariola*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- اللب (لبن النبتة)، الذي يستخرج من جذوع الأزهار

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- الكاوتشوك
- Hyoscyamine
- Lactuciferol
- Lactic Acid
- Lactucin
- Mannite
- نيترات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تتوین الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

يجب استخدام هذه النبتة تحت إشراف طبي.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إلى حالتك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

صعوبات في التنفس. أطلب الإسعاف.

الحشيشة المرّة (Bitter Root) (Rheumatism Weed, Spreading Dogbane)

Apocynin •

Cymarín •

Saponin •

التأثيرات المعروفة

• يبطئ خفقان القلب.

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• يسبب التقيؤ.

معلومات متفرقة

• لم يثبت تأثير هذه النبتة في القلب. ومستحضرات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Apocynum androsaemifolium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• البتلات/الزهرة

• الجذور

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Apocynin •

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستة.

معلومات أخرى:

يجب استخدام هذه النبتة تحت إشراف طبي.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيّران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً، خصوصاً بالنسبة للأطفال والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات كبيرة لفترات طويلة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
انخفاض سريع في ضغط الدم. وتشمل الأعراض فقدان الوعي والعرق البارد والشحوب والنض السريع	أطلب الإسعاف.
التهاب المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عدم انتظام خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الديجيتال الموصوفة أفضل كثيراً في معالجة أمراض القلب مثل قصور القلب الاحتقاني وعدم انتظام خفقان القلب.

• يطلق هذا الاسم على العديد من النباتات ذات السمية المختلفة. لذا، تأكد جيداً مما تتناوله.

• تزداد حاجتك إلى البوتاسيوم عند تناول هذه العشبة. لذا، تناول مكملات البوتاسيوم أو المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل المشمش والفاكهة الحمضية والموز.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج قصور القلب الاحتقاني.
- قد يعالج خفقان القلب السريع.
- قد يعالج حصي المرارة.
- قد "يصحح" دفق الصفراء.
- قد يعيد القوة إلى الأنسجة أو يحسن الشهية عند استخدام الجذور والجذمو لإعداد مستحضر طبي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاانة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المنص التشنجي
- إستشر الطبيب في حال
- تناول هذه العشبة لمدوّة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل

الحرايبية (Bittersweet (Bitter Nightshade, European Bittersweet)

قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد
البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص
التشنجي.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداءة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات
الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون الستين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً، خصوصاً بالنسبة
للأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Solanum dulcamara

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Dulcamarin •

Saponins •

Solanidine •

Solanine •

التأثيرات المعروفة

يقمع الجهاز العصبي المركزي.

معلومات متفرقة

الحرايبية نبتة خطيرة. تؤدي الكميات السامة إلى قمع
الجهاز العصبي وإحداث الدوار. أما الثمار فهي سامة
جداً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الأكرزما.

• قد يخفف الألم.

• قد يحسن الشهوة الجنسية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

أطلب الإسعاف.	غيبوبة
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	توسع البؤبؤ.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	دوار
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	صداع
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	ضعف في العضلات.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	غثيان أو قيء.
أطلب الإسعاف.	نبض بطيء.

جرعات كبيرة لغترات ملوثة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
المواد السامة موجودة خصوصاً في القاكهة غير الناضجة، مما يؤدي إلى الأعراض التالية:
حرقة في الحنجرة. توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الجوز الأسود Black Walnut

تستخدم لصبغ الشعر والثياب.
• يتوافر الجوز الأسود في شكل صبغة وخلاصة ولحاء مجفف وأوراق.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج الالتهابات الفطرية في الجلد.
- قد يعالج الثآليل واللبلاب السام.
- قد يعالج مرض القوباء وقروح البرد.
- قد يعالج قدم الرياضي وحكاك الأعضاء التناسلية.
- قد يخفف من حالات تسمم الدم.
- قد يساعد في معالجة حب الشباب.
- قد يعالج الالتهابات الفطرية.
- قد يساعد في معالجة قروح الفم الأكلة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوي الحمل في المستقبل القريب.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Juglans nigra
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- القشرة الخارجية
- اللحاء الداخلي
- الأوراق
- الحوز

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- Ellagic Acid
- Juglone
- Mucin

التأثيرات المعروفة

- يخفف من الإمساك.
- يخفف من طفيليات الأمعاء.
- معلومات متفرقة
- تغضي القشرة الخارجية للجوز إلى صبغة بنية

حفظ المفتوح:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
- التفاعلات العكسية أو
- التأثيرات الجانبية أو أعراض
- الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال خفيف.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ألم في أعلى البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الصمى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو الصفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، الكمكلات وعقاقير أخرى.

الحمل:

- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.
الحمل.

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا
تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة
سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Fucus vesiculosus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

أجزاء متنوعة من النبات تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Alginate Acid •

Bromine iodine •

Fucodin •

Laminarin •

التأثيرات المعروفة

يمتص الماء في الأمعاء لتسهيل التخلص من البراز.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السمّة.
- قد يزيد من نشاط الغدة الدرقية.
- قد يقتل طفيليات الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Cnicus benedictus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Cincin

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يحفز إنتاج الحليب لدى الأم المرضعة.

• مضاد للجراثيم.

• مضاد للالتهاب.

• مخفر

معلومات متفرقة

• يوضع على الجلد الذي يغطي مفصلاً ملتهباً للتخفيف من الاحتياج.

• لم تدرس تأثيرات هذه النبتة كثيراً بعد.

• يجب حمل النبتة بحذر تفادياً لتسمم الجلد.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يساعد في التخفيف من الحرارة.

• قد يخفف الصداع

• قد ينظم دورة الطمث

• قد يدفع إلى التقيؤ.

• قد يعالج الجروح والرضوض عند استخدامه خارجياً.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، الممادّن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة.
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة

العنبة Blueberry

• يعالج الإسهال.
التأثيرات الإضافية
المحتملة

• قد يعالج القرحة.
• قد يعالج التهاب المعدة والأمعاء.
• قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
• قد يعالج نزف اللثة ويحول دونه.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:
كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
إستشر الطبيب في حال:
• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Vaccinium (توجد عدة أنواع)

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

• الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• أحماض دهنية

• Hydroquinone

• Loeanolic acid

• Neomyrtillin

• حمض التانيك

• حمض Ursolic

التأثيرات المعروفة

• يخفض مستوى السكر في الدم.
• يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا
تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مهنياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع
حفظ المنتج:

• يحب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.

• يحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تخيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معنل رسمي لدرجة
سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

العشبة الخلية (Boneset) (Ague Weed, Richweed, White Snakeroot)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Eupatorium perfoliatum, *E. rugosum*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• البتلات/الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• أحماض دهنية

• *Eupatorin*

• راتنج

• سكر

• *Tremetone*

• زيوت متطايرة

• شمع

التأثيرات المعروفة

• قد يسبب "دوار الحليب" عند البشر، وهو مرض يمتاز
بالتقيؤ والارتجاف والألم الحاد في البطن نتيجة
تناول مشتقات الحليب أو لحوم الأبقار أو الأغنام
المسممة بهذه العشبة.

• يسبب التقيؤ

معلومات متفرقة

يتراكم الترميتون Tremetone ببطء في الأجسام
الحيوانية وقد يسبب أعراض تسمم. ويحدث الشيء
نفسه في الأجسام البشرية أيضاً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفض مستوى السكر في الدم.

• قد يعالج الملاريا.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن أي معدل رسمي لدرجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
- التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة**

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صعوبات في التنفس.	أطلب الإسعاف.
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
لحاح سائل.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ارتجاف العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تصلب	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
وهن	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

- قد يعالج الحمى.
- قد يعالج الزكام والانفلونزا والسعال.
- قد يقاوم الالتهاب.
- قد يعالج التهاب المفاصل.

توقف: ملاحظات

وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الصعي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
 - إستشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمدوامة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
 - الحمل
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
 - الإرضاع
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
 - الأطفال والأولاد
 - يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
 - معلومات أخرى:
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
 - حفظ المنتج.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Barosma betulina*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• الكافور

• Dlosmine

• Hesperidin

• Isomenthone

• هلام نباتي

• راتنج

• زيوت متطايرة



التأثيرات المعروفة

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• يعمل بمثابة مطهر بولي.

• يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج احتياج المثانة.

• قد يعالج احتياج الإحليل البولي.

• قد يعالج الانتفاخ المرتبط بتناذر ما قبل الطمث.

• قد يدر البول.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الاسم التجاري Buckthorn

التأثيرات الإضافية المحتملة

قد يلين الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصفي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التنشجي.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Rhamnus cathartica

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Anthraquinone

• Emodin

التأثيرات المعروفة

- احتياج المعدة والأمعاء وقد يقضي إلى براز سائل ومضطرب.
- يستخدم لمعالجة الإمساك القصير الأمد.
- معلومات متفرقة
- يتم صنع عدة صبغات من عصير هذه الثمار.
- قد يصاب الأولاد بأعراض التسمم بعد تناول 20 ثمرة تقريباً.
- يتم صنع الشراب المركّز من الثمار.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راحع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال حاد وشديد	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال عنيف.	أطلب الإسعاف في حال العجز عن السيطرة عليه. أطلب الإسعاف.
ضرر في الكلية	
يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في الالتهاب والقدمين.	
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنجات في المعدة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.
- لا تستخدمه بالتزامن مع مليّنات أخرى.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

الأرقيطون (Burdock (Edible Burdock, Great Burdock, Lappa

- Arctiin
- Inulin
- حمض التانيك
- الفيتامينات B و E
- زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Arctium lappa*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الجذور

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

التأثيرات المعروفة

ينشط جهاز المناعة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج مشاكل الجلد.
- قد يعالج داء النقرس.
- قد يخفف من التهابات المجاري البولية.
- قد يعالج التهابات الفطرية والجرثومية
- قد يعالج التهاب المفاصل والروماتيزم

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف ومبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
توسع البؤبؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
جفاف الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان
هلوسات	أطلب الإسعاف.
انزعاج في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدى طويل لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه

الأطفال والأولاد

- قد يعالج نوبات التشنج.
- قد يعالج الصرع.
- قد يعالج نوبات الهستيريا.
- قد يعالج الجنون.
- قد يعالج طفيليات الأمعاء.
- قد يحسّن الشهوة الجنسية.
- قد يخفف من الحمى.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

يستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

معلومات أساسية

يطلق أيضاً على جذر الـ *Calamus* اسم الجذر الحلو، أو جذر الجرد، أو الراية الحلوة، أو القصب الحلوة، أو الأقويون. الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Acorus calamus*. الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية: الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

Asarone •

Beta-asarone •

Camphene •

Caryophyllene •

Eugenol •

Pinene •

زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

• يقمع الجهاز العصبي المركزي

• يسبب الهلوسات.

معلومات متفرقة

• يستخدم جذر الـ *Calamus* أساساً في الهند لمعالجة عدة أمراض

• أدى الزيت العطري المستخرج من الجذور إلى مرض السرطان عند الجرذان. لذا، منعت وزارة الصحة الأميركية استعمال شتى أنواع هذه النبتة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الربو.

• قد يعالج السعال

• قد يعالج سوء الهضم.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
هلوسات	أطلب الإسعاف.

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الخلافة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

خشخاش كاليفورنيا California Poppy

مخدرة، مثل المورفين أو الكودين. فنبته الخشخاش لها خصائص مختلفة عن هذه النبتة.

التأثيرات الإضافية المحتملة

يستخدمه المدمنون على المخدرات للحصول على تأثيرات مسكنة أو معدلة للمزاج.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Eschscholzia californica

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

كامل النبتة باستثناء الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Coptisine
- Sanguinarine

التأثيرات المعروفة

- تأثير مخدر خفيف.
- يزيد من إفراز العرق.
- يقيم الجهاز العصبي المركزي
- معلومات متفرقة
- لا يحتوي خشخاش كاليفورنيا على أية مشتقات

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة:
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تغير في سرعة خفقان القلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

الكراويا Caraway

- أحماض دهنية
- بروتينات

التأثيرات المعروفة

- معطر
- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- معلومات متفرقة
- يستخدم الكراويا بمثابة منكه عند خبز الأطعمة.
- يستخدم زيت لصنع البوظة.
- ما من تأثيرات متوقعة في الجسم. سواء جيدة أو سيئة، عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة جداً

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Carum carvi
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• أوكسالات الكلسيوم

• Carveol

• Carvone (زيت متطاير)

• Dihydrocarvone

لتعزيز نكهة الطعام

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من الانتفاخ عند الأطفال الرضع.
- قد يعالج تشنجات البطن.
- قد يعالج الغثيان.
- قد يعالج داء الجرب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل الفشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

دون السنقتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفهزان من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

بالجرعات الكبيرة فقط

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إحباط الجهاز العصبي أطلب الإسعاف.

المركزي.

غثيان أو تقيؤ. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولسي حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Ellettana cardamomum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• زيت مثبّت

• صمغ

• ليمونين

• نشاء

• Terpene alcohol

• Terpinene

• زيوت متطايرة

• تلوين أصفر

التأثيرات المعروفة

• يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

• يسبب إسهالاً عفيفاً مع الكثير من الغازات.

معلومات متفرقة

يضيفي النكهة إلى الأطعمة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج التهاب الشعب.

• قد يعالج سلس البول.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الكتلة Catalpa

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص الشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Catalpa bignonioides

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة. المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Catalpin

● Catalposide

التأثيرات المعروفة

احتياج المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يعالج الربو.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة




العلامات والأعراض	ما يجب فعله
جلد بارد ورطب.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انخفاض سريع في ضغط الدم. وتشمل أعراض ذلك الإغماء والشحوب والنهض السريع.	أطلب الإسعاف.
نبض سريع وضعيف.	أطلب الإسعاف.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية



لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات للعكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الشاد الأسود Catechu, Black

التأثيرات الإضافية المحتملة



- قد يخفف من النزف الدموي غير الاعتيادي.
- قد يعالج الإسهال المزمن.
- يستعمل لفرغة الحنجرة المتقرحة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Acacia catechu*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
• حمض الثانيك.

التأثيرات المعروفة



- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، العكالات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة. الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرد في الكلى	أطلب الإسعاف.
يتجلى في ظهور دم في البول، وتضائل	
دفق البول وورم في اليدين والقدمين.	
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو الفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً، خصوصاً بالنسبة للأطفال والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع) Catha edulis
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Cathidine

• Cathine

• Cathinone

• Celastrin

• Choline

• Katine

• حمض القانيك

التأثيرات المعروفة

• ينشط الدماغ والجل الشوكي عبر نقاط الاشتباك.

• يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

قد يفضي إلى عادة معينة. فالمدمنون عليه قد يكترون من الكلام فيما هم مصابون بالإحباط واللامبالاة

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج التعب عند مضغ أوراقه أو نقعه لإعداد شاي

• قد يقمع الشهية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

بالطبيب عند الإمكان.
شعور بالنشاط والخفة. توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.
ارتفاع ضغط الدم. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.
تزايد خفقان القلب. أطلب الإسعاف.
شلل. أطلب الإسعاف.
احتياج في المعدة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً
مع نرف. بالطبيب.

جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض ما يجب فعله
صعوبات في التنفس. أطلب الإسعاف.
إحباط. توقف عن تناوله. إتصل

النعناع البري (Catnip, Catmint, Catnep)

• يؤثر في الجهاز العصبي المركزي.
• يخفف من التشنجات في الهيكل العظمي أو العضلات.

• يخفف من عسر الهضم.

معلومات متفرقة

ليس النعناع البري عقاراً مسبباً للنشاط والخفة، رغم أن عدة تقارير تشير إلى العكس.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يزيد من إفراز العرق للتخفيف من الحمى عند نقع أوراقه.
• قد يعالج المغص عند شَمُّ أوراقه.
• قد يعالج الأرق.
• قد يعالج الزكام والانفلونزا.
• قد يخفف من احتقان الالتهاب الشعبي.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Nepeta cataria*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض أستيك

• حمض بوتريك

• Citral

• Dipentene

• Lifronella

• Limonene

• Nepetalic acid

• حمض التانيك

• Terpene

• حمض فلريك

• زيوت متطايرة

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

التأثيرات المعروفة



إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر ماعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تغطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتغلى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

الاحتياج في المعدة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الكرشنتل Celery Fruit (Celery)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Apium graveolens.

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• العصير

• الجذور

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• D-limonene

• نيترات

• راتنج

• Sedanoic anhydrides

• Sedanolide

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من التشنجات في الهيكل العظمي أو العضلات.
- يسبب انقباضات في الرحم، سواء كانت المرأة

حاملًا أو لا.

- يخفف من ضغط الدم عند تناوله في شكل عصير
- يخفف من الغازات في المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

- ما من تأثيرات متوقعة على الجسم، سواء جيدة أو سيئة، عند استخدام هذه العشبة بكميات صغيرة جداً لتحسين نكهة الطعام أو عند تناولها لوحدها.
- قد يصاب العاملون في حقول الكرفس بطفح جلدي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يقاوم التأكد (بذوره)
- قد يسكن الألم.
- قد يعالج تشنجات الدورة الشهرية.
- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يحسن الشهوة الجنسية (الجدور).

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل.

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، كجزء من الغذاء المتوازن. لا تشري كميات كبيرة من عصير الكرفس.

الإرضاع

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية من الكرفس ضمن غذاء متوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب

المشاكل.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
سكون عميق	أطلب الإسعاف.
(بكميات كبيرة).	
مخاض مبكر	أطلب الإسعاف.

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Centaureum erythraea, C. umbellatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- البتلات/الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Amarogentin

- Erytaurin

- Erythrocentaurin

- Gentiopicroin

- Gentisin

التأثيرات المعروفة

- يخفف من عسر الهضم.

- قد يحسن الشهية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



فقط عند تناول كميات كبيرة أو في حال الجرعة المفرطة العرضية.

العلامات والأعراض ما يجب فعله
غثيان أو تقيؤ. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الروادد الصيني Chinese Rhubarb (Canton Rhubarb)

التأثيرات الإضافية المحتملة



ما من تأثيرات إضافية معروفة

توقف: ملاحظات وتحذيرات




لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.
- استشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر ماعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Rheum officinalis, R. palmatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الجذور
- الجذور المجفف
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- Aloe-emodin
- Anthraquinone
- Chrysophanol
- Emodin
- حمض التانوك

التأثيرات المعروفة



• امتياج الغشاء المخاطي للأمعاء.

• يسهل المعدة بشدة.

معلومات متفرقة

لا نتحدث هنا عن الروادد الذي ينمو في الحدائق.

الحمل.

تجنبي تناول هذه العشبة بإفراط.

الإرضاع

تجنبي تناول هذه العشبة بإفراط.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

• ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيبت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

• لا يوصى باستعمال هذه العشبة بشكل متواتر، إذ تتوافر أعشاب أخرى مسهّلة أقل قوة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

يعتبر آمناً نسبياً عند تناوله بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة**

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تشنج وألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال (سائل جداً مع غازات).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

جوز الهند Coconut**Tristearin •****التأثيرات المعروفة**

- يحول دون إفراز السوائل.
- يحقق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً

معلومات متفرقة

- يستخدم جوز الهند لصنع الصابون، ومراهم اليدين وفروة الرأس وبعض الأطعمة.
- إن أنواع الصابون المرتكزة على جوز الهند مفيدة لأغراض بحرية لأنها لا تنفصل بسهولة بفعل مياه البحر أو المخلوط المالح.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Cocos nucifera*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• زيت من البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• زيت مثبت

• حمض التانيك

• Trilaurin

• Trimyrustin

• Triolein

• Tripalmitic acid

• Tripalmitin

التأثيرات الإضافية المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه النبتة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض

إسهال
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

ما يجب فعله

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال

المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون القرّحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، كحزء من الغداء المتوازن ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الإرضاع

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية من جوز الهند ضمن غذاء متوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

تشنج الثعلبان الأزرق (Cohosh, Blue (Papoose Root, Squaw Root)

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

لا تستخدمه لوحده مهما كان السبب. فقد يسبب أعراض سامة.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفسدان من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً، خصوصاً بالنسبة للأطفال والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Caulophyllum thalictroides

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Coulosaponin

● Leontin

● Methycystine

التأثيرات المعروفة

- يحفز انقباض العضلات الطرية (الأوعية الدموية والعضلات الصغيرة المحيطة ببعض الشرايين والياف العضلات في الرحم).
- يرفع ضغط الدم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج مشاكل دورة الطمث.
- قد يحفز تقلصات الرحم أثناء المخاض.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
احتياج في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
مع نزف محتمل.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عطش	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضعف	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ألم في الصدر.	أطلب الإسعاف.
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
توسع البؤبؤ في العين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

جذر الثعبان الأبيض Cohosh, White

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستهلك الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Actaea alba, A. arguta

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• غلوكوسيد

• Protoanemonin

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



احتياج الأغذية المخاطية.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يخفف قليلاً من القلق.

• قد يساعد في استهلال دورة الطمث.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لأعراض التسمم: راجع فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال (أحياناً)	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ممزوج بالدم).	أطلب الإسعاف.
نوبات هلوسة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي أو	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
اهتياج في العين،	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
في حال استخدامه	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
على الجلد أو في العين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

ما دون السنتين.

معلومات أخرى

هذا المنتج لن يساعدك وقد يسبب لك أعراض تسمم.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية



لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

تشيشة السعال (Coltsfoot (Coughwort, Horse-hoof)

ما من تأثيرات طبية معروفة.

معلومات متفرقة

- تبين أنه له خصائص مسببة للسرطان.
- متوافر في شكل صيغة أو كبسولة أو لحاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

استعمال داخلي

قد يخفف من السعال الدائم نتيجة الالتهاب الشعبي أو الحساسية.

استعمال خارجي

قد يخفف من مختلف المشاكل الجلدية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Tussilago farfara*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الثمار/الفاكهة

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• كاتشوك

• Pectin

• راتنج

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه الببتة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات صغيرة لفترات قصيرة من الوقت. لكن تراكُمها في الجسم قد يسبب أوراماً خبيثة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
حمى.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمددوات مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

الصنوبر الشيطاني (Cottonwood (Balm of Gilead

ساليين

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Populus deltoides, P.candicans

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

التأثيرات المعروفة

● مقاوم للالتهاب.

● يخفف من الألم.

● يخفف من الحمى.

معلومات متفرقة

دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
الغيبوبة.	أطلب الإسعاف.
الارتباك.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نوبات التشنج.	أطلب الإسعاف.

لمعالجة عدة مشاكل.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من ألم الأسنان.
- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج أمراض القلب.
- قد يعالج أي مرض مصحوب بحمى أو ألم أو التهاب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

الحجيل (Couch Grass (Dog Grass, Triticum)

• قد يعالج التهاب المفاصل.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Agropyrum repens

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• دكستروز

• صمغ

• إينوزيت

• حمض لينبي

• Levulose

• Mannite

• Silica

• Vannilin

التأثيرات المعروفة

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• قد تسبب هذه العشبة تقلصاً في الأوعية الدموية وتشنجاً في عضلات الرحم في حال كانت ملوثة بالأرغوت.

معلومات متفرقة

تكون هذه النبتة ملوثة غالباً بفطر سام يحتوي على الأرغوت، لذا، يجب التخلص من أية عشبة لها غلاف أسود.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحمي الأنسجة المكشوفة.

• قد يغذي الجسم.

• قد يعالج التهابات المثانة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

فقط إذا كان ملوثاً بالأرغوت.

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة.	أطلب الإسعاف.
إسهال.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان
نبض سريع وضعيف.	أطلب الإسعاف.
وخز وحكاك.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عطش مستمر.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

حذر البقر الأبيض (Hogweed, Keck) Cow Parsnip

- يلمع الجهاز العصبي المركزي.
- يخفف من تشنجات العضلات الطرية أو عضلات الهيكل العظمي.
- معلومات منفردة
- قد تهدد الذبذبة فهما لا تزال صغيرة مثل الشوكران السام

التأثيرات الإضافية المحتملة

قد تخفف الفاكهة والأوراق من الألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Heracleum lanatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الفاكهة
- الأوراق
- الجذور
- الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.

تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:
المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع:
المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد:
يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:
ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا

نبذة التاريخ (Cranesbill (Crowfoot)

- سكر
- حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

- يسبب التجاعيد.
- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

- يستخدم بمثابة غسول للحم وتفرغ به الحنجرة المتقرحة.
- يستخدم في الأقحاح لقتل الخنافس اليابانية لأنها

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Geranium maculatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الأوراق
- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- مواد ملونة
- حمض غاليك
- صمغ
- Pectin
- نشاء

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في ظهور دم في البول، وتضائل	
دفق البول، وورم في	
اليدين والقدمين.	
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

تنجذب إلى هذه النبتة.

• يستخدم بمثابة كمادة.

• يستخدم أحياناً لوضع الأدوية على الجسم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يزيد من تخثر الدم.
- قد يسبب انقباض الأنسجة الحية.
- قد يخفف من نزف الأنف.
- قد يعالج النزف في المعدة والقم والأمعاء.
- قد يعالج الإسهال.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

تعبئة الحبوب (Cubeb (Java Pepper, Tailed Pepper

توقف

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصلي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطعولة ولا تزال تحت عمر 45، وتسح حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

معلومات أساسية

الاسم الأحياي (الجنس والنوع): Piper cubeba

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Cubebic acid

• Cubebin

• زيت مثبت

• صمغ

• رائنج

• Sesquiterpene alcohol

• Terpenes

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

قد يتسبب حمض كوكبيك باهتياج المثانة والإحليل والحالب.

معلومات متفرقة

المواد الكيميائية النشطة موجودة في الفاكهة النامية بالكامل وإنما غير الناضجة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول
- قد يطهر المجاري البولية.
- قد يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
غثيان أو تقيؤ توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب

- احفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

البلسان (Elder) Elderberry

- زيوت متطايرة
- شمع

التأثيرات المعروفة

- يتسبب باحتياج المعدة والأمعاء ويعمل بمثابة ملين ومطهر.
- يسبب التقيؤ أحياناً.
- معلومات متفرقة

تحتوي الجذوع على السيانيد وقد تكون سامة جداً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد في معالجة الصداع
- قد يساعد في معالجة التهاب المفاصل.
- قد يعالج داء النقرس.
- قد يعالج الزكام المادي.
- قد يعالج الحمى.
- قد يعالج الحنجرة المتقرحة.
- قد يخفف من انزعاج تشنجات الدورة الشهرية.
- قد يحسن شفاء الرضوض والوثء عند استعماله بمثابة كمادة
- قد يعالج الاحتياجات الجلدية.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Sambucus nigra*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- اللحاء
- الثمار/الفاكهة
- اللحاء الداخلي
- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة
- Albumin
- Cyanide
- Hydrocyanic acid
- راتنج
- روتين
- Sambucine
- Sambunigrin (موجود في الجذع. وهو يتفكك إلى سيانيد)
- حمض التانيك
- تيروسين
- حمض فيبوريك
- فيتامين C

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العتبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التحذيرات السمية

- يعتبر اللسان خطراً قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.
- البذور النينة سامة.
- قد تسبب الجذور والجذوع والأوراق تسمماً بالسليانيد.
- أعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
- التفاعلات العكسية أو
- التأثيرات الجانبية أو أعراض
- الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تتوین الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- استشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العتبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- الإرضاع.
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- الأطفال والأولاد.
- يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى.
- قد تكون الثمار الناضجة غير سامة. لكن ينصح بتناولها بعد طهيها جيداً.
- إحذر الجذوع لأن السليانيد فيها قد يكون قاتلاً.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Foeniculum vulgare

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

• الجذور

• الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Anethole

• زيت مثبّت

• زيوت متطايرة



التأثيرات المعروفة

• يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

• يحفز التنفس.

• يزيد من حموضة المعدة.

• يعالج سوء الهضم.

• يساعد في معالجة الزكام الشائع.

• يعالج السعال.

• يعالج المغص.

معلومات متفرقة

• يستخدم بمثابة منكه.

• متوافر في شكل لحاء جاف وزيت وصفة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يعالج الإسهال.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الأمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

السمية

يعتبر الشمار آمناً عند تناوله بكميات معقولة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

العلامات والأعراض

ما يجب فعله

إن الزيت المستخرج

من الشمار قد يسبب

قصور القلب الاحتقاني.

غثيان أو تقيؤ

توقف عن تناوله.

إتصل فوراً بالطبيب

توقف عن تناوله. إتصل

بالطبيب عند الإمكان.

أطلب الإسعاف.

نوبات مرَضِيّة.

الحلبة Fenugreek

التأثيرات المعروفة

• يزيد من الحموضة في المعدة

• يخفف من تقرّح الحنجرة

معلومات متفرقة

• تمتاز الحلبة برائحتها الكريهة وطعمها المرّ.

• يصفها البيطريون غالباً لمداداة الأحصنة

• إنها متوافرة في شكل بذور كبيرة وكبسولات

وصيغات.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد تليّن المعدة.

• قد تحمي الأنسجة المكشوفة.

• قد تخفف من ألم التهاب المفاصل.

• قد تزيد من إنتاج الحليب.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Trigonella foenumgraecum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• كولين

• زيت مثبّت

• حديد

• لستين

• هلام نباتي

• فوسفات

• بروتين

• Trigonelline

• Trimethylamine

• زيوت متطايرة

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تتوین الحمل في المستقبل القريب

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة عند تناولها بكميات معقولة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

رأس الأفعى (Fritillaria (Bei Mu, Snake's Head)

(يمكن تشبيه Peimine و Peiminine بهرمونات الستيرويد)

التأثيرات المعروفة

● قد يخفف ضغط الدم.

● قد يخفض مستوى السكر في الدم.

معلومات متفرقة

تعتاز الجذور وحدها بخصائص طبية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يؤثر في النظام الكهربائي للقلب بسبب Peimine و Peiminine

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Fritillaria verticillata, F. meleagns

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Fritimine

● Fritilline

● Peimine

● Peiminine

● Verticilline

● Verticine

تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في حرارة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية من درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
انسداد في القلب	أطلب الإسعاف.
يتجلى في تباطؤ	
خفقان القلب (أقل من 50).	
عدم انتظام في خفقان القلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

- قد يخفف من الحمى.
- قد يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- قد يزيد من تدفق الحليب لدى الأم المرضعة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو ثنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلسومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا

لا تتناوله في حال:

● كنتِ حاملاً أو تظنون أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفص التشنجي

استشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمدّاداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنتِ تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطئ الجرعة الموصى بها من قبل الصانع

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Alpinia galanga, A. officinarum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Cineole

● Galangin

● Galangol

● Kaempferid

● راتنج

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

يعمل التأثير المقاوم للجراثيم على معارضة جراثيم البكتيريا.

معلومات متفرقة

● إنه مرتبط بالزنجبيل من الناحية النباتية والصيدلانية.

● استخدمه قدامى الإغريق والعرب.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

● قد يعالج العجز الجنسي

● قد يخفف من البلغم الناجم عن الحساسية.

● قد يعالج ألم الأسنان واللثة.

● قد ينشط التنفس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة.
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

جاليجا (European Goat Rue) Galega

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:
كنت حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تنوين العمل في المستقبل القريب.
إستشر الطبيب في حال:
• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Galega officinalis
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- مرّيات
- Galegine
- حمض التانيك

التأثيرات المعروفة



- يخفض مستوى السكر في الدم.
- يعميق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

تصدر هذه النبتة رائحة كريهة عند سحقها

التأثيرات الإضافية



- قد يعالج داء السكري.
- يزيد من تدفق الحليب عند الأم المرضعة.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عصبية	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ضعف	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيئ الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وإستحسناً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

جامبيلر (Gambier, Pale Catechu)

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يخفف من النزف غير الاعتيادي.
- قد يعالج الإسهال المزمن.
- قد يعالج تقرح الحنجرة عند استعماله للفرغرة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Uncaria gambir*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الأوراق
- الأماليد

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Catechin
- Catechu-tannic acid
- حمض الشانويك

التأثيرات المعروفة

- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن عند تناوله داخلياً.

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، الكمكولات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

الجنطيانا (Yellow Gentian)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Gentiana lutea*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Gentiamarin

• Gentiin

• Gentiopicroin

• Gentsin

• سكر

• خضاب Xanthone

التأثيرات المعروفة

• يسبب احتياج الأغشية المخاطية.

• يقتل جرثومة الملاريا.

معلومات متفرقة

إنه يستخدم منذ العصور القديمة في اليونان.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يزيد من انقباضات عضلات المعدة.

• قد يحفز الإفرازات المعوية.

• قد يحسن الشهية عند استعماله بمثابة منشط

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض

غثيان أو تقيؤ
ما يجب فعله
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

• قد يساعد في الهضم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون القرحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الجموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداءة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع بمبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف ومبارد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Matricaria chamomilla

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- البتلات/ الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Alphabissabolol

Azulene

حمض دهني

Furfural

Paraffin hydrocarbons

Sesquiterpene

Sesquiterpene alcohol

حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

- مقاوم للالتهاب.

- يضعف العضلات.

- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

- يستخدم صانعو البوظة والساكر كميات غير سامة من هذه النبتة لإضافة النكهة.

- يستخدم أيضاً بمثابة منشط

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- يخفف من التشنجات في العضلات الطرية أو الهيكل العظمي.

- يستخدم بمثابة منشط

- ربما يسكن الألم.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
سكون مفرط.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح في الجلد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية



تعتبر هذه النبتة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

باثوتيلة الصلب Grape Hyacinth

من خلال زيادة إنتاج البول.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناولوه في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

معلومات أساسية



- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
- Muscari racemosum, M. comosum
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.
- البصلة
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- حمص كوميسيك
- سابونين

التأثيرات المعروفة



امتياج المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

- قد يعالج الإمساك.
- قد ينشط الجهاز العصبي المركزي
- قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى

ما من دليل على أية فائدة علاجية له. لا تستخدمه.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثيان أو تقيؤ توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

عشبة الصمغ (Grindelia (Gunweed, Rosinweed

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Grindelia camporum, G. squarrosa

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• راتنج بلسمي

• Grndelol

• Robustic acid

• Saponins

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يقمع الجهاز العصبي المركزي (بكميات كبيرة)

• يوسع بؤبؤ العينين.

• يبطل خفقان القلب.

• يرفع ضغط الدم.

• يعميق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند

تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

يستخدم في الكمادات لوضع الأدوية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري

الشعبية ويزيد من سيولته.

● ربما يسكن الألم.

● قد يعالج داء الريو.

● قد يعالج التهاب الشعبوي.

● قد يلطف الحروق ويشفيها عند استعماله موضعياً.

● قد يعالج التهاب المهبل.

حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● يحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة

والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمدوامة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

ضرر في الكلية أطلب الإسعاف.

يتجلى في وجود دم

في البول، وتضائل

تدفق البول وورم

في اليدين والقدمين



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Guaiacum officinale, G. sanctum
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الجذوع
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- حمض الفويق
- Guaiaretic acid
- راتنج
- صابونين
- فانيلين



التأثيرات المعروفة

- احتياج المعدة والأمعاء.
- يزيد من إفراز العرق.
- يختبر لأكسدة الأنزيمات بهدف كشف الدم في البراز أو البول.
- معلومات متفرقة
- عند إضافته إلى نموذج من البراز، يحدد بيروكسيد الهيدروجين والفويق وجود الدم أو غيابه. وهذا الاختبار مفيد لكشف المشاكل الحميدة والخبيثة في المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج داء الملك.
- قد يعالج الإمساك
- قد يخفف من تورم اليدين والقدمين.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل
- المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.
- الإرضاع
- المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى
- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخيطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع بمهنيّات بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
- حفظ المنتج.
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.

- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الفيجن البري Harmel

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يقضي على ديدان الأمعاء
- قد يخفف من الألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو ثنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر ماعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Peganum harmala
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- أجزاء متنوعة من النبات تختلف حسب البلد والثقافة.
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Harmaline ●
- Harmalol ●
- Harmine ●
- Peganine ●

التأثيرات المعروفة

- يسبب الهلوسة.
- يقضي على البكتيريا أو يقمع نموها وتوالدها.
- معلومات متفرقة
- يساء غالباً استعمال الفيجن البري حيث يزرع في أريزونا، نيو مكسيكو وتكساس.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تفسدان من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه الذبقة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
هلوسات	أطلب الإسعاف.
ضعف في العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

النبات المستعمل Heliotrope (Turnsole)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Heliotropium europaeum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- عصير
- أوراق
- بذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

Heliotrine

Lasiocarpine

التأثيرات الإضافية

المحتملة

يمكن للأوراق والعصير أن يعالجا القرحة والثآليل والأورام.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدد طويلة لمشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

التأثيرات المعروفة

- يقضي على خلايا الكبد
- يحفز إنتاج الصفراء.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
البرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الركام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

الشربق Hellebore (American Hellebore, Green Hellebore)

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Veratrum viride*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

• الجذر

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Germidine

• Germitrine

• Jervine

• Pseudojervine

• Rubijervine

• *Veratrum alkaloids*

التأثيرات المعروفة

• يخفض ضغط الدم.

• يخفض خفقان القلب.

• يقمع الجهاز العصبي المركزي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج ضغط الدم المرتفع.

• قد يعالج تسمم الدم خلال الحمل.

• قد يحتاج جهاز المعدة والأمعاء

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
إحساس بالحرق في الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انخفاض سريع في ضغط الدم يتجلى في شكل إغماء وعرق بارد وشحوب ونبض سريع.	أطلب الإسعاف.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الممى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لمدى مدة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل
- المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.
- الإرضاع
- المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى
- قد تكون كل أجزاء هذه النبتة سامة.
- حفظ المنتج.
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

الصولجان السحري (Helonias (Fairy Wand, False Unicorn Root)

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطعولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

معلومات أساسية

الاسم الأحباتي (الجنس والنوع)

Chamaelirium luteum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Chamaellirin

• سابونين

التأثيرات المعروفة

• يهيج المعدة والأمعاء.

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• يسبب التجاعيد.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحول دون الإجهاد.

• قد يعالج أعراض سن اليأس

• قد يزيد من الشهية.

• ربما يلين المعدة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البيلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

النبات Henbane (Hyoscyamus)

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السعال الديكي.
- قد يعالج داء الريو.
- قد يسكن الألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
 - كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الصفي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.
 - استشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Hyoscyamus niger

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الثمار/الفاكهة
- الأوراق
- الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Hyoscyamine
- Scopolamine

التأثيرات المعروفة

يصد تأثيرات الجهاز العصبي نظير الوذّي، مما يؤدي إلى تسارع خفقان القلب، توسع البؤبؤين، جفاف الفم، نوبات هلوسة، احتباس البول، تقلص انقباضات المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

- البنيج هو نبتة سامة، خصوصاً للأولاد.
- إنه يستخدم بمثابة غسول للفم ومخمد للألم.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
هذهيان	أطلب الإسعاف.
هلوسة	أطلب الإسعاف.
خفقان سريع للقلب.	أطلب الإسعاف.

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى
الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدميه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون الستين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا
تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

Hop, Common الجبل

معلومات متفرقة

- تكشف الثمار عن رائحة كريهة في حال لم تكن
طازجة.
- إنه يؤخذ رائحة بسبب تبخره في حرارة الغرفة
العادية

التأثيرات الإضافية المحتملة

قد ينشط الجسم.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Humulus lupulus*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
الثمار/الفاكهة
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Humulene

● Lupulinic acid

● Lupulone

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كن حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

التأثيرات المعروفة

يقمع نمو الجراثيم وتكاثرها.

المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المعكملت وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية


تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات صغيرة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض

ما يجب فعله

إسهال

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالبطبيب.

احتياج المعدة.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالبطبيب.

الخراسيون Horehound



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Marrubium vulgare

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● الأزهار

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Marrublin ●

● رائحة

● حمض التانيك

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

● يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

● يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري

الشعبية ويزيد من سيولته.

معلومات متفرقة

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الفلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

- تستخدم الأوراق والأزهار لإعداد الصيغات.
- إنه متوافر أيضاً في شكل شاي وأقراص.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السعال والزكام.
- قد يعالج السعال الديكي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Aesculus hippocastanum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● اللحاء

● الأوراق

● البذور/الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Aescin

● Coumarins

● Flavonoids

● Saponin

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الممى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداراة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



التأثيرات المعروفة

● يزيد من وقت النزف (فحص مخبري لتخثر الدم).

● يهيج الفشاء المخاطي.

● يقلّص من ورم اليدين والقدمين.

● يزيد من عودة الدم إلى القلب.

● مدرّ للبول.

معلومات متفرقة

● هناك أدوية أخرى أكثر أماناً لمقاومة تخثر الدم.

فتناول بضع حبوب من هذه النبتة قد يسبب التسمم

● يحمل بعض الأشخاص المعتقدون بالخرافات

القليل من حبوب هذه النبتة في جيوبهم لشفاء التهاب

المفاصل.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يقاوم تخثر الدم.

● قد يحجب الشمس (محلول بنسبة 4 في المئة).

● قد يساعد في معالجة الدوالي

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
امتياح في المعدة والأعضاء.	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.
فقدان التركيز.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نزف غير اعتيادي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

لعلاج الحصان Horsemint

التأثيرات الإضافية المحتملة

- استعمال داخلي
- قد يقتل طفيليات الأمعاء.
- قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- قد يعالج تشنجات المعدة.
- قد يعالج الغثيان.
- استعمال خارجي
- قد يقتل الالتهابات الفطرية في الجلد.
- قد يقتل الالتهابات الجرثومية في الجلد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تدوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Monarda punctata

أجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الأوراق
- الحذور

مواد الكيمائية الموجودة في هذه العشبة:

- Carvacrol
- Cymene
- D-limonene
- Linalool
- Monarda oil
- Thymol

التأثيرات المعروفة

- امتياح الأنسجة والأغشية المخاطية.
- يقتل الجراثيم عند استعماله على الجلد لعداوة الالتهابات الخارجية.

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طيبة لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي عند استعماله على الجلد.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

إن تناول كميات كبيرة من الجذور النيئة قد يسبب القسم

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Armoracia lapathifolia, Cochlearia armoracia

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Allyl isothiocyanate

• Sinigrin

التأثيرات المعروفة



استعمال خارجي

• امتياح الجلد.

• يساعد في التخلص من التهاب الجيوب الأنفية.

استعمال داخلي

• يستخدم الجرجار لإضافة النكهة إلى الأطعمة.

• ما من تأثيرات متوقعة في الجسم، سواء جيدة أو

سيئة، عند استعمال هذه العشبة بكميات صغيرة جداً

لتحسين نكهة الطعام.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد

البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال، مع دم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تقيؤ، مع دم.	أطلب الإسعاف.

الكلبائ (Horsetails (Bottle Brush, Shave Grass

- قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- قد يساعد في شفاء القروح في الجلد.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Equisetum arvense

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

الجنود

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Alkaloids ●

Flavonoids ●

Phenolic acids ●

Silicic acid ●

Silicates ●

Sterols ●

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

التأثيرات المعروفة

ما من تأثيرات طبية معروفة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهابات المثانة.
- قد يعالج التهاب البروستات.

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
برودة في اليدين والقدمين.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
حمى	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عدم انتظام في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.
ضعف في العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
صعوبة في المشي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
فقدان الوزن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الحمل:

خطر. لا تستخدميه.

الإرضاع

خطر. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً من الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

التكرات الطللي Houseleek (Jupiter's Eye, Thor's Beard)

التأثيرات المعروفة

- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Sempervivum tectorum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

الأوراق

المواد الكيميائية الموحدة في هذه العشبة

- حمض ماليك

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطعونة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. **حفظ المنتج:**

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال، مع الكثير من الغازات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

• قد يعالج لدغات الحشرات والحروق والرضوض وأمراض الجلد عند استخدامه بمثابة كمادة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تتوین الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Gaylussacia baccata

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

كامل النبات

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• أحماض دهنية

• Hydroquinone

• Loeanolic acid

• Neomyrtillin

• حمض الثانيك

• حمض أورسوليك



التأثيرات المعروفة

• يخفض مستوى السكر في الدم.

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الإسهال.

• قد يعالج التهاب المعدة والأمعاء.

• قد يعالج داء الأسقريوط ويحول دونه.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

كان لديك حساسية للعنبية.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، كجزء من الغذاء المتوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الإرضاع

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتمادية منه ضمن غذاء متوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع موهبياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النخبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات معقولة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

Hydrangea (Paegee, Seven Barks) الشوولسة

العقل قليلاً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهاب المثانة.
- قد يعالج الحصى في المثانة.
- قد يعالج سوء الهضم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Hydrangea paniculata

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- أحماض دهنية
- Hydrangine (يمكن أن يتحول إلى سيانيد)
- راتنج
- صابونين
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.
- يقلص الأنسجة
- يحول دون إفراز السوائل.
- معلومات متفرقة
- تحتوي أوراقه على السيانيد
- قد يؤدي تدخين هذه العشبة إلى التسمم وتخدير

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة عموماً عند تناولها بكميات معقولة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو للتأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
شعور بثقل في الصدر	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

القراصن الحلدي Indian Nettle

التأثيرات المعروفة

- امتياح بطانة المعدة.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.

بسبب التقيؤ.

معلومات متفرقة

- إن مكوناته الأساسية شبيهة بمكونات عرق الذهب.
- يستخدم بمثابة غسول للفم وفي الكمادات.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد ينشط حركة الأمعاء.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Acalypha indica, A. virginica

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

الأوراق

العواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● *Acalyphine*

● *Cyanogenic glycoside*

● *Inositol methylether*

● *Triacetomamine*

● راتنج

● زيوت متطايرة

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه النبتة آمنة عموماً عند تناولها بكميات معقولة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثبان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد دون الستين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تغطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45. ولست حاملاً، وتتمتع مهنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا نتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون القرحي، أو المغص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Lobelia inflata*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الأوراق

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Isolobinine

• Lobelanidine

• Lobelanine

• Lobelline

• Nortobellidine

• Nortobelol

التأثيرات المعروفة

• الكميات الكبيرة منه قد تنشط الجهاز العصبي المركزي.

• المقادير الصغيرة منه ترفع الجهاز العصبي المركزي بسبب انخفاض مستوى الدم.

• ينشط مركز التقيؤ لدى الأشخاص غير المعتادين عليه.

• فعال في التخلص من البلغم.

معلومات متفرقة

• يعتبر التبغ الهندي أحياناً "حشيشة قانونية"، لكن تأثيراته السامة قد تكون خطيرة.

• لا يوصى به في الاستعمال الطبي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

إسهال

توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

إفراز مفرط للعباب.

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

تكوّن مفرط للدموع.

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

دوار

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

صداع

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

غثيان أو تقيؤ.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

خدر

أطلب الإسعاف.

ارتفاع

توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه النبتة خطيرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة****العلامات والأعراض ما يجب فعله**

غيبوبة أطلب الإسعاف.

اسيلة البرية Indigo Wild**معلومات متفرقة**

إن الصبغة الزرقاء في النيلة البرية أقل تأثيراً من تلك الموجودة في النيلة المزروعة.

التأثيرات الإضافية**المحتملة**

- قد يعالج حمى التيفونيد.
- قد يعالج داء المثمورات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Baptisia tinctoria
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.
الجزور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- Baptisine
- Baptisol
- Cystisine
- Quinolizidine

التأثيرات المعروفة

- احتياج بطانة المعدة والأمعاء.
- يسبب إسهالاً شديداً السيولة مع الكثير من الغازات.
- يسبب التقيؤ

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- يجب حفظه في مكان حاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- لم تحدد لغاية الآن ما هي الجرعة الآمنة منه

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

● تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

المصطبب الإيرلندي Irish Moss

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Chondrus crispus, Gigartina mamilliosa

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● كامل النبتة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● برومين

● كلسيوم

● Carrageenan

● كلورين

● بروتين

● صوديوم

التأثيرات المعروفة

● يحمي الأنسجة المكشوفة.

● يعوق آلية تخثر الدم.

معلومات متفرقة

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
قد يتفاعل مع أدوية أخرى مقاومة للتخثر	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
لزيادة التأثير المقاوم للتخثر	
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

● يستخدم في إعداد مستحضرات الديدن ويمثابة بديل للجيلاتين في الهلامات.

● إنه شبيه بالأغرة من الناحية الكيميائية. وهي المادة المستخدمة في المختبرات لزراعة الجراثيم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يساعد في تكوّن البراز الفلظ

● قد يعالج السعال.

● قد يعالج الإسهال.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصفي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

● تناول أدوية مضادة للتخثر.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الارضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Exagonium purga

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Convolvulin

• صمغ

• Jalapin

• Jalapinic acid

• نشاء

• سكر

• زيوت متطايرة



التأثيرات المعروفة

• يهيج المعدة والأمعاء.

• ملين للبراز.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

قرحة المعدة أو المصلي الاثنى عشري، أو الارتداد

البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

لم تحدث المراجع الرسمية من درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال، شديد السيولة	توقف عن تناوله إتصل فوراً
مع غازات، مما يؤدي إلى ضعف كبير وعدم انتظام في خفقان القلب.	بالطبيب.

شربالسا حامالسا Jamaican Dogwood (Fish-poison Tree)

● قد يعالج دورة الطمث المؤلمة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.
- الإرضاع
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Piscidia piscipula*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
لحاء

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

● Piscidin

● Rotenone

التأثيرات المعروفة

- يسبب الهلوسات.
- يعالج الظروف المؤلمة.
- يقمع انقباضات الرحم.
- معلومات متفرقة
- يسمم السمك.
- إن المواد الكيميائية النشطة في اللحاء لها رائحة شبيهة بالأنفون.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يولد إحساساً بالخفة والنشاط.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
نوبات هلوسة. أطلب الإسعاف.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

النبسوس الحلوى Jequirity Bean (Crab's Eyes, Indian Licorice)

- إنه عشبة شائعة في فلوريدا وأميركا الوسطى وأميركا الجنوبية.

التأثيرات الإضافية المحتملة

يستخدم بمثابة قطرات لمعالجة مشاكل العينين.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تحسن

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Abrus precatorius

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Abrin

• Anthocyanins

• Indole alkaloids

التأثيرات المعروفة

إن الأبرين الموجود في البذور يدمر الخلايا.

معلومات متفرقة

- لم يعد مستخدماً في العلاجات.
- يسبب ربات فعل سامة عند تناوله بمثابة طعام

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد. لا تستخدمه. ويمكن لابتلاع حبة واحدة منه فقط أن يؤدي إلى أعراض تسمم تدوم عدة ساعات أو حتى أيام.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تسارع خفقان القلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرب في الكلية يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	أطلب الإسعاف
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

شاي الجرسية (Jersey Tea (Red Root)

- قد يخفف من التشنجات في العضلات الطرية أو الهيكل العظمي.
- قد يعالج الإحباط

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال:
• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
- حفظ المنتج
- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Ceanothus americanus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Ceanothic acid

• Malonic acid

• Orthophosphoric acid

• Oxalic acid

• Pyrophosphoric acid

• Succinic acid

• واثنج

• حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل.
- يزيد من تخثر الدم.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السفلس.
- قد يعالج مشاكل الطحال.
- قد يوقف النزف الخفيف الناجم عن انفجار أوعية دموية في الجلد.
- قد يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- قد يسكن الألم.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو
التأثيرات الجانبية أو أعراض
الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض ما يجب فعله

نرف بسيط لفترة طويلة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً من متناول الأولاد
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التأثيرات (Jimson Weed) (Thorn Apple)

التأثيرات الإضافية
المحتملة



- قد يعالج الربو.
- قد يعالج مشاكل المعدة والأمعاء.
- قد يسبب نوبات الهلوسة.
- قد يسكن الألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية



الاسم الأحبائي (الجنس والنوع):

Datura Stramonium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

الأوراق

البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Atropine •

Hyoscyamine •

Scopolamine •

التأثيرات المعروفة



يُبطّل النشاط الطبيعي لمادة acetylcholine الكيميائية اللازمة لنقاط الاشتباك العصبية في القلب والدماغ والعضلات الطرية والغدد.

معلومات أخرى

• هناك مصادر أخرى أكثر أماناً للمواد الكيميائية الموجودة في هذه النبتة.

• إن أعلى نسبة من المواد السامة موجودة في بذور هذه النبتة، علماً أنها تتوزع أيضاً على كل أنحائها.

والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع ققرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
توسع البريوتين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
جفاف في العم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
خفقان سريع جداً للقلب.	أطلب الإسعاف.
نوبات توهج.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
نوبات هلوسة.	أطلب الإسعاف.
ارتفاع ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
فقدان الوعي.	أطلب الإسعاف.

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. هالوطوية والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد

الجنر Juniper, Common

- Cadinene
- Camphene
- Flavone
- Sabinene
- Terpinene
- راتنج
- سكر
- حمض التانيك
- زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Juniperus communis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• الكحول

• Alpha-pinene

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

• ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيبت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.

• مخصص للاستخدام القصير الأمد فقط.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

في الجرعة الواحدة

أعراض حساسية. توقف عن تناوله.

إتصل فوراً بالطبيب.

إسهال شديد السيولة. توقف عن تناوله. إتصل فوراً

مع غارزات. بالطبيب.

التأثيرات المعروفة

• امتصاص الكلتيين.

• مدر للبول.

• قد يسبب انقباضات في الرحم

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج مشاكل الكلى المزمنة.

• قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• قد يعالج المشاكل الهضمية.

• قد يساعد في تخفيف ضغط الدم المرتفع من خلال التخفيف من احتباس السوائل.

• قد يقاوم الالتهاب

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصفي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجية.

• المعاناة من مرض أو التهاب في الكلية.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

قد يسبب العرعر انقباضات في الرحم. لا تستخدميه.

خفقان سريع جداً	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
للقلب.	بالطبيب.
جرعات صغيرة متكررة	
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
نوبات هلوسة.	أطلب الإسعاف.
ضرد في الكلية	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بتجلى في وجود دم	بالطبيب.
في البول، وتضائل	
تدفق البول وورم	
في اليدين والقدمين.	
تغيرات في الطباع.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.

عشب البحر Kelp

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج الإمساك المزمن من دون إفراغ الأمعاء.
- قد يلين البراز.
- قد يعالج القرحة.
- قد يضبط السمنة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين العمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي
- استشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
- Laminana, Fucus, Sargassum
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- أوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Alginic acid
- Bromine
- Iodine
- بوتاسيوم
- صوديوم

التأثيرات المعروفة

- يحسن حركة الأمعاء.
- معلومات أخرى
- قد يميّز اليود العمل الطبيعي للغدة الدرقية.
- يستخدم اليود بمثابة بديل لملاح المائدة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

عشب الليمون Lemongrass

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Cymbopogon citratus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Citronellal

• Methylnephtone

• Myrcene

• Terpene

• Terpene alcohol

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج الإمساك.
- قد يعالج الحمى.
- قد يخفف من الألم.
- قد يسكن الألم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

التأثيرات المعروفة

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظ في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصف من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

سكاكر منكهة وليس سوساً حقيقياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحمي الأنسجة المكشوفة (استعمال خارجي).
- قد يحسن عمل الكبد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض القلب.
- تناول أدوية مدرة للبول.
- استشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- المعاناة من تاريخ في مرض القلب.
- تجاوزت 55 عاماً.
- الحمل.
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- الإرضاع.
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- الأطفال والأولاد.
- يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى.
- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخططين الطفولة ولا

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Glycyrrhiza glabra

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الجذمور
- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Asparagine
- الدهن
- Glycyrrhizin
- صمغ
- Pentacyclic terpenes
- بروتين
- سكر
- صبغة صفراء

التأثيرات المعروفة

- يخفف من الالتهاب.
- يوفر تأثيرات شبيهة بهرمون الاستروجين.
- يخفف من تشنج العضلات الطرية والهيكل العظمي في حالات الريو والحساسية.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والأنابيب الشعبية ويزيد من سماكته.
- يقطع السعال.
- يعالج الإمساك وحرقة العم والقروحة.
- معلومات أخرى.
- تحذير: إن استهلاك كميات كبيرة من السوس قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
- يتوافر السوس في شكل خلاصة سائلة وكبسولات.
- معظم السوس المتوافر في الولايات المتحدة هو

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتفاع ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تأثيرات احتباس الصوديوم	
تورم اليدين والقدمين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
احتقان في الرئتين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تأثيرات استنفاد الصوديوم	
عدم انتظام في خفقان القلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضعف	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

تزال تحت عمر 45، وليست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

إبرة الشيخ الذهبية (Liferoot (Golden Groundsel, Squaw Weed)

معلومات أخرى

قد يؤدي Pyrrolizidine إلى مشاكل في الكبد، بما في ذلك السرطان.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج عدم انتظام الدورة الشهرية.
- قد يعالج الدورة الشهرية المؤلمة.
- قد يعالج النزف المفرط في الدورة الشهرية.
- قد يخفف من الإفرازات المهبلية.
- قد يسبب انطلاق المخاض المتأخر.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Senecio vulgaris, S. aureus
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
الجزور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة
Pyrrolizidine •

التأثيرات المعروفة

- يرفع ضغط الدم
- يحفز انقباضات الرحم.

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تحاليل غير طبيعية لعمل الكبد.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

البقعة النواحي Lily-of-the-Valley

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Convallana majalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الثمار/الفاكهة

• البتلات/الزهرة

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Convallamann

Convallann

Convallatoxin (سام جداً)

التأثيرات المعروفة

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء

المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالبرطوية والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة****العلامات والأعراض ما يجب فعله**

عدم انتظام في خفقان

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثيان أو قيء

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

• يزيد من فاعلية انقباض عضلة القلب.

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

معلومات أخرى

رغم أن زنبقة الوادي تحتاز بخصائص مماثلة للديجتال، ننصح باستعمال منتجات أخرى أكثر أماناً وأرخص ثمناً.

التأثيرات الإضافية**المحتملة**

• قد يعالج قصور القلب الاحتقاني.

• قد يحسن عدم الانتظام في خفقان القلب.

• قد يحسن الدورة الدموية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصمى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم 45 سن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، الكمكلات وعقاقير أخرى



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Tilia europaea*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• البتلات/الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة



التأثيرات المعروفة

• يخفف تشنجات العضلات الطرية أو الهيكل العظمي.

• يزيد من إفراز العرق.

• يخرج المخاط الفانض من الرئتين.

• يحسن الهضم.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج السعال.

• قد يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري التنفسية ويزيد من سيولته.

• قد يخفف الحمى.

• قد يعالج الأرق والتوتر العصبي.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدى 45، مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تغطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تغطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة نسبياً عند تناولها بكميات صغيرة لفترات قصيرة من الوقت

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجاذبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض ما يجب فعله
دوار توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

تابل حولة الطبيب Mace

معلومات متفرقة

- ما من تأثيرات، سواء جيدة أو سيئة، متوقعة في الجسم عند تناول هذه العشبة بكميات صغيرة لتحسين نكهة الطعام.
- جوزة الطيب هي الحبة. والتابل هو غلافها اللين.
- إنه متوافر في شكل مسحوق وصيغة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يسبب الهلوسات.
- قد يغير المزاج.
- قد يعالج مشاكل الهضم.
- قد يعالج الكوليرا.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تخطين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية



الاسم الأحائي (الجنس والنوع):

Myristica fragrans

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الغلاف اللين

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Elemicin

Eugenol

Isoeugenol

Isomethyleugenol

Methoxyeugenol

Methyleugenol

Myristicin

• بروتين

• نشاء

• زيت مثبت

التأثيرات المعروفة



• يحفز حركة العضلات في الأمعاء.

• ينشط الجهاز العصبي المركزي.

• يساعد في معالجة الإسهال وعسر الهضم.

• يطرد الغازات من الأمعاء.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

إن خصائصه السامة قد تسبب الهذيان وفقدان التركيز والشلل عند البشر.

لأعراض القسم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انخفاض حرارة الجسم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نبض سريع وضعيف.	أطلب الإسعاف.

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

• تجاوزت 60 عاماً

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

إن تأثيراته المعدلة للمزاج والمسببة للهلوسة ليست محببة، لذا، لا تستخدم جوزة الطيب لهذه الأغراض.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

جوز مالابار (Vasaka) Malabar Nut

• Vasicine

التأثيرات المعروفة

- يوسع الأنايبب الشعبية.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Adhatoda vasica
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

المواد الكيميائية الموحدة في هذه العشبة:

• Adhatodic acid

• Peganine

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج السعال.
- قد يعالج التهاب الشعب.
- قد يعالج الربو.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تتوین الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

التشخيص

- تجاوزت 50 عاماً.
- المعاناة من مرض القلب.
- المعاناة من مرض الكلية.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Dryopteris filix-mas

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Alkanes

• Oleo Resin

• راتنج

• Triterpenes

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يقضي على الديدان في الأمعاء.
- يخفف العمل الطبيعي للمضلات.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

ما من تأثيرات إضافية معروفة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

أطلب الإسعاف.	صعوبة في التنفس.
أطلب الإسعاف.	غيبوبة
أطلب الإسعاف.	نوبات تشنج.
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	إسهال
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	صداع
أطلب الإسعاف.	عدم انتظام في
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	خفقان القلب.
	غثيان أو قيء

الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تشنجات في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

اليلروج (Love Apple, Satan's Apple) Mandrake

التأثيرات الإضافية المحتملة



- قد يخفف من الألم.
- قد يسكن الألم.
- قد يحسن الشهوة الجنسية.
- قد يعالج القرحة.
- قد يعالج المشاكل الجلدية.
- قد يعالج البواسير.
- قد يسبب إسهالاً شديداً المصحوباً مع غازات.
- قد يخدر الجسد

معلومات أساسية



- الاسم الحيواني (الجنس والنوع)
- Mandragora officinarum
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية
- الجزور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Hyoscyamine
- Mandragon
- Scopolamine

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض القلب.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر

التأثيرات المعروفة



- يسرع خفقان القلب.
- يوسع البؤبؤين.
- يسبب جفافاً في الفم.
- يؤدي إلى احتباس البول.
- يسبب الهلوسات.
- يخفف من حركات العضلات في الأمعاء.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
ارتباك	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عدم انتظام في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.

فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطبت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتغلى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

الخطمي Marshmallow Plant

● بكتين

● نشاء

● سكر

التأثيرات المعروفة

- يطري الجلد أو يجعله أكثر نعومة.
- يساعد في معالجة السعال أو الزكام أو التهاب الجيوب الأنفية أو تقرح الحنجرة.

معلومات منفردة

- تستخدم نبتة الخطمي بمثابة "حشوة" في عدد من

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Althaea officinalis*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الأوراق

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Asparagine

● دهن

● هلام نباتي

المنتجات.

- إنها متوافرة في شكل لحاء مجفف، وكبسولات، وصبغة، وتستخدم أيضاً بمثابة كمادة لوضع الأدوية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يحمي الجلد المجروح أو المكشوط.
- قد يعالج الحصى في الكلية.
- قد يعالج عسر الهضم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص القشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الرضاع:

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيتم الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Podophyllum peltatum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Alpha-peltatin

• Beta-peltatin

• Podophyllotoxin

التأثيرات المعروفة

• يجمع أو يحول دون انقسام الخلايا.

• ينشط المعدة والأمعاء.

• يدفع إلى التقيؤ

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الإمساك والبراز الجامد جداً.

• قد يسبب سرطانياً في الخصيتين (لا تزال بعض المكونات قيد الدراسة).

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون القرّحي، أو المفصّ التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	دوار	لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.	إحساس بالنشاط والخفة.	التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة
توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.	غثيان أو تقيؤ	
أطلب الإسعاف.	فقدان الوعي.	العلامات والأعراض
		إسهال
		ما يجب فعله
		توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

إكليلية السروج (Spiraea) Meadowsweet

- قد يعالج الإسهال.
- قد يخفف الألم.
- قد يخفف من تشنجات الدورة الشهرية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب لأنه يحتوي على الساليسيلات.

معلومات أساسية

الاسم الأحبائي (الجنس والنوع):

Filipendula ulmana

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• البتلات/الزهرة

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Gallic acid

Methyl salicylate

Salicylic

Salicylic aldehyde

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يساعد في معالجة امتحاج المعدة والأمعاء.
- يساعد في معالجة الصداع.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب لأنه يحتوي على الساليسيلات.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد دون السنتين

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند استعمالها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في ظهور دم في البول، وتضائل	
دفق البول وورم في اليدين والقدمين.	
إحساس بالنبضات والخفة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
فقدان الوعي.	أطلب الإسعاف.
احتياج المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الشاي المكسيكي Mexican Sarsaparilla

- راتنج
- Sarsapogenin
- Smilagenin
- Stigmasterol
- شفاء
- زيوت متطايرة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Similax
aristolochiaefolia, S. regeli, S. febrifuga,
S. ornata

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- اللحاء
- الثمار
- الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

التأثيرات المعروفة

- يسبب امتصاص الأغذية المخاطية.
- يسبب امتصاص المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

● الثمار صالحة للأكل.

● يستخدم اللحاء والثمار وأجزاء أخرى من النبتة لإعداد الشراب الخفيف الذي يحمل الاسم نفسه.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يخفف من ألم الأسنان.

● قد يخفف مؤقتاً من الإمساك.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند استعمالها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

تشنجيشة اللبن Milkweed, Common (Blood-Flower)

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Asclepiadin

● Asclepioside (مر)

● Galitoxin

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Asclepias syriaca

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدمه.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في ظهور دم في البول، وتضائل	
نفق البول وورم في اليدين والقدمين.	
إحساس بالنشاط	توقف عن تناوله. إتصل

التأثيرات المعروفة

- يتسبب في إمتهاج وتنشيط المعدة والأمعاء.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- يزيد من إفراز العرق.
- معلومات متفرقة
- قد تكون كل أجزاء هذه النبتة سامة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهاب الشعبى.
- قد يعالج التهاب المفاصل.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلمومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداءة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

والخفة.	بالطبيب عند الإمكان.
فقدان الشهية.	توقف عن تناوله. إتصل
غثيان أو قيء.	بالطبيب عند الإمكان.
	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
مشية غير ثابتة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.

المستحدر Milkwort

- قد يعالج داء النقرس.
- قد يعالج مرض ذات الجنب.
- قد يعالج الإمساك.
- قد يزيد من إنتاج الحليب عند الأم المرضعة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى
- الحمل
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)
Polygala vulgaris, P.senega
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
• الجذور
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
• سابونين

التأثيرات المعروفة

- يزيد من الإفرازات في المجاري الشعبية.
- يتسبب في امتصاص الأمعاء.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري التنفسية ويزيد من سيولته.
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- يزيد من إفراز العرق.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج الخناق.
- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج الطفح الجلدي

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخططين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إحساس بالخفة والنشاط.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان قوي.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الدبق Mistletoe

- Tyramine
- Viscotoxins

التأثيرات المعروفة

- ينشط الجهاز العصبي المركزي.
- يسبب انقباض العضلة الطرية (عضلة القلب).

معلومات متفرقة

هذه التبتة خطيرة جداً للذين يتناولون أدوية الأوكسيدات الأحادي الأمين لمعالجة ضغط الدم المرتفع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).
Phoradendron serotinum, Viscum album
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الثمار/الفاكهة
- الأوراق
- الجذوع
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- Beta-phenylethylamine

المباشرة، لا تحفظه في الخلاصة.

- يحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
توبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ارتفاع ضغط الدم.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنج العضلات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تباطؤ خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من العصبية.
- قد يخفف من ضغط الدم المرتفع.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

- ترغب في استخدام هذه العشبة لأنها تعتبر سامة.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

لا تسمح للأولاد بتناول ثمار هذه النبتة الشائعة جداً خلال فترة الوضع لأن تناول بضعة ثمار قد يسبب التسمم.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء.

البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المقص التشنجي.

إستنشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمددواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

• ترغب في استخدام هذه العشبة لأنها تعتبر سامة الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان حاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Ephedra nevadensis, *E. trifurca*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Ephedrine

التأثيرات المعروفة

• ينشط الجهاز العصبي المركزي.

• يرفع ضغط الدم

• يسرع خفقان القلب.

معلومات متفرقة

لا يفيد شاي مورمون إطلاقاً في معالجة داء الربو الشعبي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من أعراض القصور القلبي الاحتقاني،

وقصور الكلية وقصور الكبد.

• قد يخفف من الشهية.

• قد يحسن الطاقة.

• قد يخفف من أعراض التعب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتفاع مفرط لضغط الدم	أطلب الإسعاف.
عدم انتظام في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.
خفقان سريع للقلب.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية



تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

لمحة الصباح Morning Glory

• قد يحسن المزاج.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التنحني.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدد طويلة لمشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب

معلومات أساسية



- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Ipomoea purpurea
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- البذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Cetyl alcohol
- Dihydroxycinnamic acid
- Lysergic acid
- Scopoletin

التأثيرات المعروفة



- ينشط الجهاز العصبي المركزي.
- يحسن عمل المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

- قد يسبب الهلوسة.
- قد يسهل الإمساك.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطعونة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السعفة

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتباك	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
إسهال سائل جداً	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
مع الكثير من الغازات.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
ارتجاج في الرؤية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
هلوسات	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب

شجرة التبليل (Mountain Ash (Rowan Tree)

• حمض ماليك

• حمض سوربيك

• سوربيتول

• سوربوز

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Sorbus aucuparia

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الثمار/الفاكهة

• البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• زيت مثبّت

التأثيرات المعروفة

• يسبب احتياج وتنشيط المعدة والأمعاء

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من

خلال زيادة إنتاج البول.

معلومات متفرقة

يستخدم بمثابة محلي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحول دون داء الأسقريوط.

• قد يعالج البواسير.

• قد يعالج قرحة المعدة والاثنى عشرى.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية من هذه العشبة، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موحوداً. لا تستخدمها إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيّران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض

ما يجب فعله
توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب.

إسهال

تسليج الجبل (Wolf's Bane) Mountain Tobacco

التشنجي.

يستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

لا تتناوله داخلياً. إنه آمن عند وضعه فوق الجلد.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Amica montana*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• البتلات/الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Angelic acid

• Amidol

• Choline

• Thymohydroquinone

• أحماض دهنية

• حمض فورميك

التأثيرات المعروفة

• يخفف من الاحتياج عند وضعه على الجلد الذي يغطي مفصلاً ملتئماً.

• يقع الجهاز العصبي المركزي.

• يسبب احتياج المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يخفف من الانزعاج الناجم عن الودء والرضوض عند وضعه مباشرة فوق مكان الإصابة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

ضعف في العضلات. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
انخفاض سريع في ضغط الدم. ومن أعراضه نذكر الإغماء والشحوب وبرودة الجسم والتعرق والنبض السريع.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال سائل جداً	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
مع الكثير من الغازات.	أطلب الإسعاف.
عدم انتظام في خفقان القلب.	

التوت Mulberry

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو ثنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Morus rubra
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• اللحاء

• الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة: غير معروفة.



التأثيرات المعروفة

• ينشط المعدة والأمعاء.

• يقمع الجهاز العصبي المركزي.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من الحمى.

• قد يزيد من الدوار.

• قد يسهل المعدة قليلاً.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

معلومات أخرى:

لن يفيدك هذا المنتج وقد يسبب لك أعراض التسمم.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الخلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

الأس Myrtle

للغرفة

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج امتحاج المعدة.
- قد يعالج الالتهاب الشعبي.
- قد يعالج تليف البنكرياس الحوصلي.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنقوص التنسجي.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Myrtle communis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• D-pinene

• Eucalyptol

• Myrtenol

التأثيرات المعروفة



- احتياج الأس الأغشية المخاطية.
- تؤدي الكميات الكبيرة منه إلى قمع الجهاز العصبي المركزي

معلومات متفرقة

يستخدم الأس بمثابة شابل ومنكه وروح للعطر وسائل

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

كسسا السمية

- لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في وجود	
دم في البول، وتضائل	
تدفق البول وورم	
في اليدين والقدمين.	

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الغيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد من دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيتم الطفولة و؟ تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع بمهنية بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط و؟ تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية في التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Quercus
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Quercitanic acid

التأثيرات المعروفة

• مضاد للالتهاب.

• يخفف من تقرح الحنجرة عند استخدامه في الفم.

• يساعد في معالجة الانتواء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج البواسير.

• قد يعالج الإسهال.

• يمكن غسل الفم به للتخفيف من الالتهاب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المقص التنشجي.

إستشر الطبيب في حال.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في الكلية يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	أطلب الإسعاف.
طفح جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عطش	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إمساك	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
جفاف في الفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ازدياد التبول.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الاسم العلمي: الجذور السوداء (Black Flag) Orris Root

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد الجلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Ins versicolor*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- صمغ
- حمض التانيك
- Oleoresin

التأثيرات المعروفة



- يرفع الجهاز العصبي المركزي.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

- قد يعالج المشاكل الجلدية.
- قد يعالج التهاب المفاصل.
- قد يعالج الأورام

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً، لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

لا تستخدم هذا المنتج لأنه لا يفيد وقد يسبب لك أعراض تسمم.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إحساس بالحرق في الحنجرة والفم.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تشنج وألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال شديد السيولة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

البابايا Papaya

الفيتامين C و E.

التأثيرات المعروفة

- ينشط المعدة لزيادة الإفرازات.
- يطلق الهستامين من أنسجة الجسم.
- يقمع الجهاز العصبي المركزي.
- يقتل بعض طفيليات الأمعاء.

معلومات متفرقة

- ما من مشاكل متوقعة عند تناوله بمثابة طعام عادي.
- يستخدم لطرية اللحم.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Carica papaya
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

• اللحاء الداخلي

• الجذوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Amylolytic enzyme

• Caricin

• Myrosin

• Peptidase

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مهنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حرقة في الفم ناجمة عن احتياج الجزء السفلي من المريء.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يساعد في الهضم.
- قد يزيد من سيولة فائض المخاط في الفم والمعدة
- قد يعالج تقرّح الأسنان (اللحاء الداخلي)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

- كنت حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

لم تثبت أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لم تثبت أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه، لكن احتمال حدوث المشاكل يبقى موجوداً. لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين. معلومات أخرى.

توت الحجل (Partridgeberry (Squawvine)

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيتم الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
الجرعة الآمنة.
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

معلومات أساسية

الاسم الأحبائي (الجنس والنوع): *Mitchella repens*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجنوع

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Dextrin

• هلام نباتي

• سابونين

• شمع

التأثيرات المعروفة

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج المخاط.
• يقلص الأنسجة.
• يحول دون إفراز السوائل.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يجعل المخاض أقل صعوبة.
• قد يساعد على تدفق الحليب عند الأم المرضعة.
• قد يعالج الأرق.
• قد يخفف من الإسهال.
• قد يعالج قصور القلب الاحتقاني وقصور الكلية وقصور الكبد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن

المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.

استشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

● *Anemone pulsatilla*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● البتلات/الزهرة

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● *Anemone Camphor*

● *Ranunculin*

● حمض الثانك

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



● بسبب احتياج الأغشية المخاطية.

● يقلص الأنسجة.

● يحول دون إفراز السوائل.

● يقلص من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري

الشعبية ويزيد من سيولته.

● يعميق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند

تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

● قد يعالج مشاكل الدورة الشهرية.

● قد يرفع الإثارة الجنسية.

● قد يزيد من القوة الجنسية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ألم في البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

زهرة الآلام (Maypop) Passion Flower

- يقع قليلاً الجهاز العصبي المركزي.
- يسبب الهلوسة.
- معلومات متفرقة

- يقال إن تدخين زهرة الآلام يسبب تغييراً في المزاج شبيهاً بذلك الناجم عن الماريجوانا.
- إنه متوافر في شكل كبسولات أو أدوية عشبية أو صبغات.
- لا توجد دراسات مخبرية رسمية عن فاعليته.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من الصداع.
- قد يساعد في معالجة نوبات التشنج.
- قد يساعد في معالجة الأرق.
- قد ينشط الأعصاب في مرض باركنسون.

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).
- Passiflora incarnata*
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.
- الأزهار
- الفاكهة
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Cyanogenic glycosides
- Harmaline
- Harman
- Harmine
- Harmol

التأثيرات المعروفة

- يقع الانتقال العصبي في الحبل الشوكي والدماغ
- يزيد من سرعة التنفس.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

الجرعة الآمنة

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لعترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنج،	أطلب الإسعاف.
انخفاض حرارة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
الجسم.	بالطبيب.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
	بالطبيب.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
شلل في العضلات،	أطلب الإسعاف.
بما في ذلك العضلات	
المستخدمة في التنفس،	
غثيان، تقيؤ،	توقف عن تناوله. إتصل فوراً
اهتياج المعدة.	بالطبيب.
نعاس	لا تحاول العمل أو القيادة

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

يستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

لن يساعد هذا المنتج، لا بل إنه قد يسبب لك أعراض سامة.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Prunus persica* أو نوع آخر من نوع *Prunus*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- اللحاء
- الأوراق
- الجذور
- البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- سيانيد، ولا سيما في النواة.
- زيوت متطايرة
- Phloretin



التأثيرات المعروفة

- يهيج وينشط المعدة والأمعاء.

معلومات منفردة

- يستعمل هنود أميركا الشمالية هذا اللحاء لصنع الشاي.

- يمكن تناول الفاكهة، باستثناء النواة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج الإمساك (الأوراق).
- قد يعالج التهابات الجهازية (اللحاء والجذور).



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال.

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنصر القشنجي.

يستشر الطبيب في حال.

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة عند تناول الخوخ بمثابة عشبة طبية. تجنبني النوى، يفترض ألا توجد مشاكل مع الثمار.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة عند تناول الخوخ بمثابة عشبة طبية. تجنبني النوى. يفترض ألا توجد مشاكل مع الثمار.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى:

لن تساعدك النوى، لا بل قد تسبب لك أعراض سامة.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية



لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

حشيشة الخراج Pellitory

• كنتر حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطبت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتعتزم ميدنياً

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Anacyclus pyrethrum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Pellitorine •

التأثيرات المعروفة



يقتل الحشرات.

معلومات متفرقة

طعمه مر.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يخفف من ألم الأسنان أو التهابات اللثة.

• قد يخفف من ألم الوجه.

• قد يزيد من إفراز اللعاب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجةسمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو ..

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثبان أو تقيؤ توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

لصنع النعنا Pennyroyal

معلومات متفرقة

• يستخدم نعنن الماء بمشابة عامل منكه.

• يمكن أن يؤدي مقدار ضئيل من زيتته إلى ضرر كبير

في الكبد والكليتين.

• إنه متوافر أيضاً في شكل صبغات وأوراق وأزهار مجففة.

• زيتته سام، لا تبتلع.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يخفف من تشنجات الأمعاء وانتفاخها.

• قد يساعد في معالجة الزكام والسعال.

• قد ينظم الدورة الشهرية عند المرأة.

• قد يخفف من الغازات وعسر الهضم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Mentha pulegium, Hedeoma pulegioides

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• كامل النبتة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Pulegone (زيت أصفر أو أخضر مصفر)

التأثيرات المعروفة



• يحفز انقباضات الرحم.

• يقمع الجهاز العصبي المركزي.

• يهيج الأغشية المخاطية.

• يجعل الجلد أكثر احمراراً من خلال زيادة دفق الدم إليه.

• يخفف من الاحتقان.

• قد يسبب ضرراً كبيراً في الكبد والكليتين.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تعبران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض القسم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نزف من المعدة والأمعاء.	أطلب الإسعاف.
دم في البول.	أطلب الإسعاف.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين).	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نوبات ألم.	أطلب الإسعاف.
نزف غير طبيعي من المهبل.	أطلب الإسعاف.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدى طويل لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية. بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الرضاع:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

لا تحاولي أبداً استخدامه للإجهاض، لأن تعنت الماء قد يسبب الموت.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

اليانكة (Old Maid) Periwinkle

Vinleurosine ●

Vinrosidine ●

التأثيرات المعروفة

- يجمع نمو الجراثيم وتكاثرها.
- يجمع إنتاج النخاع العظمي مما يؤدي عمليات إنتاج خلايا الدم في الجسم.
- فعال في معالجة أنواع مختلفة من الأورام الخبيثة
- يخفف من تكاثر خلايا الدم البيضاء في الجسم.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Catharanthus roseus, Vinca rosea

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Vinblastine ●

Vincristine ●

معلومات متفرقة

تستخدم مشتقات الونكة، بعد تنقيتها، لمعالجة السرطان تحت إشراف طبي

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من الالتهاب عند استخدامه بمثابة مرهم.
- قد يعالج تقرّح الحنجرة والتهاب المنخرين.
- قد يعالج داء السكري.
- قد يسبب الهلوسات عند تدخينه.

تسمم.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تساقط الشعر.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نوبات ألم.	أطلب الإسعاف.
اصفرار العينين، لون داكن للبول والجلد	أطلب الإسعاف.
نتيجة تلف بعض خلايا الكبد.	

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين العمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

لن يساعدك هذا المنتج، لا بل قد يسبب لك أعراض



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Chimaphila umbellata

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Arbutin

• Chimaphilin

• Eriolin

• كلوروفيل

• معادن

• حمض بتيك

• حمض التانيك

• حمض أرسوليك



التأثيرات المعروفة

• يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

• يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج عسر الهضم أو الامتياح البسيط في المعدة.

• قد يعالج التهابات المجاري البولية.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد المعوي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.

يستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

السلوى Pitcher Plant

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع ميدنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Sarracenia*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• رائنج

• صباغ أصفر

التأثيرات المعروفة

• يسبب احتياج المعدة والأمعاء.

• له خصائص مدرة للبول.

التأثيرات الإضافية المحتملة

• قد يعالج الإمساك.

• قد يعالج عسر الهضم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة الجوعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

حشيشة الضمالة (Pleurisy Root) (Butterfly Weed)

- قد يزيد من إفراز العرق.
- قد يساعد في معالجة مرض ذات الجنب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدميه.

الإرضاع

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Asclepias tuberosa

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Asclepiadin

● Asclepiene

● Galitoxin

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- يسبب احتياج الأغشية المخاطية.
- ينشط ويهيج المعدة والأمعاء.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- إنه مسهل قليلاً وقد يفضي إلى إسهال شديد السيولة مصحوب بفازات

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه

نبات الثعلب (Poke (Pokeweed, Skoke



التأثيرات المعروفة

● ينشط ويسبب احتياج المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

● كل أجزاء القبة الفطرية سامة. لا تتناولوها. والأولاد

هم الأكثر عرضة لأعراض التسمم.

● في بعض المناطق، يتمّ غلي الأوراق وتناولها

بمثابة منكه، ولاسيما في جنوب الولايات المتحدة

لكن استخدام العشبة بهذه الطريقة قد يجعلها سامة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يعالج التهاب المفاصل المزمن.

● قد يعالج الإمساك.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Phytolacca americana

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الأوراق

● الجذور

● البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Asparagine

● Mitogen

● Phytolaccagenin

● راتنج

● صابونين

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الخلاصة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالوطوية والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تباطؤ خفقان القلب	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المنص التشنجي.
- إستشِر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.
- الإرضاع
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
- قد يؤدي الإمساك بالجذور إلى طفح جلدي.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

يستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر ماعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

إن تناول الرمان داخلياً بمثابة عشبة طبية يجعل المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه. لكن تناول الفاكهة ضمن الغذاء المتوازن لا يفرض أية مشكلة.

الإرضاع

إن تناول الرمان داخلياً بمثابة عشبة طبية يجعل المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه. لكن تناول الفاكهة ضمن الغذاء المتوازن لا يفرض أية مشكلة.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Punica granatum
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● اللحاء

● الثمار/الفاكهة، بما في ذلك القشرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Isopelletierine

● Methyl-isopelletierine

● Pelletierine

● Pseudo-pelletierine

● حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

● يقلص الأنسجة.

● يحول دون إفراز السوائل.

● يقضي على ديدان الأمعاء.

● يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

معلومات متفرقة

● يمكن تناول الفاكهة وهي غير سامة.

● يحتوي اللحاء والقشرة على خصائص عشبية طبية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يعالج الركود المعوي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
توسع البؤبؤ.	أطلب الإسعاف.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
رؤية مزدوجة.	أطلب الإسعاف.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضعف	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

البرعم الشعبي Poplar Bud

التأثيرات المعروفة



- يمنع وصول نبضات الألم إلى الدماغ.
- يغير مركز تنظيم الحرارة في الدماغ.
- يقاوم التأكسد.

معلومات متفرقة

- إن تأثيره المقاوم للتأكسد يساعد في الحؤول دون فساد المراهم.
- يستخدم البرعم الشعبي بمثابة مادة مضافة في العديد من المستحضرات الصيدلانية

التأثيرات الإضافية



المحتملة

- قد يخفف الألم الناجم عن الالتواء والرضوض عند وضعه مباشرة على الجلد.
- قد يعالج السعال والزكام عند تناوله داخلياً.
- قد يخفف من الحرارة.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Populus candicans

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- برعم الورقة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Chrysin •

Gallic acid •

Humulene •

Malic acid •

Mannite •

Populin

Tectochrysin •

Salicin •

راتنج •

حفظ المنتج

- يحب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
حكاك واحمرار في الجلد.	استخدم مرهم الهيدروكورتيزون، المتوافر من دون وصفة طبيب.
طفح جلدي.	استخدم مرهم الهيدروكورتيزون، المتوافر من دون وصفة طبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:
 - تناول هذه العشبة لمدى طويل لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.
- الارضاع
- لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى
- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45. ولستِ حاملاً، وتُمنع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): clavaherculus

Zanthoxylum americanum, Zanthoxylum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

● اللحاء

● الثمار/الفاكهة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Acid amide

● Asarinin

● Berberine

● Herculin

● Xanthoxyletin

● Xanthyletin



التأثيرات المعروفة

● ينشط ويسبب إحتياج المعدة والأمعاء.

● يزيد من إفراز العرق.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

● قد يحسن الشهية.

● قد يعالج التهاب المفاصل.

● قد يخفف من الانتفاخ.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد

البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص

التشنجي

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيها الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مهنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجةسمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الششاش الشائك Prickly Poppy

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تناوله في حال.
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- الإرضاع
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)
Argemone mexicana
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- البذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- Berberine
- Dihydrosanguinarine
- Protopine
- Sanguinanne

التأثيرات المعروفة

يقمع قليلاً الجهاز العصبي المركزي.
معلومات متفرقة
هذا الششاش ليس هو مصدر المورفين أو الكودين أو المخدرات الأخرى.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يؤدي تدخين هذه النبتة إلى الإحساس بالخفة والنشاط، وقد يخفف الألم.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
احتباس السوائل.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
فقدان الوعي.	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيح	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تورم البطن.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
اضطراب في الرؤية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

نبات الصرغوسل (Pigweed) Prostrate Knotweed

التأثيرات المعروفة

- يخفف من ضعف الأوعية الشعرية.
- يخفف من نفاذ الأوعية الشعرية.
- يؤخر تلف الإبيفرين.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يسبب إسهالاً شديداً السيولة مع الكثير من الفارات.
- قد يعالج الحصى في الكليتين والمرارة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Polygonum aviculare

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

أجزاء متنوعة من هذه النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

Avicularin •

Emodin •

Quercetin 3-arabinoside •

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض

ما يجب فعله

ألم في البطن	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّجي، أو العفص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدّواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع

تنبيهات

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
 - كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
 - المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الصفي الاثني عشري، أو الارتداد الblemومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المصّص التشنجي.
 - إستشر الطبيب في حال.
 - تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
 - تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه
- الإرضاع
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.
- الأطفال والأولاد
 - يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.
- معلومات أخرى:
 - المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.
- حفظ المنتج:
 - يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة



معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Rauwolfia serpentina
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية
 - الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
 - Ajmaline
 - Deserpidine
 - Rescinamine
 - Reserpine
 - Serpentine
 - Yohimbine



التأثيرات المعروفة

- يخفف من ضغط الدم.
- يقمع عمل الجهاز العصبي المركزي.
- يحدّر.
- معلومات متفرقة
 - تقضي الروالفا على السيروتونين والكاتكولامين في أعصاب الجهاز العصبي المركزي.
 - تم استخدام الراولفيا المكررة طوال عدة سنوات لمعالجة ضغط الدم المرتفع.
 - تشير الدراسات على الحيوانات إلى أن هذه العشبة قد تسبب السرطان.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من القلق.
- قد يخفف من الحمى.
- قد يقتل طفيليات الأمعاء.
- يستخدم في الهند بمثابة ترياق للدغات الأفاعي.

الجرعة الآمنة.

لم تحدد جرعة آمنة لغاية الآن.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
أحلام مزعجة. توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

انخفاض الشهوة

الجنسية والأداء الجنسي.

إسهال

توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان

توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

أطلب الإسعاف.

دوار

احتقان في الأنف.

انخفاض سريع في

ضغط الدم، ومن

أعراضه الشحوب

والعرق البارد وفقدان

الوعي والنقص السريع.

تباطؤ خفقان القلب.

سبات، غيبوبة.

ألم في أعلى البطن.

توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

التوت الأحمر Red Raspberry

• يخفف من تشنجات الرحم.

• يرخي تشنجات الأمعاء.

• يفرغ الحنجرة المتقرحة.

معلومات متفرقة

• ثمار التوت الأحمر لذيذة ومغذية وغير سامة.

• ما من مشاكل متوقعة لأي أحد عند تناول التوت

الأحمر بمثابة طعام شائع.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يزيد من انقباضات الرحم أثناء المخاض.

• قد يخفف من النزف المفرط في الدورة الشهرية.

• قد يخفف من دوار الصباح.

• قد يعالج قرحة الفم.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Rubus strigosus, R. idaeus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• الأوراق

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• حمض الستريك

• حمض الثنائيك

التأثيرات المعروفة

تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بوصفة من الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون الستين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا

الزعرور Rhatany

• أوكسالات الكالسيوم

• صمغ

• Lignin

• N-Methyltyrosine

• Saccharine

• نشاء

• حمض التانيك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Krameria triandra

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

أجزاء متنوعة من النبات تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

ما دون الستين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع سببياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيّران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السامة

لم نتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرب في الكلية	أطلب الإسعاف.
يثجلى في وجود دم في البول، وتضاول تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	

التأثيرات المعروفة

- يقاوم الالتهاب.
- يساعد في معالجة القروح الأكلية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج تقرّح الحنجرة.
- قد يعالج البواسير.
- قد يعالج الالتهاب المزمن في الأمعاء.
- قد يعالج الإسهال.
- قد يطهر الفم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الحمى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الارضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد

عشبة الروماتيزم (Wild-yam Root) Rheumatism Root

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المصلي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المعص القشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة، لا تستخدميه

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيit الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Dioscorea villosa

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Dioscin

• Diosgenin

• راتنج

• سابونين

التأثيرات المعروفة

• يفتت أغلفة الأغشية، ويقضي على خلايا الدم الحمراء (سام للسك والأمهية).

معلومات متفرقة

تستخدم مادة Diosgenin لتخليق الكورتيزون والبروجسترون.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج التهاب المفاصل من خلال إزالة الأوساخ المتراكمة على المفاصل.

• قد يعالج أعراض سن اليأس.

• قد يخفف من دوام الصباح.

• قد يعالج تشنجات دورة الطمث.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسعم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

Rose الورد

- تستخدم ثمار الورد البري في مكملات الفيتامين C.
- يضيف الورد نكهة إلى الأطعمة أثناء الطهي.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يلطف الجلد.
- قد يقبض الأنسجة.
- قد يسكن الألم.
- قد يساعد على النوم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- الحمل:
- لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الإرضاع
- لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد
- يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Rosa
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- الثمار/لافناكة
- البتلات/الزهرة
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Ascorbic acid
- Cyanogenic glycoside
- Quercitrin
- حمض التانيك
- زيوت متطايرة
- الفيتامين A والفيتامين C

التأثيرات المعروفة

- يقاوم الالتهاب.
- يهدئ الأعصاب
- معلومات متفرقة
- استخدم هتود أميركا الشمالية ثمار الورد قبلاً بمثابة مصدر للطعام
- تستخدم أوراق الورد لصنع الشاي أو السلطة، أو يجري تدخينها مثل التبغ

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع

دون السنتين

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

إكليل الجبل Rosemary

التأثيرات المعروفة

- يهيج الأنسجة ويقتل الجراثيم (الزيوت المتطايرة).
- يقبض الأنسجة.
- يزيد من حموضة المعدة ويساعد في التخفيف من عسر الهضم.
- يساعد في طرد الغازات من الأمعاء.

معلومات متفرقة

- يستخدم إكليل الجبل بمثابة جزء أساسي في العطور ومستحضرات الشعر والصابون.
- ما من تأثيرات، سواء جيدة أو سيئة، في الجسم عند استخدام هذه العشبة بكميات ضئيلة جداً لتحسين نكهة الطعام.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يزيد من احمرار الجلد من خلال زيادة دفق الدم إليه

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Rosmarinus officinalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الثمار/الفاكهة

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● المزيات

● Borneol

● Camphene

● Camphor

● Cineole

● Pinene

● راتنج

● حمض الثانيك

● زيوت متطايرة

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. **حفظ المنتج.**

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت. لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طفح جلدي.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

● قد يحسّن الشهية.

● قد يعالج التهابات الجلد عند استخدامه خارجياً.

● قد يساعد في معالجة الإمساك.

● قد يدر البول.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال.

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون القرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال.

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طويلة لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والتوع): *Ruta graveolens*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

كامل النبتة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

Esters •
Methyl-N-nonyl-ketone •

Phenols •

Rutin •

حمض التانيك •

زيوت متطايرة •




التأثيرات المعروفة

- ينشط انقباضات الرحم.
- يطيل أمد تأثير الإبينفرين.
- يخفف من التشنجات في العضلات الطرية أو الهيكل المتصلب.
- يخفف من هشاشة الأوعية الدموية.
- يعميق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يسبب انطلاق الدورة الدموية الشهرية.
- قد يعالج الهستيريا.
- قد يعالج طفيليات الأمعاء (الديدان)
- قد يعالج المغص.
- قد يضبط النزف بعد الولادة.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

الحشيشة الفضيحة (Silverweed) (Goose Tansy)

التأثيرات الإضافية المحتملة



- قد يعالج دورة الطمث المؤلمة.
- قد يعالج مرض الكزاز في حال غياب المساعدة الطبية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمدوامة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Potentilla anserina

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

- كامل النبات

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Ellagic acid

• Kinovic acid

• حمض التانيك

التأثيرات المعروفة



- يقلص الأنسجة.
- يحول دون إفراز السوائل.
- يؤدي إلى تكتل جزيئات البروتين مع بعضها.
- يحفز انقباضات الرحم
- يعمق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ألم عند التبول.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي طفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

حشيشة الثعبان Snakeplant

Lysergol •

التأثيرات المعروفة

يقع الجهاز العصبي المركزي.

معلومات متفرقة

يستخدم هنود المكسيك حشيشة الثعبان في الاحتفالات الدينية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Rivea corymbosa*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Chanoclavine

• D-isolysergic acid amide

• D-lysergic acid amide

• Elymoclavine

- قد تغير المزاج.
- قد تسبب الهلوسة.

السمية



تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع مقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتجاج في الرؤية	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
ارتباك	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
سبات/ غيبوبة	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المعص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدوارة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

جذر الثمان (Snakeroot (Serpentaria, Virginia Snakeroot)

البلغمومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص
التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات
الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا
تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Aristolochia serpentaria

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Aristolochin

• Bornesol

• Terpene

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة



• ينشط إفرازات المعدة.

• ينشط انقباضات العضلات في المعدة والأمعاء
والقلب.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يحسن الدورة الدموية.

• قد ينشط عمل القلب.

• قد يعالج سوء الهضم.

• قد يخفف الحمى.

• قد يعالج قروح الجلد.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل
قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
تشنج العضلة العاصرة في المستقيم	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

تدر الثعلبان (Snakeroot (Serpentaria, Virginia Snakeroot)

• قد يفضي إلى إسهال شديد مصحوب بغازات.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المنص التشنجي.
- يستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.
- الإرضاع

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Spartium junceum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• البتلات/ الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• Anagryne

• Cytisine

• Methyleytisine

التأثيرات المعروفة

- ينشط انقباضات الرحم
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- ينشط عمل المعدة والأمعاء.
- يسبب التقيؤ.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يدفع إلى المغاض.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

أطلب الإسعاف.

ضرب في الكلية

يتجلى في وجود دم

في البول، وتضائل

تدفق البول وورم

في الهدين والقدمين.

ضعف في العضلات.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثيان أو قيء.

استشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- أردت استخدامه لدوار الصباح.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون سنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Mentha spicata*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

• البناتل/الزهرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Carvone

• راتنج

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- ينشط عمل العضلات في المعدة والأمعاء.
- يساعد في معالجة الغثيان.

معلومات متفرقة

يستخدم النعناع السنبلي لإضافة النكهة إلى العديد من الأطعمة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يساعد في طرد الغازات من المعدة والأمعاء.
- قد يلطّف تقرّح الحنجرة
- قد يسبب احتقاناً في الجيوب الأنفية.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفصّ التشنجي.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
نوبات تشنج وغيبوبة	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.

الفراولة Strawberry

التأثيرات الإضافية المحتملة



ما من تأثيرات إضافية معروفة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
لديك حساسية للفراولة.
- يستشر الطبيب في حال:
● تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الركام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى المرأة الحامل التي تتناول مقادير صغيرة منه، كجزء من الغذاء المتوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Fragaria vesca, F. americana
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

- الثمار
- الأوراق
- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Catechins
- Leucoanthocyanin
- معادن
- فيتامين C

التأثيرات المعروفة



- يحول دون داء الأسقريوط.
- يقمع إنتاج الهيستامين.
- معلومات متفرقة
- تعتبر الفراولة البرية من فصيلة الورد.

الإرضاع

يفترض ألا تظهر أية مشاكل لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من أمهات تتناولن مقادير صغيرة أو اعتيادية منه ضمن غذاء متوازن. ولم يتبين أن المنتجات الأخرى المشتقة من هذه العشبة تسبب المشاكل.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل المصانع. حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

السماق Sumac

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Rhus glabra*

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- اللحاء
- الثمار
- الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- Albumin
- Malic acid
- راتنج
- حمض التانيك
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

اللحاء

● يقلص الأنسجة.

● يحول دون إفراز السوائل.

● يقمع نمو الجراثيم وتكاثرها.

الثمار

● تساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.

● تعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناولها داخلياً

معلومات متفرقة

ينتمي السماق إلى فصيلة اللبلاّب السام والهلوط السام.

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشوي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة.
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج الإسهال.
- قد يعالج النزف من المستقيم.
- قد يعالج داء الربو عند تدخين الأوراق.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال.
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل.
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الإرضاع.
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.
- الأطفال والأولاد.

اللبية Sundew

Droserone •

Malic acid •

راتنج •

حمض التانيك •

التأثيرات المعروفة

- يحقق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناولها داخلياً.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)

Drosera rotundifolia

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• حمض الستريك

• يزيد من سيولة إفرازات المجاري الشعبية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج السعال الديكي.
- قد يعالج التهاب الحنجرة.
- قد يعالج سعال المدخنين.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنتِ حاملاً أو تظنن أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طمية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطقولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة. الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Helianthus annuus

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

• البتلات/الزهرة

• البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Arachidic acid

• Behenic acid

• Linoleic acid

• Oleic acid

• Palmitic acid

• Stearic acid

• فيتامين E



التأثيرات المعروفة

• يقاوم التأكسد.

• يعالج نقص الفيتامين E (البذور).

التأثيرات الإضافية

المحتملة

قد يساعد في التخفيف من ألم التهاب المفاصل.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

ما يجب فعله

العلامات والأعراض

توقف عن تناوله، إتصل فوراً

بحساسية

بالطبيب

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المصغى التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تحاول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولسي حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Viola odorata*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الأوراق

• البذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• غلوكونيد

• ميريوسين

التأثيرات المعروفة

• يسبب امتهاج الأغشية المخاطية.

• ينشط عمل المعدة والأمعاء.

معلومات متفرقة

حرى استخدام البنفسج الحلي لمعالجة السرطان في العام 500 قبل الميلاد، لكن لا وجود لأدلة فعلية على ذلك.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج السرطان عند استخدامه بمثابة كمادة.

• قد يعالج أمراض الجلد.

• قد يلين المعدة.

• قد يسبب التقيؤ

• قد يخفف من سكاكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.

• قد يعالج السعال

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

حشيشة الشفاء Tansy

التأثيرات الإضافية المحتملة



- قد يعالج الألم.
- قد يسبب الشعور بالخفة والنشاط.
- قد يعالج دود الأمعاء.
- قد يعالج الصعوبات في الدورة الشهرية.

معلومات أساسية



- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع)
Tanacetum vulgare
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- كامل النبات
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- مريث
- Borneol
- Camphor
- Tanacetin
- Tanacetol
- Thujone
- راتنج

توقف: ملاحظات وتحذيرات



- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك ملاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،

التأثيرات المعروفة



- ينشط انقباضات الرحم.
- يحسن الشهية.
- يقضي على طفيليات الأمعاء.
- معلومات متفرقة
- حشيشة الشفاء قوية جداً ولذلك يفضل تفاديها أو استخدامها تحت إشراف طبي فقط

المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج.

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
توسع بؤبؤ العينين.	أطلب الإسعاف.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
نبض سريع وضعيف.	أطلب الإسعاف.

الصمغ Thyme, Common

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): Thymus vulgaris

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

● الثمار/الفاكهة

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

● صمغ

● حمض التانيك

● زيت الصمغ

● راتنج

التأثيرات المعروفة

- يقمع نمو الجراثيم وتكاثرها.
- ينشط عمل المعدة والأمعاء.
- يخفف من سماكة الإفرازات في المجاري الشعبية.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من انتفاخ البطن.
- قد يعالج السعال.
- قد يعالج الالتهاب الشعبي.
- قد يعالج الالتهابات الجرثومية

● قد يخفف من تشنجات الدورة الشهرية.

● قد يعالج داء الريو.

● لا يزال يخضع الدراسة لمعرفة مدى وقايته من السرطان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تخطين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

استشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لعداوة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليس حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

العطر الفول (Tonka Bean) (Tonquin Bean)



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Coumarouna odorata, Dipteryx odorata

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الحبوب

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Coumarin

• صمغ

• Sitosterin

• نشاء

• Stigmasterin

• سكر



التأثيرات المعروفة

• يؤخر أو يوقف تخثر الدم.

• يقاوم التخثر.

معلومات متفرقة

• يعيق الكومارين تخليق الفيتامين K في الأمعاء البشرية. والواقع أن غياب الفيتامين K يحول دون تخثر الدم.

• جرى استعمال الفول العطري في ما مضى بدل خلاصات الفانيليا

• إنه يستخدم في تنكيه التبغ.

• حظرت منظمة الصحة الأميركية استعماله بعشابة منكهة في الأطعمة.



التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يحول دون تخثر الدم في الأوردة العميقة

• قد يحول دون تفكك الدم المتخثر في الأوعية

الدموية والأعضاء الحيوية، مثل الدماغ أو الرئتين.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تنظين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة.

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
تأخر في النمو	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين)	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
ضمور الخصية	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
نزف داخلي لا يمكن ضبطه	أطلب الإسعاف.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

عرق الجبار Tormentil

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو الممعي الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع).

Potentilla erecta, P. tormentilla

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Ellagic acid

● Kinovic acid

● حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

● يقلص الأنسجة.

● يحول دون إفراز السوائل.

● يعميق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يعالج الإسهال.

● قد يعالج تقرح الحنجرة.

● قد يعالج الجروح عند استعماله بمثابة كمادة.

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجةسمية هذه العشبة

لأعراض التسمم. راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

دون الستين
معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

شيشة العفص Unicorn Root (Colic Root)

معلومات منفردة

يستخدم بمثابة أساس لإنتاج البروجسترون الاصطناعي.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج الدورة الشهرية المؤلمة.
- قد يخفف من احتمالات الإجهاض.
- قد يعالج تقرح الثديين.
- قد يخفف من الانتفاخ
- قد يخفف من ألم التهاب المفاصل.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع). Aletris farinosa
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

- الأوراق
- الجذور
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.
- Diosgenin
- راتنج
- صابونين
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من تشنج العضلات.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم، راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
شعور بالخفة والنشاط	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

المستقبل القريب.

- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Scutellaria lateriflora

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● كامل النبات

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● سلولوز

● دهن

● Scutellarin

● سكر

● حمض التانيك



التأثيرات المعروفة

● يزيد من حموضة المعدة.

● امتياع الأغشية المخاطية.

● يخفف من التشنجات في العضلات الطرية أو الهيكل العظمي.

● يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.



التأثيرات الإضافية

المحتملة

● قد يحسن الشهية

● قد يخفف من تشنجات الأمعاء.



توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● استشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمددوات مشكلة طبية لم تتحسن

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد:

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.



السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فترة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة



العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتباك	توقف عن تناوله إتصل فوراً بالطبيب.
خرف	توقف عن تناوله إتصل بالطبيب عند الإمكان.
عدم انتظام في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.
غيبوبة/سبات	أطلب الإسعاف.

الصرف Watercress

- قد يعالج الحمى الموجودة في المثانة.
- قد يزيد من تدفق البول.
- قد يعالج مرض القلب.
- قد يخفف من الألم أثناء الولادة.

معلومات أساسية



الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Nasturtium officinale

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

أجزاء متنوعة من النبتة تختلف حسب البلد والثقافة.

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• عدد من المعادن الثقيلة، مثل الفاناديوم والكوبالت.

• الفيتامينات A و C و B-1 و B-2

توقف: ملاحظات وتحذيرات



لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر

فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك

الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات

الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية.

المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

التأثيرات المعروفة



• يعتبر مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن اللازمة

لمعالجة عدة أمراض أو الحؤول دونها.

معلومات متفرقة

• الحرف هو مصدر طعام مفيد.

• لا يحتمل أن يصاب الجسم بالتسمم.

التأثيرات الإضافية



المحتملة

• قد يعالج التهابات الكلية.

- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

الحنوبير الأبيض White Pine

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج السعال عند مزجه مع أدوية أخرى طاردة للبلغم.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- استشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Pinus strobus, P. alba

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● اللحاء الداخلي

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

● Coniferin

● Ciniferyl alcohol

● Oleoresin

● هلام نباتي

● حمض التانيك

● فانيولين

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع. حفظ المنتج.

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

يسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة****العلامات والأعراض**

ما يجب فعله
انزعاج في البطن. توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الصفصف Willow**معلومات أساسية**

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Salix nigra, S. alba

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• اللحاء

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

Salicin •

Salinigrin •

حمض التانيك •

التأثيرات الإضافية**المحتلة**

• قد يطهر الأماكن المتقرحة في الجلد.

• قد يساعد في التخفيف من أعراض النقرس والتهاب المفاصل.

• قد يساعد في معالجة الصداع.

• قد يساعد في شفاء الجروح المفتوحة بفصل حمض التانيك.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

التأثيرات المعروفة

• يسبب التجاعيد.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

- لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.
- لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.
- التفاعلات العكسية أو
- التأثيرات الجانبية أو أعراض
- الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

دوار	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طنين في الأذنين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

- ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطي الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة. وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تخطي الجرعة الموصى بها من قبل المصانع.
- قد يحدث التسمم نتيجة الساليسيلات، ومن أعراضه الدوار والقيؤ والطنين في الأذنين.

الخلطة Wintergreen المستحضرة

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

- Methyl salicylate
- Monotropitoxide

التأثيرات المعروفة

- يحجب وصول النبضات إلى مركز الألم في الدماغ.
- احتياج المعدة.
- يعالج ألم الالتواءات والرضوض عند استخدامه

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

● Gaultheria procumbens

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

● الأوراق

● الجذور

● الجذوع

دون الستين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، وليست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

ألم في البطن. توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.

خارجياً.

معلومات متفرقة

- يبقى التسمم غير محتمل إلا إذا استهلكت كميات كبيرة جداً من كامل النبتة.
- لا تستخدم هذه النبتة بعد ممارسة تمارين قوية لأنها قد تسبب التسمم بالسليسيولات.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من الصداع.
- قد يعالج ألم الأسنان.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما



معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Hamamelis virginiana

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• اللحاء

• الأوراق

• الأماليد

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

• مرينات

• أوكسالات الكلسيوم

• حمض غاليك

• Hamamelitannin

• Hexose sugar

• حمض التانيك

• زيوت متطايرة

قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد
البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المص
الاشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدواة مشكلة طبية لم تتحسن
خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر
فاعلية)

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك
الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات
الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية،
المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما
دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا
تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً
بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا
تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء
المباشر. لا تحفظه في الثلاجة

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة
والحرارة قد تغيران من عمل العشبة

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية



التأثيرات المعروفة

• يقلّص الأنسجة عند استخدامه بمثابة مرهم أو
محلول أو تحميلة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج الإسهال.

• قد يلطف الجلد المهتاج أو البواسير

• قد يزعم الأنسجة (في الشكل غير المقطر)

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في
المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل

تعتبر هذه العشبة آمنة عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إمساك	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
يرقان (اصفرار الجلد والعينين). غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

الحويصلة Woodruff

التنفسية ويزيد من سيولته.
● يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله دافئاً.
معلومات متفرقة
توضع هذه النبتة في أكياس صغيرة للاستمتاع برائحتها الزكية.

التأثيرات الإضافية المحتملة

- قد يعالج السعال.
- قد يساعد في طرد الفازات من الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
إستشر الطبيب في حال:

معلومات أساسية

الاسم الأحائي (الجنس والنوع)
Asperula odorata, Galium odoratum
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية
● كامل النبتة
المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
Asperuloside
● مرينات
● كومارين
● زيت
● حمض التانيك

التأثيرات المعروفة

- ينشط عمل المعدة والأمعاء.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تفهزان من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

ما من شيء متوقع.

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمتح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

نبشاي الحشيشيل (Wormseed) (Pigweed)

- Terpene
- الفيتامينان A و C
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يقمع نمو الجراثيم وتكاثرها.
- يخفض ضغط الدم
- يبطئ خفقان القلب.
- يقمع الجهاز العصبي المركزي.
- يخفف من انقباضات المعدة.
- معلومات متفرقة
- تستخدم هذه العشبة خارجياً بمثابة كمادة.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Chenopodium ambrosioides

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية.

• الثمار/الفاكهة

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة

• Ascaridol

• كلسيوم

• Cymene

• D-camphor

• Limonene

• Saponin

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
صعوبات في التنفس.	أطلب الإسعاف.
دوار	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
صداع	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
مشاكل في السمع.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو قيء	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
طنين في الأذنين.	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
تباطؤ في خفقان القلب.	أطلب الإسعاف.
قرحة في المعدة.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
مشاكل في الرؤية.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج التهاب المفاصل
- قد يقضي على طفيليات الأمعاء.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المخصّش التشنجي.
- إستشر الطبيب في حال.
- تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى.

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

لن يفيدك هذا المنتج وقد يسبب لك أعراض التسمم.

حفظ المنتج.

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Artemisia absinthium

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الثمار/الفاكهة

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Thujone

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يقمع الجهاز العصبي المركزي.

• يؤدي Thujone إلى تغير بسيط في المزاج، وقد يفضي إلى مرض الذهان.

• يزيد من حموضة المعدة.

معلومات متفرقة

قد تسبب هذه العشبة نوعاً من الإدمان.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج القلق.

• قد يسكن الألم قليلاً.

• قد يحسن الشهية

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناولوه في حال:

• كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تحسن

توقف عن تناوله. إتصل
بالطبيب عند الإمكان.

ارتعاش

الجانبية أو أعراض الجرعة
المقرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله
نوبات تشنج. أطلب الإسعاف.
غيبوبة أطلب الإسعاف.

الأشبة Yarrow

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- إستشر الطبيب في حال:
- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.
- الحمل:
- لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الارضاع

لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطين الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع ميدنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

معلومات أساسية

- الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):
Achillea millefolium
- الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:
- الثمار/الفاكهة
- الأوراق
- المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:
- Achilleine
- Coumarins
- Polyacetylenes
- Salicylic acid
- Triterpenes
- حمض التانيك
- زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يخفف من وقت تخثر الدم
- يخفف الألم.
- يقاوم الالتهاب

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يسكن الألم قليلاً.
- قد يساعد في التخفيف من تشنجات الدورة الشهرية.
- قد يساعد في التخفيف من ضغط الدم.

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال
توقف عن تناوله. إتصل فوراً
بالطبيب

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تعيران من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

الأرز الأصفر Yellow Cedar

معلومات متفرقة

لقد سبب الأرز الأصفر الموت لعدد من الأشخاص عندما أسيء استعماله للأجهزة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يخفف من ألم العضلات.
- قد يعالج التآليل.
- قد يسبب الأجهزة.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال:

كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

إستشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مصادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Thuja occidentalis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

● الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

● Fenchone

● Pinopicnn

● Thujone

● حمض التانيك

● زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

- يشط الجهاز العصبي المركزي.
- يحفر عضلة القلب على الانقباض بفاعلية أكبر.
- يقضي على ديدان الأمعاء
- يسبب انقباضات في الرحم
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

حفظ المنتج

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
- إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسسم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو**التأثيرات الجانبية أو أعراض****الجرعة المفرطة****العلامات والأعراض ما يجب فعله**

إجهاض	أطلب الإسعاف.
غيبوبة	أطلب الإسعاف.
نوبات تشنج.	أطلب الإسعاف.
انخفاض سريع في ضغط الدم.	أطلب الإسعاف.
أعراضه تذكر الإغماء والعرق البارد والشعوب والنفض السريع	

الحصاض الأصفر Yellow Dock**معلومات أساسية**

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع): *Rumex crispus*
الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الأوراق

• الجذور

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• Oxalic acid

• Potassium oxalate

• الفيتامينان A و C

التأثيرات المعروفة

- احتياج الجلد عند الإمساك به.
- ينشط المعدة والأمعاء وليتنبها قليلاً.
- ينشط إفراز الصفراء.

معلومات متفرقة

يستخدم الحَمْضُ الأصفر بمثابة طعم في السلطات.

التأثيرات الإضافية**المحتملة**

قد يخفف مؤقتاً من الإمساك.

- إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
- لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة خطيرة قليلاً خصوصاً بالنسبة إلى الأولاد والذين تخطوا 55 عاماً والذين يتناولون جرعات أكبر من تلك الموصى بها لفترات طويلة من الوقت.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
إسهال	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب
ضرر في الكلية	أطلب الإسعاف.
يتجلى في وجود دم في البول، وتضائل تدفق البول وورم في اليدين والقدمين.	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
طفح جلدي.	

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تناوله في حال:

- كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثني عشري، أو الارتداد المعوي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المفاصل التشنجية.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

لا تتناوله في حال:

• كنتِ حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

• المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اليلعومي، أو التهاب القولون التقرّحي، أو المفص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

• تناول هذه العشبة لمدّواة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

• تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل.

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الإرضاع

لا تستخدميه إلا بعد استشارة الطبيب.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولستِ حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تنخلي الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج

• يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.

• إحفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

• لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة الجرعة الأمنة.

مما معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Cypripedium pubescens

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية

• الجذور

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

• راتنج

• حمض التانيك

• حمض متطاير

• زيوت متطايرة

التأثيرات المعروفة

• يهيج الأغشية المخاطية.

• ينشط عمل المعدة والأمعاء.

• يزيد من إفراز العرق.

معلومات متفرقة

• يؤدي الوبر الموجود على الجذوع والأوراق إلى تهيج الجسم عند لمسه

• قد يسبب طفحاً جلدياً مماثلاً لذلك الناجم عن اللبلاب السام

التأثيرات الإضافية

المحتملة

• قد يعالج القلق أو الأرق.

• قد يزيد من إفراز العرق.

• قد يساعد في طرد الغازات من الأمعاء

• قد يخفف من التشنج في العضلات الطرية أو الهيكل العظمي.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
دوار	توقف عن تناوله إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان أو تقيؤ	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

الماتى Yerba Maté

توقف: ملاحظات وتحذيرات

- لا تتناوله في حال:
- كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.
- المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعوي الاثنى عشري، أو الارتداد البلعومي، أو التهاب القولون التقرحي، أو المغص التشنجي.

إستشر الطبيب في حال:

- تناول هذه العشبة لمداداة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية)
- تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبرين، المسهلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المكملات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا نستخدميه.

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة لا نستخدميه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنح أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما

معلومات أساسية

الاسم الأحائي (الجنس والنوع):

Ilex paraguariensis

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة:

الكافيين

التأثيرات المعروفة

- ينشط الجهاز العصبي المركزي.
- يساعد الجسم في التخلص من فائض السوائل من خلال زيادة إنتاج البول.
- يسبب الهلوسة.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يلون الأمعاء.
- قد يزيد من إفراز العرق.

التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض	ما يجب فعله
ارتباك	أطلب الإسعاف.
تبول مفرط	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
هلوسات	أطلب الإسعاف.
حرقة في الفم	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
أرق	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
احتياج	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
غثيان	توقف عن تناوله. إتصل فوراً بالطبيب.
عصبية	توقف عن تناوله. إتصل بالطبيب عند الإمكان.
خفقان سريع في القلب	أطلب الإسعاف.

دون السنتين.

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع مبدئياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.
حفظ المنتج:

- يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر. لا تحفظه في الثلاجة.
 - إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.
 - لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام. فالرطوبة والحرارة قد تغيران من عمل العشبة.
- الجرعة الآمنة:
إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

تعتبر هذه العشبة آمنة عموماً عند تناولها بكميات ملائمة لفترات قصيرة من الوقت.
لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

Yerba Santa العشب

التأثيرات المعروفة

- يحجب الطعم المر للأدوية.
- يخفف من سماكة المخاط في الرئتين والمجاري الشعبية ويزيد من سيولته.
- يعيق امتصاص الحديد والمعادن الأخرى عند تناوله داخلياً.

التأثيرات الإضافية

المحتملة

- قد يعالج حمى القش والحساسيات الأخرى في

معلومات أساسية

الاسم الأحيائي (الجنس والنوع):

Eriodictyon californicum

الأجزاء المستخدمة لأغراض طبية:

• الأوراق

المواد الكيميائية الموجودة في هذه العشبة.

- حمض الفورميك
- Pentatnacontane eriodictyol
- راتنج
- حمض التانيك

الأنف.

● قد يعالج البواسير.

توقف: ملاحظات وتحذيرات

لا تتناوله في حال

● كنت حاملاً أو تظنين أنك حامل أو تنوين الحمل في المستقبل القريب.

● المعاناة من مرض مزمن في الجهاز الهضمي، مثل قرحة المعدة أو المعى الاثني عشري، أو الارتداد اللمعومي، أو التهاب القولون التقرّجي، أو المفاصل التشنجي.

استشر الطبيب في حال:

● تناول هذه العشبة لمدّاة مشكلة طبية لم تتحسن خلال أسبوعين (قد تكون هناك علاجات أخرى أكثر فاعلية).

● تناول عقاقير أو أعشاب طبية، بما في ذلك الأسبيرين، المسهّلات، أدوية الزكام والسعال، مضادات الحموضة، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، الكمكلات وعقاقير أخرى.

الحمل:

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه

الإرضاع

المخاطر تفوق الفوائد المحتملة. لا تستخدمه.

الأطفال والأولاد

يجب ألا يمنع أي مستحضر عشبي للأطفال والأولاد ما دون السنتين

معلومات أخرى:

ما من تحذيرات معينة إن كنت تخطيت الطفولة ولا تزال تحت عمر 45، ولست حاملاً، وتتمتع ميدنياً بصحة جيدة، وتتناول العشبة لفترة قصيرة فقط، ولا تتخطى الجرعة الموصى بها من قبل الصانع.

حفظ المنتج:

● يجب حفظه في مكان جاف وبارد، بعيداً عن الضوء المباشر، لا تحفظه في الثلاجة.

● إحتفظه في مكان آمن بعيداً عن متناول الأولاد.

● لا تحفظه في خزانة الدواء في الحمام، فالرطوبة والحرارة قد تفسدان من عمل العشبة.

الجرعة الآمنة:

إسأل الطبيب عن الجرعة الآمنة بالنسبة إليك.

السمية

لم تتحدث المراجع الرسمية عن درجة سمية هذه العشبة.

لأعراض التسمم: راجع فقرة التفاعلات العكسية أو التأثيرات الجانبية أو أعراض الجرعة المفرطة.

التفاعلات العكسية أو

التأثيرات الجانبية أو أعراض

الجرعة المفرطة

العلامات والأعراض ما يجب فعله

إسهال توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

غثبان أو تقيؤ توقف عن تناوله. إتصل فوراً

بالطبيب.

المأخوذ اليومي المثالي

العنصر أو المعدن ¹	القيمة الموصى بها	الكمية الموصى بها	المأخوذ النموذجي	على مأخوذ	المأخوذ المثالي
A	5000 وحدة دولية	الرجال 1000 ملستيفرام النساء 800 ملستيفرام			5000 وحدة دولية
B-12	6 ملستيفرام	2 ملستيفرام	2.4 ملستيفرام		2.4 ملستيفرام
كلسيوم	1000 ملغ	1200-800 ملغ	1000-1200 ملغ	2500 ملغ	1500-1200 ملغ
Choline			رجال 550 ملغ النساء 425 ملغ	350 ملغ	375-550 ملغ
Chromium					150-50 ملستيفرام
نحاس	2 ملغ				3-2 ملغ
D	400 وحدة دولية	10-5	10-5	50	600-400 وحدة دولية
E	30 وحدة دولية	رجال 10 ملغ النساء 8 ملغ			400 وحدة دولية
فلوريد			الرجال 4 ملغ النساء 3 ملغ	10 ملغ	10-2 ملغ
حفظ الفوليد/ فولات	400 ملستيفرام	الرجال 200 ملستيفرام النساء 180 ملستيفرام	100 ملستيفرام	1000 ملستيفرام	400-200 ملستيفرام
يود	150 ملستيفرام	150 ملستيفرام			150 ملستيفرام
حديد	18 ملغ	الرجال 10 ملغ النساء 15 ملغ			مكمل غير موصى به في الحالة الصحية
K		الرجال 80-70 ملستيفرام النساء 65-60 ملستيفرام			مكمل غير موصى به في الحالة الصحية

إن الأرقام المذكورة في الجدول أعلاه مخصصة للراشدين. والقيمة الغذائية هي قيمة قياسية حددتها منظمة الصحة الأمريكية. إنها تجمع بين المأخوذ اليومي المرجعي والمأخوذ اليومي الموصى به. تجدر الإشارة إلى أنه جرى تطوير المأخوذ اليومي الموصى به ليشمل المواد المغذية غير المذكورة في المأخوذ اليومي المرجعي.

القياسات أو المعادن	القيمة اليومية	الكمية الغذائية الموصى بها	المأخوذ اليومي المرجعي	أعلى مأخوذ مسموح به	المأخوذ المثالي المحتمل للمرض
مغنيزيوم	400 ملغ	الرجال 350 ملغ النساء 280 ملغ	الرجال 400-420 ملغ النساء 310-320 ملغ	350 ملغ (من مصدر صيدلي فقط)	500-1000 ملغ
منغنيز					2-5 ملغ
موليبدينوم					75-250 ملغ
نياسين (B-3)	20 ملغ	الرجال 15-19 ملغ النساء 13-15 ملغ	الرجال 16 ملغ النساء 14 ملغ	35 ملغ	15-35 ملغ
حمض بانتوثني (B-5)	10 ملغ		5 ملغ		5-20 ملغ
فوسفور	1000 ملغ	1200-800 ملغ	700 ملغ	4000 ملغ	1200-1500 ملغ
بوتاسيوم	3500 ملغ				4000 ملغ
بيرووكسين (B-6)	2 ملغ	الرجال 2 ملغ النساء 1.6 ملغ	1.3-1.7 ملغ	100 ملغ	1.5-50 ملغ
ريبوفلافين (B-2)	1.7 ملغ	الرجال 1.4-1.7 ملغ النساء 1.2-1.3 ملغ	الرجال 1.3 ملغ النساء 1.1 ملغ		1.3-50 ملغ
سelenium		الرجال 70 ملغ ملستيغرام النساء 55 ملغ ملستيغرام			100 ملستيغرام
صوديوم	2400 ملغ				2400 ملغ
ثيامين (B-1)	1.5 ملغ	الرجال 1.2-1.5 ملغ النساء 1-1.1 ملغ	الرجال 1.2 ملغ النساء 1.1 ملغ		1.2-50 ملغ
زنك	15 ملغ	الرجال 15 ملغ النساء 12 ملغ			15-25 ملغ

والمأخوذ اليومي المرجعي يتسع أكثر من المأخوذ الغذائي الموصى به ليعتمد على الصحة العامة واستخدام المواد الغذائية لتحسين الصحة على المدى الطويل.

ويحدد أعلى مأخوذ مسموح به المأخوذ الأقصى من القيمة الغذائية الممكن تناوله من حدوث تأثيرات جانبية.

المواد الكيميائية النباتية والصحة

المواد الكيميائية النباتية والصحية

المواد الكيميائية النباتية هي مواد كيميائية موجودة في النباتات أو مشتقة منها.

المادة الكيميائية النباتية	المصدر الغذائي	الأهمية السريرية
Alpha-linolenic acid	بزر الكتان، الصويا، الجوز	يخفف من الالتهاب. يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويحمي من سرطان الثدي. يحسن جهاز المناعة.
Beta-carotene	الفاكهة والخضار الخضراء والصفراء	يخفف من خطر زرق العين، والمرض القلبي التاجي، وسرطان الرئة والتدخين. يحسن جهاز المناعة عند كبار السن.
Capsaicin	الفلفل الحريف	يخفف من خطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة والمستقيم. يقطع نمو الأورام.
Carotenoid lycopene	صلصة الطماطم، الكاتشاب، الليمون الأحمر، الجوافة، المشمش المجفف، الشمام، الطماطم الطازجة	يقاوم التأكسد، ويخفف من خطر سرطان البروستات. قد يخفف من المرض القلبي الوعائي.
Curcumin	الكرم، الكاري، الكمون	قد يخفض مستوى الكوليسترول، ويخفف من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
Cynarin	الأرضي شوكي	يخفض مستويات الكوليسترول.
Ellagic acid	العنب، الكشمش، الجوز، التوت، الفراولة	يخفف من خطر الإصابة بالسرطان، ويقمع المواد السرطانية المرتبطة بـ DNA. يخفض مستوى كوليسترول LDL فيما يرفع مستوى كوليسترول HDL.
Flavonols, polyphenols: catechin (theaflavins, thearubigins), theogallin, EGCG	الشاي الأخضر والأسود، التوت	يخفف من خطر سرطان المعدة. يقاوم التأكسد. يزيد من فعالية جهاز المناعة، يخفف إنتاج الكوليسترول، يحمي الجسم من السرطان الناجم عن المواد الكيميائية ومن سرطان الجلد. قد يحمي من سرطان المريء. ويقمع نمو الأورام.

Genistein

فول الصويا

يخفف من خطر السرطان المرتبط بالهرمونات. يعدل مستوى الهرمونات في الجسم، يشجع على تمايز الخلايا. يخفض مستوى الكوليسترول، يخفف من ترقق العظام وأعراض سن اليأس.

Indoles

الملفوف، البروكلي، القنبيط، السبانخ، الحرف، الفجل، فول الخردل، أبو ركة، اللفت، الجرجار

يخفف من خطر السرطان المرتبط بالهرمونات. قد يبطل مفعول الاستروجين، ويقمع نمو الخلايا المتحولة.

Isothiocyanates

الملفوف، القنبيط، البروكلي، فول الخردل، الجرجار، الفجل

يخفف من خطر الأورام الناجمة عن التدخين، ويمنع الأورام السرطانية الناجمة عن التدخين من إتلاف DNA.

sulforaphane

Lignans

الأطعمة الغنية بالألياف

يخفف خطر سرطان القولون، ويخفض مستوى الكوليسترول والغلوكوز في الدم.

Monterpene

الحامض (القشرة والغشاء)، النعناع، الكراويا، الصعتر، الكزبرة

يقاوم التأكسد، يخفف من خطر سرطان الجلد والذي، يخفف من إنتاج الكوليسترول، يخفف من أعراض الدورة الشهرية.

limonene

مركبات الكيريت العضوي

الثوم، البصل، الحرف، الكراث، الخضار المنتمية إلى الفصيلة الصليبية.

يخفف من خطر تأكسد الدهون، وسرطان الرئة والقولون والمعدة. يجمع نمو الأورام من خلال قمع تكوين DNA. يقاوم تكوين الجلطات، ويخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم المرتفع. يقاوم الجراثيم.

Polyacetylene

البقدونس، الجزر، الكرفس

يخفف من خطر الأورام الناجمة عن التدخين، ويعدل تكوين البروستاتين.

Quercetin

قشر الإجاص، قشر التفاح، أوراق الطماطم، الفلفل، البصل، عصير العنب

مقاوم للسرطان والتأكسد، ويقال إنه يخفف من مرض القلب التاجي. ويخفف من تكثر لويحات الدم.

Phenolic acid

الخضار المنتمية إلى الفصيلة الصليبية، الباذنجان، الفلفل، الطماطم، الكرفس، البقدونس، الصويا، السوس، بزر الكتان، الحامض، التوت، الحبوب الكاملة.

يقمع السرطان من خلال منع تكوين النيتروسامين، ويخفف من خطر سرطان الرئة والجلد.



هل تعرف ماذا تتناول منها؟ ولماذا؟

الفيتامينات الأعشاب والمعادن والمكملات الدليل الكامل

بسط الأمور على نفسك، واستخدم هذا الدليل الكامل لمعرفة أحدث المعلومات حول الأعشاب والفيتامينات والمكملات، وكل شيء يجب أن تعرفه عن طريقة استعمال هذه العناصر بطريقة صحيحة وآمنة وذلك بشكل واضح وسهل الاستخدام.

- إحصل على أحدث المعلومات عن الأعشاب الطبية وقواندها.
- إكتشف القيم اليومية من الفيتامينات والمعادن والتي أصدرتها حديثاً وزارة الصحة الأميركية.
- تعرّف إلى طريقة تفاعل المكملات مع الأعشاب والعناصر الأخرى.
- ميز عوارض النقص في التغذية.
- استكشف المصادر الطبيعية للكيمياء النباتية المانعة للأمراض والمتوفرة في طعامنا اليومي.

طبق برنامجنا الخاص بالأعشاب والمكملات للحصول على أفضل النسب الصحية. وإستعمل هذا الكتاب كمرجع لتعرف بشكل أفضل ما الذي تتناوله، وتجدد معرفتك حول الجرعات المناسبة وتحسن معرفتك بالاقتراحات التي تقدمها الهيئات الرسمية مثل FDA وNASF وNB.

إن هذا الكتاب ضروري لكل شخص يتناول أي نوع من المكملات أو الأعشاب، حيث تقدم الجداول الواضحة عن العناصر معلومات حيوية عن:

- الفوائد • المصادر الطبيعية • معلومات عن الجرعات والاستخدام
- عوارض النقص في التغذية والجرعات الإضافية والتسمم
- تحذيرات حول تفاعلها مع عناصر أخرى

ISBN 2-84409-703-0



9 782844 097033